



FLOCLOPY

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, triticale og rug.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-65 • Analyse: Pyroxsulam 68,3 g/kg (6,83%)
Florasulam 22,8 g/kg (2,28%) • Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler • Formulering: Granulat

Emballage: 1,0 Kg

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R 43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i vinterhvede, triticale og rug kun anvendes forår/sommer og ikke senere end vækststadium BBCH 39. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakfløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Lokalirriterende
N



Miljøfarlig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurennet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet i kontakt med huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Brugsanvisning FLOCLOPY

Generelt

Floclopy er et systemisk bladherbicid indeholdende 2 ALS hæmmere og bruges til bekæmpelse af en og tokimbladede ukrudtsarter i vinterhvede, rug og triticale om foråret. Der bør ikke sprøjtes, når afgrøden er under stress

Etikette nr.: I
GODKENDT

29 AUG. 2011

for pakninger på 1 kg
Miljøstyrelsen

Dosering og sprøjtetidspunkt

| Tidspunkt BBCH | Dosering | Bekæmper | Effekt |
|-------------------|----------|--|--------|
| 21-29 | 165 g/ha | Vindaks, burresnerre lugtløs og vellugtende kamille, fuglegræs, kornblomst, alm pengeurt, agersennep, raps, snerte, bleg og fersken pileurt, hyrdetaske, valmue, mørkførlømmigej | >90% |
| 30-39 | 220 g/ha | Alm rapgræs, rajgræs, agerrævehale, tvetand, ærenpris, agerstedmoder | 90% |
| | | Gold og blød højre, storkronet ærenpris, flyvehavre, vej pileurt | 70-90% |
| | | Enårig rapgræs | 50-70% |

Floclopyr anvendes sammen med 0,5 liter pr ha PG26N

Floclopy bør kun anvendes mod rapgræs, agerrævehale eller rajgræs, når der om efteråret har været anvendt midler med andre virkningsmekanismer end ALS-hæmning.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar

| Sprøjteteknik | | | |
|----------------|-----|---------|------|
| Dyse | Bar | Km/time | l/ha |
| ISO-020- Gul | 3 | 6,5 | 150 |
| ISO-025- Lilla | 3 | 6,5 | 185 |
| ISO-030- Blå | 3 | 5,7 | 250 |

Resistens

Gentagen anvendelse af midler med samme virkningsmekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det at skifte mellem midler med forskellig virkningsmekanisme eller anvende en tankblanding af midler med forskellige virkningsmekanismer, som begge er aktive over for de aktuelle ukrudtsarter. Brug kun Floclopy 1 gang pr år på samme areal.

Efterfølgende afgrøde

Der er ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder. Ved omsåning kan der ikke sås sukkerroe, spinat, bønner, ærter, kål, løg eller hør.

Jordtyper

Produktet kan anvendes på alle jordtyper. På lette jorder kan behandlingen medføre en forbigående lysfarvning af afgrøden, det er dog uden betydning for udbyttet.

Tankblanding

Floclopy bør ikke tankblandes med gødninger eller produkter indeholdende triexapac-ethyl, fenoxaprop-p-ethyl eller clodinafop. Der anbefales mindst 7 dages sprøjteinterval mellem disse produkter og Floclopy.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken med ca 50% af den væskemængde, der skal bruges. Sørg for omrøring under tilsætningen af Floclopy. Når produktet er fuldstændig opløst tilsættes resten af vandet og PG26N. Sørg for god omrøring indtil væsken er udsprøjtet.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten skal have præparatfylddeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Der skal anvendes indvendige spuledyser ved vask af sprøjten. Fyld vand i sprøjten, således at der fortyndes mindst 50 gange, tilsæt derefter et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal, maksimal dosering pr ha må ikke overskrides. Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Floclopy skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.