

Etikette nr.: 1
GODKENDT
30. september 2022

for pakninger på
Miljøstyrelsen
Fruentunns Blvd

250ml & 20x250ml

FLORAMITE® 240

INSECTICID

Midemiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i prydanter i lukkede væksthuse.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

INDHOLD

Midemiddel nr. 558-12. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Bifenazat 240 g/l (22,6 % w/w)
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Midlet er et suspensionskoncentrat fra / Distribution:

Arysta LifeScience Great Britain Ltd.,
Brooklands Farm, Cheltenham Road Evesham,
Worcestershire, WR11 2LS, Storbritannien

Læs vedlagte brugsanvisning

® Reg. varemærke fra **250 ml**



DIQ2022684/13-0622

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Indånd ikke spray (P260). Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i prydanter i lukkede væksthuse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Søg lægehjælp ved ubehag (P314).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDÅNDING: Frisk luft.

Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter.

Kontakt læge.

INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

VED KONTAKT MED

HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved

hudirritation eller udslet: Søg

lægehjælp (P333+P313).

Alt tils mudset tøj tages af og vaskes inden

genanvendelse (P362+P364).



FLORAMITE® 240

Brugsanvisning

Floramite er et selektivt spindemidmiddel til brug i prydpalnter. Ved korrekt brug har Floramite hurtig virkning som kontaktmiddel og derudover en langtidsvirkning. Floramite har generelt god virkning mod spindemider, men virkningen er bedst dokumenteret for væksthusspindemiden (*Tetranychus urticae*). Floramite bekæmper alle mobile stadier, men der er desuden også en rimelig virkning på æg. Ramte mider bliver hyperaktive efter få timer og tager ikke føde til sig. De dør efter 3-4 dage.

Anvendelse

Der behandles når de første spindemider konstateres. I kulturer med tæt løv, hvor det er vanskeligt at ramme spindemiderne, skal behandlingen gentages efter 7 dage. Vandmængden afhænger af kulturens højde og tæthed, da alt løv skal dækkes af sprøjtevæske.

Prydpalnter i væksthus:

0,04 % (40 ml pr. 100 l vand).

Maksimal dosering på 0,6 L/ha.

Der anvendes normalt 1000-1500 l vand pr. ha. Vandmængde under 1000 l bør undgås.

Resistens. Bifenazat tilhører en gruppe med ikke-afklaret virkemekanisme (IRAC gruppe UN). For at formindske risikoen for at der udvikles resistens over for Floramite, anbefales følgende brug:

- Antallet af behandlinger pr. kultur eller år må ikke overstige 2.
- Benyt et eller helst to andre produkter med forskellig virkemekanisme før næste behandling med Floramite.
- Kontrollér kulturen jævnligt og behandl med Floramite så snart angreb konstateres. Vent ikke til angrebet udvikler sig.
- Følg brugsanvisningens anvisning vedrørende dosering og vandmængde.
- Benyt mulighederne for integreret produktion, da Floramite kan bruges sammen med biologisk kontrol af spindemider. Integrerede metoder anbefales, da de kan begrænse behovet for spindemidmidler.

Tolerance: Floramite er generelt et skånsomt produkt og er testet på et stort antal kulturer uden skade – selv ved dobbelt dosering. Da producenten ikke kan garantere for tålsomheden i alle nye kulturer og sorter, er det vigtigt at udføre en prøvesprøjtning på et mindre areal inden større partier behandles.

Tilberedning af sprøjtevæske: Fyld tanken med den halve vandmængde. Start omrøring. Tilsæt Floramite og derefter den resterende vandmængde. Brug vand med pH mellem 5 og 7. Lad ikke opblandet sprøjtevæske stå natten over eller i længere perioder.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Blandinger: Floramite kan generelt blandes med andre produkter. Det anbefales dog at lave et forsøg i lille skala for at kontrollere blandbarhed og sikkerhed for kulturen før større arealer behandles.

Opbevaring: Opbevares køligt, men frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk: Det kan ikke udelukkes at visse stammer af spindemider kan udvikle resistens mod dette produkt. Da udvikling af resistens er uforudsigelig, kan producenten ikke holdes ansvarlig for nogen form for skade som opstår som følge af nedsat effekt overfor resistente spindemider. Hvis der bemærkes nedsat effekt af Floramite, anbefales det at bruge alternative midler eller metoder. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Mindre anvendelse af Floramite 240 (558-12) til bekæmpelse af spindemider i pryplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Anvendelsen i afgøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Midemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i pryplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og interval skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Ved anvendelse i pryplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Max 2 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår
- Ved anvendelse i pryplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: Potterne stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur).
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads uden recirkulering: For at beskytte grundvand og bier må der max udflyttes 2 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår ved dyrkning af pryplanter og planteskolekulturer. Udflytning må tidligst foretages 7 dag efter sprøjtning

Brugsanvisning – Mindre anvendelse I åbne væksthuse

Mindre anvendelse: Til bekæmpelse af spindemider i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation.	0,6 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 150 liter 0,04 % opløsning pr. 1000 m ² (= 0,6 L Floramite 240 pr. ha) *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Der sættes ikke en begrænsning.	Uden recirkulering: 7 dage.
				Med recirkulering: 7 dage.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden . Potterne skal stå så tæt som muligt.	0,6 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 150 liter 0,04 % opløsning pr. 1000 m ² (= 0,6 L Floramite 240 pr. ha) *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Max 2 kulturer pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet bifenazate	Uden recirkulering: 7 dage.
				Med recirkulering: 7 dage.

*0,04 % Opløsning (= 40 ml Floramite 240 i 100 L vand)

Sprøjteudstyr: Bomsprøjte og kærresprøjte m. lanse.

Forebyggelse af resistens:

Hvis Floramite 240 anvendes mere end én gang skal midlet indgå i en strategi, hvor der imellem behandlinger anvendes et spindemiddel med en anden virkemekanisme (f.eks. Nissorun 250 SC) for at forebygge resistens. Tjek altid godkendelsesstatus og følg brugsanvisningen for andre midler

FLORAMITE® 240

INSECTICID

Midemiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i pryplanter i lukkede væksthuse.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation. Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

INDHOLD

Midemiddel nr. 558-12. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Bifenazat 240 g/l (22,6 % w/w)
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Midlet er et suspensionskoncentrat fra / Distribution:

Arysta LifeScience Great Britain Ltd.,
Brooklands Farm, Cheltenham Road Evesham,
Worcestershire, WR11 2LS, Storbritannien

Læs vedlagte brugsanvisning

® Reg. varemærke fra **250 ml**



DI/2020684/13-0622

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Indånd ikke spray (P260). Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i pryplanter i lukkede væksthuse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter.

Kontakt læge.

INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsudsat tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).





FLORAMITE® 240

INSECTICID

Midemiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i prydblplanter i lukkede væksthuse.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

INDHOLD

Midemiddel nr. 558-12. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Bifenazat 240 g/l (22,6 % w/w)

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Midlet er et suspensionskoncentrat fra / Distribution:

Arysta LifeScience Great Britain Ltd.,
Brooklands Farm, Cheltenham Road Evesham,
Worcestershire, WR11 2LS, Storbritannien

Læs vedlagte brugsanvisning

® Reg. varemærke fra

20 x 250 ml



DK2202685/13-0622

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Indånd ikke spray (P260).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i prydblplanter i lukkede væksthuse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.

INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tils mudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

