

Etikette nr: 1

**GODKENDT**  
af Miljøstyrelsen:

25. oktober 2023

for pakninger på:

250 ml & 20 x 250 ml

# FLORAMITE® SC

## INSECTICID

### MIDEMIDDEL. MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SPINDEMIDER I PRYDPLANTER I LUKKEDE VÆKSTHUSE.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

#### INDHOLD

Midemiddel nr. 1046-17. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Bifenazat 240 g/l (22,6 % w/w)

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

**Midlet er et suspensionskoncentrat fra / Distribution:**

UPL Holdings Coöperatief U.A.,  
Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A,  
4818CP Breda, The Netherlands

Læs vedlagte brugsanvisning

\* Reg. varemærke fra

**250 ml**



**UPL**

DI2020684-14-0823

#### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).** Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Indånd ikke spray (P260). Bær beskyttelseshandsker (P280). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. *Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i prydplanter i lukkede væksthuse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

#### FØRSTEHJÆLP:

Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

**INDÅNDING:** Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

**ØJNENE:** Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.

**INDTAGELSE:** Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

**VED KONTAKT MED HUDEN:**

Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).



## FLORAMITE® SC

---

### Brugsanvisning

Floramite SC er et selektivt spindemiddelemiddel til brug i prydblplanter. Ved korrekt brug har Floramite SC hurtig virkning som kontaktmiddel og derudover en langtidsvirkning. Floramite SC har generelt god virkning mod spindemider, men virkningen er bedst dokumenteret for væksthusspindemiden (*Tetranychus urticae*). Floramite SC bekæmper alle mobile stadier, men der er desuden også en rimelig virkning på æg. Ramte mider bliver hyperaktive efter få timer og tager ikke føde til sig. De dør efter 3-4 dage.

### Anvendelse

Der behandles når de første spindemider konstateres. I kulturer med tæt løv, hvor det er vanskeligt at ramme spindemiderne, skal behandlingen gentages efter 7 dage. Vandmængden afhænger af kulturens højde og tæthed, da alt løv skal dækkes af sprøjtevæske.

#### Prydblplanter i væksthus:

0,04 % (40 ml pr. 100 l vand).

Maksimal dosering på 0,6 L/ha.

Der anvendes normalt 1000-1500 l vand pr. ha. Vandmængde under 1000 l bør undgås.

**Resistens.** Bifenazat tilhører en gruppe med ikke-afklaret virkemekanisme (IRAC gruppe UN). For at formindske risikoen for at der udvikles resistens over for Floramite SC, anbefales følgende brug:

- Antallet af behandlinger pr. kultur eller år må ikke overstige 2.
- Benyt et eller helst to andre produkter med forskellig virkemekanisme før næste behandling med Floramite SC.
- Kontrollér kulturen jævnligt og behandl med Floramite SC så snart angreb konstateres. Vent ikke til angrebet udvikler sig.
- Følg brugsanvisningens anvisning vedrørende dosering og vandmængde.
- Benyt mulighederne for integreret produktion, da Floramite SC kan bruges sammen med biologisk kontrol af spindemider. Integrerede metoder anbefales, da

de kan begrænse behovet for spindemidmidler.

**Tolerance:** Floramite SC er generelt et skånsomt produkt og er testet på et stort antal kulturer uden skade – selv ved dobbelt dosering. Da producenten ikke kan garantere for tålsomheden i alle nye kulturer og sorter, er det vigtigt at udføre en prøvesprøjtning på et mindre areal inden større partier behandles.

**Tilberedning af sprøjtevæske:** Fyld tanken med den halve vandmængde. Start omrøring. Tilsæt Floramite SC og derefter den resterende vandmængde. Brug vand med pH mellem 5 og 7. Lad ikke opblandet sprøjtevæske stå natten over eller i længere perioder.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

**Blandinger:** Floramite SC kan generelt blandes med andre produkter. Det anbefales dog at lave et forsøg i lille skala for at kontrollere blandbarhed og sikkerhed for kulturen før større arealer behandles.

**Opbevaring:** Opbevares køligt, men frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

**Bortskaffelse:** Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

**Bemærk:** Det kan ikke udelukkes at visse stammer af spindemider kan udvikle resistens mod dette produkt. Da udvikling af resistens er uforudsigelig, kan producenten ikke holdes ansvarlig for nogen form for skade som opstår som følge af nedsat effekt overfor resistente spindemider. Hvis der bemærkes nedsat effekt af Floramite SC, anbefales det at bruge alternative midler eller metoder. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

---

### **Mindre anvendelse af Floramite SC (1046-17) til bekæmpelse af spindemider i pryplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse**

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

#### *Midemiddel:*

- Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i pryplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og interval skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Ved anvendelse i pryplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Max 2 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår
- Ved anvendelse i pryplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: Potterne stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur).
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads uden recirkulering: For at beskytte grundvand og bier må der max udflyttes 2 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår ved dyrkning af pryplanter og planteskolekulturer. Udflytning må tidligst foretages 7 dag efter sprøjtning

**Brugsanvisning – Mindre anvendelse I åbne væksthuse***Mindre anvendelse: Til bekæmpelse af spindemider i åbne væksthuse*

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til <b>containerplads</b> med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <b>på tætte borde</b> med recirkulation.	0,6 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 150 liter 0,04 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,6 L Floramite SC pr. ha) *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Der sættes ikke en begrænsning.	<b>Uden recirkulering:</b> 7 dage.
				<b>Med recirkulering:</b> 7 dage.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <b>på jorden</b> . Potterne skal stå så tæt som muligt.	0,6 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 150 liter 0,04 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,6 L Floramite SC pr. ha) *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Max 2 kulturer pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet bifenazate	<b>Uden recirkulering:</b> 7 dage.
				<b>Med recirkulering:</b> 7 dage.

\*0,04 % opløsning (= 40 ml Floramite SC i 100 L vand)

*Sprøjteudstyr:* Bomsprøjte og kærresprøjte m. lanse.

*Forebyggelse af resistens:*

Hvis Floramite SC anvendes mere end én gang skal midlet indgå i en strategi, hvor der imellem behandlingerne anvendes et spindemiddel med en anden virkemekanisme (f.eks. Nissorun 250 SC) for at forebygge resistens. Tjek altid godkendelsesstatus og følg brugsanvisningen for andre midler.



# FLORAMITE® SC

## INSECTICID

### MIDEMIDDEL. MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SPINDEMIDER I PRYDPLANTER I LUKKEDE VÆKSTHUSE.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation. Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

#### INDHOLD

Midemiddel nr. 1046-17. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Bifenazat 240 g/l (22,6 % w/w)

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

#### Midlet er et suspensionskoncentrat fra / Distribution:

UPL Holdings Coöperatief U.A.,  
Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A,  
4818CP Breda, The Netherlands

Læs vedlagte brugsanvisning

\* Reg. varemærke fra

250 ml



UPL

DI2020684-15-0823

#### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).** Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Indånd ikke spray (P260). Bær beskyttelsehandsker (P280). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. *Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af spinde midler i prydplanter i lukkede væksthuse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

#### FØRSTEHJÆLP:

Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

**INDÅNDING:** Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

**ØJNENE:** Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.

**INDTAGELSE:** Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

**VED KONTAKT MED HUDEN:**

Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).







# FLORAMITE® SC

INSECTICID

## MIDEMIDDEL. MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SPINDEMIDER I PRYDPLANTER I LUKKEDE VÆKSTHUSE.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

### INDHOLD

Midemiddel nr. 1046-17. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Bifenazat 240 g/l (22,6 % w/w)

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Midlet er et suspensionskoncentrat

### fra / Distribution:

UPL Holdings Coöperatief U.A.,  
Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A,  
4818CP Breda, The Netherlands

® Reg. varemærke fra

20 x 250 ml



Læs vedlagte brugsanvisning

### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).** Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Indånd ikke spray (P260). Bær beskyttelseshandsker (P280). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. *Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i prydplanter i lukkede væksthuse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). **Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### FØRSTEHJÆLP:

Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  
INDÅNDING: Frisk luft.  
Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.  
ØJNE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.  
INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.  
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

