

# FLUXYR<sup>®</sup> 200 EC

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, græsmarker, samt i fodermajs.

ADVARSEL

**For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**



**SUNDHEDSSKADELIG**



**MILJØFARLIG**

Etikette nr.: I  
GODKENDT

**02 FEB. 2011**

for pakninger på 5 L  
Miljøstyrelsen

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse (R65).

Brandfarlig (R10)

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, græsmarker, samt i fodermajs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i vinter- og vårsæd ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.**

**Må på græsmarker ikke anvendes senere end 14 dage før afgræsning.**

**Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.**

**Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

**Må ikke tømmes i kloakfløb.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Indhold: 5 Liter

Batch No.: 00000

**Distributør:**

Nedab ApS,  
Bredgade 79  
5492 Vissenbjerg

**Registreringsindehaver:**

AgriChem BV  
Koopvaardijweg 9  
4906 CV Oosterhout  
The Netherlands  
Tel: 00 31 162 431 931



## BRUGSANVISNING

FLUXYR® 200 EC er et systemisk herbicid til bekæmpelse af enårig og flerårig ukrudt om foråret, især burre-snerre, stor nælde og fuglegræs i vintersæd og vårsæd, i fodermajs og i nysåede eller etablerede græsmarker. Aktivstoffet fluroxypyr har auxinvirkning. Aktivstoffet findes som methyl heptyl ester.

Det bedste resultat opnås ved bekæmpelse af ukrudt på tidlige udviklingstrin og under gode vækstbetingelser i afgrøder der efterfølgende kan give god konkurrence. Temperaturen på behandlingstidspunktet bør være over 12 °C.

Behandl ikke afgrøder som er under stress fra f.eks. tørke, vandlidende jord, varme og kuldeekstremer, sygdomsangreb, næringsmangel o. lign.

Sprøjt ikke med udsigt til frost eller hvis nattemperaturerne er lave.

### Anvendelse og dosering

#### 1. KORN

FLUXYR® 200 EC kan anvendes på alle sorter af vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterhavre, vinterrug, durum hvede og triticales.

Må ikke anvendes i afgrøder med udlæg af kløver eller andre bælplanter. Afgrøder med udlæg af græs må sprøjtes forudsat at græsset er i buskningsstadiet.

#### Forårssprøjtning i vinterafgrøder

Vinterhvede og vinterbyg: Anvendes når 3. knæ er mærkbart til det stadie hvor skedehinden på fanebladet netop er synligt.  
Dosering: 0,6-0,7 L/ha

Vinterhavre, vinterrug, durum hvede og triticales: Anvendes fra 2 bladsstadiet indtil 2. knæ er mærkbart.  
Dosering: 0,6-0,7 L/ha

#### Forårssprøjtning i vårsæd

Vårhvede og vårbyg: Anvend fra 2 bladsstadiet indtil fanebladets bladskede begynder at strække sig.  
Dosering: 0,5-0,7 L/ha

Vårhavre: Anvend fra 2 bladsstadiet indtil 2. knæ er mærkbart.  
Dosering: 0,5-0,7 L/ha

#### Vandmængde:

FLUXYR® 200 EC udsprøjtes i 150-400 L vand/ha. Den laveste vandmængde må kun bruges i en meget åben afgrøde på små ukrudtsplanter. Ved senere anvendelse, hvor afgrøden er tæt, øges vandmængden til 400 L/ha.

Ved bekæmpelse af spildkartofler anvendes 200-300 L vand/ha.

#### 2. FODERMAJS

Anvendes når majsplanten har mellem 3 og 6 blade, men før afgrøden er højere end 20 cm. Bør ikke anvendes når siderødder udvikles fra første knæ.

Dosering:  
0,54-1,35 L/ha

Vandmængde:  
Anvend 200-300 L vand/ha

### 3. GRÆS OG FRØGRÆS

FLUXYR® 200 EC kan anvendes i etablerede græsmarker eller nysåede græsmarker når græsset har mindst 3 fuldt udviklede blade. Behandlingen skal ske om foråret. Det er vigtigt at ukrudtet er i vækst når behandlingen foretages. Sprøjtefristen for græs er 14 dage.

Dosering:  
1,35-1,8 L/ha  
Vandmængde:  
Anvendes i 200-400 L vand/ha. Største mængde i en tæt afgrøde.

#### **Bemærk:**

Halm og plantemateriale der har været behandlet med Fluxyr® 200 EC må ikke anvendes i drivhus eller til kompost.

#### **Tilberedning af sprøjtevæsken:**

Før sprøjtning er det vigtigt at kontrollere alle slanger, filtre og dyser og sikre sig at sprøjten er ren og korrekt indstillet.

Fyld tanken halvt med vand. Tilsæt den nødvendige mængde FLUXYR® 200 EC. Efterfyld med den nødvendige mængde vand. Omrør grundigt før og under udsprøjtning. Sprøjtevæsken skal bruges med det samme.

#### **Sprøjteteknik:**

Dyser	Bar	Km/t	L/ha
ISO 02	3	6,4	150
ISO 025	3	6,0	200
ISO 025	3	4,8	250
ISO 04	3	6,4	300
ISO 04	3	4,8	400

Undgå vinddrift da naboafgrøder kan skades. Anvend evt. lowdrift dyser.

#### **Rengøring af sprøjten:**

##### **Sprøjte med tankspuledyse:**

1. Tøm sprøjten i marken for sprøjtevæske. Skyl sprøjten indvendig og udvendig med rent vand. Tøm skyllevandet ud af sprøjten over det behandlede areal.
2. Fyld tanken, 10-15 % af tankkapaciteten. Tilsæt passende rengøringsmiddel. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 min. Tøm sprøjten over et egnet areal.
3. Rens dyser, filtre og sier i vand med rensmiddel.
4. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten over et egnet areal.

##### **Sprøjte uden tankspuledyse:**

Som ovenfor, blot fyldes tanken helt med vand og rengøringsmiddel under pkt. 2

### **Bortskaffelse af tom emballage**

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skylllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

### **Førstehjælp**

Indtagelse: Undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Skyl straks grundigt med vand og kontakt læge.

Hudkontakt: Vask straks grundigt med vand og sæbe. Fjern forurenede tøj.

Indånding: Hvis sygdomstegn opstår, flyt skadelidte ud i frisk luft. Kontakt læge. Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt.

Ukrudtsmiddel nr. 594-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Fluroxypyr 200 g/l (20,4 %)

Indeholder solventnaphta(råolie), tung aromatisk