

Formule 1®

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i spinatkulturer til frø, avlet på kontrakt.



ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Meget giftig for organismer, der lever i vand (R50).
Undgå kontakt med huden (S24).
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensationen bortfalder den 16. juli 2013.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdata-blad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenfor fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i spinatkulturer til frø avlet på kontrakt.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Formule 1®, eller andre midler indeholdende asulam, må kun anvendes hvert fjerde år på det samme areal.

Der skal anvendes båndsprøjte.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde og virkning

Formule 1® må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i spinatfrø, avlet på kontrakt. Sprøjtningen gennemføres når spinaten har min. 2 blivende blade.
Formule 1® er et systemisk middel, der optages gennem planternes blade og rødder og fordeler sig med saftstrømmen rundt i hele planten.

Den bedste effekt opnås, når planterne har optimale vækstforhold, dvs. middel jordfugtighed og høj luftfugtighed. Temperaturen bør være over 8-10 °C. Bedst effekt opnås ved temperaturer over 20 °C. Anvendes Formule 1® under andre forhold, må der forventes en langsommere effekt af behandlingen. Størrelsen af ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Dosering og anvendelse

1-2 l Formule 1® tilsat 0,5 l spredningsmiddel pr. ha eller
1-2 l Formule 1® tilsat 1-1,5 liter godkendt phenmedipham-middel pr. ha.
Den angivne dosering gælder i sprøjtebåndet.
Formule 1®, eller andre midler indeholdende asulam, må kun anvendes hvert fjerde år på det samme areal.

Sprøjteteknik

Båndsprøjtning er et krav. Udsprøjtningen foregår med båndbredde på 20 cm og der anvendes en rækkeafstand på 50 cm. For at sikre den bedste fordeling i sprøjtebåndet anbefales en "even spray" dyse eks. Hardi 4680 E.
Støv på bladene nedsætter effekten af Formule 1®, hvorfor det frarådes at sprøjte i forbindelse med radrensning.

Tilberedning af sprøjtevæsk

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsk begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Tanken fyldes halvt op med rent vand, og omrøringen startes.
Formule 1® hældes i tanken, som efterfyldes med vand. Sørg hele tiden for god omrøring.
Ved omgang med sprøjtemidler, bør altid anvendes egnede værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesbriller.

Præparatfyldedyer

Ved anvendelse af præparatfyldedyer og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.



Lokalirriterende



Miljøfarlig

Efterfølgende skylles præparatfyldedyer, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Formule 1® i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjten tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldedyer:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldedyer. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamlings til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Bortskaffelse af rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale ordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares på et køligt, tørt, sted i original emballage. Undgå stærk opvarmning og frost. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer, foderstoffer og medicin. Opbevares utilgængeligt for børn.

Førstehjælp

Indånding: Bring patienten ud i frisk luft. Ved fortsat ubehag skal der søges lægehjælp.
Kontakt med huden: Fjern forurenet tøj, evt. også smykker og armbåndsur. Vask med rigeligt vand og sæbe. Er der efterfølgende vedvarende hudirritation, skal der søges lægehjælp.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Der skal altid søges lægehjælp.

Indtagelse: Der må ikke fremprovokeres opkastning. Søg straks lægehjælp. Den behandelende læge afgør om opkastning skal fremprovokeres.

Er patienten stærkt påvirket/bevidstløs, tilkald da ambulance (112), oplys, at der er tale om forgiftning. Har patienten indtaget midlet, skal man ikke udføre evt. kunstigt åndedræt ved hjælp af mund til mund metode.

Medbring brugsanvisningen, sikkerhedsdatablad eller dunken ved lægekontakt. En læge der behandler kan indhente mere information på tlf. 82 12 12 12 - Giftlinjen - Bispebjerg Hospital.

Ukrudtsmiddel nr.: 594-12

Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation af 11. februar 2013.

Vandopløseligt koncentrat

Analyse: Asulam 400 g/l (34%)

Nettoindhold: 5 L

Registreringsindehaver:

AgriChem B.V.
Koopvaardijweg 9
4906 CV Oosterhout, Holland

Distributør:

Nedab ApS
Bredgade 79
5492 Vissenbjerg

Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.