




MAKHTESHIM
A G A N
BENEUX & NORDIC

FOX 480 SC

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticales), vårbyg, vinterraps og frøgræs.

Ukrudtsmiddel



Deklaration : Ukrudtsmiddel nr. 396-27

Analyse : bifenox 480 g/l (40.6%)
flydende

Væske : nettointhold **5 L**

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Godkendelseindehaver:

Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87
NL-3832 GK LEUSDEN, Holland
www.mabeno.com

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

Overtredelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticales), vårbyg, vinterraps og frøgræs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i hvede, rug og triticales ikke anvendes senere end vækststadium 29. Må i byg ikke anvendes senere end vækststadium 22. Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadium 16.

Der må ikke plantes/sås efterfølgende afgrøder før tidligst efter 120 dage efter brug i vinterraps, hvede, rug, triticales, byg og frøgræs.

Halm fra hvede, rug, triticales, byg og frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdpladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelt

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadedstue ved vedvarende ubehag/forstyrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding

Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

Hudkontakt

Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.



UN 3082



Miljøfarlig

T3607A/02

FOX 480 SC

BRUGSANVISNING

Afgrøder

Fox 480 SC kan anvendes i vinterhvede, -rug, -byg, triticale, vårbyg, vinterraps og frøgræs.

Virkemåde

Fox 480 SC virker på 2-kimbladet ukrudt og kan bruges om efteråret i vinterraps og frøgræs og om foråret i de øvrige afgrøder. Lys og høj luftfugtighed øger herbicid virkningen.

Bifenox som er aktivstoffet i Fox er et systemisk middel, som virker ved at ødelægge cellemembranerne i ukrudtsplanterne. Desuden vil det aktivstof som rammer jorden danne en film på jordoverfladen som hæmmer fremspiring af nyt ukrudt.

Dosering, behandlingstidspunkt og virkningsspektrum

Fox 480 SC kan bruges om foråret i vintersæd og vårbyg. Vinterraps og frøgræs behandles om efteråret.

Forårsbehandling i vintersæd og vårbyg

0.375-1.2 l/ha - BBCH 21-22, fra alt ukrudt er fremspiret og indtil ukrudtets 6-bladstadiet.

Meget god - god effekt: Ærenpris, hvidmelet gåsefod, hanekro, tvetand, snerlepileurt.

Tilfredsstillende effekt: Agerstedmoder, burresnerre, hydretaske, markförglemmigej, vejpileurt.

Utilstrækkelig effekt: Fuglegræs, kamille og spildraps.

For at opnå en bredere effekt kan der tankblandes med andre ukrudtsmidler, se afsnittet om tankblandinger.

Efterårsbehandling i vinterraps

0.50-0.75 l. Fox pr. ha når 90% af rapsen er i st. 14-16. Det er nødvendigt, at 90% af rapsplanterne er i st. 14 før behandlingen udføres.

Fox 480 SC kan anvendes i kombination med Kerb 500 SC som forbedrer effekten overfor fuglegræs og græsser.

Efterårsbehandling i frøgræs

1.0-1.5 l/ha i frøgræs efter høst af dæksæd (genvækst på 1-2 blade).

Effekter i frøgræs afhænger af om det er nyfremspiret ukrudt eller ældre planter.

Tankblandinger

Fox bør indgå i tankblandinger i vårsæd og vintersæd med: Briotril 400 EC, Oxitril CM, Express ST, Tomahawk 180 EC og Starane 180.

Hvor der er problemer i vinterraps med fuglegræs og enårig rapgræs bør Fox indgå i en strategi med Kerb, og hvor der er problemer med kamille, kan der suppleres med Matrigon i foråret.

Sprøjeteknik

Dyser	Bar	Km/h	L/ha
ISO-F-110-0.2 Gul	3	6,4	150
ISO-F-110-0.3 Blå	3	7.2	200
ISO-F-110-0.4 Rød	3	6.4	300
Der kan også anvendes LD dyser			

Optimale behandlingsforhold

Fox kan anvendes i det tidlige forår i vintersæd blot temperaturen er over 0 °C. Hvis jorden er frossen kan behandlingen godt foretages blot der ikke er store temperaturudsving mellem nat og dag. Det er vigtigt, at planterne er tørre når behandlingen foretages. Efter behandlingen er afsluttet kræves der 4-6 timers tørvej, for at opnå fuld effekt af behandlingen. Høj luftfugtighed fremmer også effekten af Fox. I det hele taget bør der behandles på en veludviklet og sund afgrøde som ikke er stresset på grund af vandlidende jord, tørke eller andre faktorer som påvirker planterne negativt.

Efter behandling med Fox kan der på afgrøden komme enkelte hvide pletter på bladene. Pletterne vil forsvinde i løbet af 7-14 dage efter behandling og vil ikke have nogen negativ indflydelse på udbyttet. I enkelte tilfælde er der dog i rug set en kraftig påvirkning af afgrøden. Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme et lille udbyttetab i en rugmark som er kraftig påvirket.

Raps er følsom overfor Fox når den er under st. 14, derfor er det vigtigt at alle rapsplanter (>90%) er over st. 14.

Omsåning

Ved omsåning kan der efter en pløjning eller harvning såes korn, raps, majs og kartofler. Der må ikke plantes/sås efterfølgende afgrøde før tidligst 120 dage efter brug i vinterraps, hvede, rug, triticale, byg og frøgræs.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter sprøjtning rengøres sprøjten grundigt både ind- og udvendig. Dette bør ske på et bevokset areal eller hvor opsamling af skyllevand er muligt og altid i god afstand til brønde og borerger.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæsken.




MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC

FOX 480 SC

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg, vinterraps og frøgræs.

Ukrudtsmiddel



Deklaration : Ukrudtsmiddel nr. 396-27

Analyse : bifenox 480 g/l (40.6%)
flydende

Væske : nettoindhold **4 x 5 L**

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg, vinterraps og frøgræs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 29. Må i byg ikke anvendes senere end vækststadium 22. Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadium 16.

Der må ikke plantes/sås efterfølgende afgrøder før tidligst efter 120 dage efter brug i vinterraps, hvede, rug, triticale, byg og frøgræs.

Halm fra hvede, rug, triticale, byg og frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurenning via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelt

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skade-stue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding

Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

Hudkontakt

Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.



UN 3082




Miljøfarlig

T3607C/02



UN 3082

**Environmentally
dangerous substance,
liquid, n.o.s.
(metamitron).**



T3607D/01

