



GAMMA C

Insektmiddel

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, havre, spelt, rug, triticale, vinter- og vårraps og i ærter

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-75

Aktivstof: gamma-cyhalothrin

Koncentration: 60 g/l (5,9 %)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler

Formulering: Flydende

Emballage: **1 liter**



Lokalirriterende



Miljøfarlig



FARLIG FOR BIER

Førstehjælp:

- Generelle anvisninger:** Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten
- Indånding:** Ro, frisk luft og lægehjælp.
- Hudkontakt:** Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
- Øjenkontakt:** Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.
- Indtagelse:** Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding
Tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Brugsanvisning

Generelt

Gamma C er et høj aktivt og bredtvirkende pyrethroid. Gamma C virker som et kontakt middel. Midlet er et kontaktmiddel, så sørg for en god dækning af afgrøden.

Afgrøder, skadegørere, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde	Skadegører	Dosering	Tidspunkt	Bemærk
Havre, hvede, spelt, rug, triticale og byg	Bladlus	50 ml/ha	Ved konstateret angreb efter varsel, eller når skadestærskel nås	Max 3 beh. i hvede og byg årligt
Vår og vinterraps	Jordlopper, rapsjordlopper, glimmerbøsser, skulpesnudebiller, skulpegalmug	60 ml/ha	Ved konstateret angreb efter varsel, eller når skadestærskel nås	Max 3 beh. årligt
Ærter	Bladrandbiller, ærteladlus, ærtetviller	50 ml/ha	Ved konstateret angreb efter varsel, eller når skadestærskel nås	Max 3 beh. årligt

Skadestærskler

Afgrøde	Skadegører	Vækststadium	Skadestærskel
Vinter og vårhvede, vårbyg	Bladlus	Til og med v.s. 73	40% angrebne planter hvis ingen svampebekæmpelse ellers 25%
Vårraps	Glimmerbøsser	Tidligt knopstadium	1 bille pr plante
		Sent knopstadium	3 biller pr plante
Vinterraps	Skulpesnudebiller	Ved beg. blomstring	6 biller pr plante
Ærter	Bladrandbiller	Tidlige sækstadium	1 grav pr plante

Sprøjt altid udenfor biernes flyvetid, dvs fra 21.00 til 03.00

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar. Anvend eventuelt lowdrift dyser for at minimere afdriften.

Tankblanding

Gamma C kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Resistens

Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Gamma C og andre pyrethroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme. Resistens forebygges ved at veksle mellem midler med forskellig virkningsmekanisme.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Gamma C skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R38 Irriterer huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug ansigtsskærm under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovlige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, havre, spelt, rug, triticale, vinter- og vårraps og i ærter. Må ikke anvendes mod andre skadegørere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i hvede, havre, spelt, rug, triticale og byg ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i raps ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i ærter ikke anvendes senere end 14 dage før høst. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid – fra kl. 03.00 til kl. 21.00 (dansk sommertid). Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.