



Gaucho® ws 70

20 kg

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til bejdsning af roefrø i lukkede industrielle anlæg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

UN 3077

25-02-2016

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).
Undgå udslip til miljøet (P273).
Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af roefrø i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakfløb.

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.



De bejdsede frø er bejdsset med Gaucho WS 70 som indeholder imidacloprid. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338)

Indtagelse: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

BRUGSANVISNING

Gaucho WS 70 er et insektmiddel, der anvendes ved pillering af bederoefrø for beskyttelse mod skadedyr i den første del af vækstsæsonen. Pilleringen skal udføres på grundlag af indgået kvalitetsaftale med Bayer CropScience. Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Dosering

Gaucho WS 70 anvendes med 85 g produkt (60 g a.s.) pr. 100.000 frø (unit).

Virker mod:

Gaucho WS 70 virker mod runkelroebille samt tidlige angreb af ferskenbladlus, bedebbladlus og thrips. Desuden opnås en reducerende virkning på angreb af bedeflue.

Bedebbladlus	Aphis fabae
Bedeflue	Pegomyia hyoscyami
Ferskenbladlus	Myzus persicae
Runkelroebille	Atomaria linearis
Thrips	Thrips angusticeps

Virkningsforhold

Gaucho WS 70 transporteres systemisk rundt i planterne fra roeplantens rodsystem. Gaucho WS 70 virker både som kontakt og mavegift.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Resistensdannelse

Gaucho WS 70 indeholder aktivstoffet imidacloprid der tilhører gruppen af neonicotinoide (IRAC gruppe 4A). Gruppen vurderes af have lav risiko for udvikling af resistens ved anvendelse som bejdsmiddel i roer.

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Ansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

7.2014

Insektmiddel, nr. 18-325.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse

imidacloprid700 g/kg (70% w/w)

Netto 20 kg

Pulver

Midlet er et vanddispergerbart pulver til bejdsning.

Fabr. nr.: se påklæbde seddel

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.

® is a registered trademark of the Bayer Group

Mindre anvendelse af Gaucho WS 70 (18-325) til bejdsning mod runkelroebiller i spinat til frøavl.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Gaucho WS 70 til bejdsning mod runkelroebiller i spinat til frøavl.

Insektmiddel

- Må kun anvendes til bejdsning af spinat til frøproduktion.
- Halm og rester må ikke opfodres.

Advarsel:

Se Gaucho WS 70 etiketten.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Gaucho WS 70 til bejdsning mod runkelroebiller i spinat til frøavl.

Afgrøde	Skadegører	Dosering	Bemærkning
Spinat til frøavl	Runkelroebiller	30 g (21 g a.s.) pr 100.000 spinatfrø	Der må maksimalt udsås 280.000 frø pr. ha, fx 220.000 hunplanter (frø) og 60.000 hanplanter (frø) pr. ha.

Teknik/udstyr: Bejdsningen skal foregå i lukkede industrielle anlæg.

Mærkning af bejdsset udsæd

På pakningen med udsæd påføres en etiket, med følgende tekst:

Må kun anvendes til frøavl. Der må maksimalt udsås 280.000 frø pr. ha. De bejdsede frø er bejdsset med Gaucho WS 70 som indeholder imidacloprid. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv. Halm og rester må ikke opfodres.

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk

Bayer