

GLOPPYR 100 SL

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 361-12

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Etiket nr.: III
GODKENDT

- 1 OKT. 2009

for pakninger på: S H.
Miljøstyrelsen

UKRUDTSMIDDEL
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hver 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.

Analyse : 100 g/liter Cloppralid (9,56% w/w)

FORSICHTIG

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Vær opmærksom på, at Arbejdslivsmidlet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelle lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdslivsmidlets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overstrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2 1/2 måned før høst, i raps ikke senere end 3 måned før høst. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

BRUGSANVISNING

Anvendelse

Cloppyr 100 SL er velegnet til bekæmpelse af bredbladede ukrudtsarter i roer og vinterraps samt til pletsprøjtning i skovkulturer. Cloppyr 100 SL oplages primært gennem bladene.

Dosering

Bedste effekt af Cloppyr 100 SL opnås når ukrudtet er i god vækst, og temperaturen over 15°C. Det frarådes at sprøjte, under ekstremt høje temperaturer.

Afgørder	Dosering	Tidspunkt
Bederoer, rødbeder Rosenkål (*) (**)	Max 0,25 l/ha + 0,5 l/ha Suderole	Foran sammen med andre produkter Bedst bekæmpelse opnås ved håndsprøjtning i 12,5 cm bredde ved 50 cm rækkeafstand
Vinterraps (*)	0,80 l/ha + 0,5 l/ha Suderole	Forår planter i god vækst temp. 10-20°C
Skovkulturer (***)	1,50 l/ha + 0,5 l/ha Suderole	Om foråret

(*) Der kun må behandles hvert 4. år

(**) Må kun bånd- eller pletsprøjttes

(***) Må kun pletsprøjttes

Forhånder:

Aartheuqneems Andel

Silkeborgvej 25

8464, Galtten

Tel. 86943011

Registreringsindehaver:

Agriphar S.A.

Rue de Renoy 26

B-7402 Ougrée (Belgien)

Ukrudtsarter

Cloppyr 100 SL anvendes primært til bekæmpelse af kurvblomstrede arter som kamille, tidsel, svinemælk, harnad, gul oksølle, grå byrke, brandbæger samt snælleplæunt.

Bederoer

Anvend 0,25 l/ha i kombination med andre bredspektrede ukrudtsmidler. Midlet må kun bruges til plet eller båndsprøjtning og kun hvert 4. år.

Vinterraps

Der sprøjtes med 0,8 l/ha Cloppyr 100 SL når væksten begynder om foråret.

Må kun anvendes hvert 4. år.

Blandinger

Cloppyr 100 SL kan normalt blandes med de mest anvendte midler. Husk altid at læse etiketten på blandingsspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.

Cloppyr 100 SL bør ikke blandes med Safaril.

Tilberedning af sprøjtewæske

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Cloppyr 100 SL og fyld resten af vandet i. Tilsæt eventuel tankblandingspartner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter per hektar.

ISO - AIm faldsprøjtser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysetørrelse	Vedelse (l/minut)	Væskemængde (l/ha)
02	0,8	160
025	1,0	200
03	1,2	240

Uønskede effekter

Aldrig kan skade kartofler, tomater og andre planter i natskyggeligheden, ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter samt gulrødder og andre skærplanter. Uønskede plantester fra en behandlet afgrøde kan give lokale skader på næste afgrøde. Plantemateriale fra en behandlet afgrøde bør ikke bruges i drivhuse eller til kompost.

Efterfølgende afgrøder/ omsåning

I efteråret kan der kun ses vinterraps og vinterraps. Næste forår kan korn, græs, majs, bederoer og vårraps etableres, kartofler, ærter, kløver, gulrødder og andre følsomme afgrøder kan kun etableres efter en efterårspløjtning. Hvis halmen ikke fjernes, skal den være smuldet og jævnt jordet før nedpløjtning.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Rengøring

Sprøjtten rengøres grundigt efter sprøjtningen med rent vand tilsat egnet rengøringsmiddel. Vaskewandet udspøjttes på allerede behandlede arealer.

Førstehjælp

Indåndning: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse:

Fremprovoker ikke opkast, opsig læge og vis denne beholder eller etiket. Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

GLOBACHEM NV

Leuvenweg 138 • B-3803 Sint-Truiden • Belgium

Tel.: +32 (0)71 78 57 17 • Fax: +32 (0)71 68 15 65

E-mail: globachem@globachem.com

Web: www.globachem.com



Globachem

DK