

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på etablerede græsplæner

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer øjnene (R36)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Undgå kontakt med huden

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsplæner.

Må ikke anvendes efter d. 1. august.

Må kun anvendes én gang om året.

Må ikke udbringes med vandkande.

Må ikke anvendes på græsarealer der anvendes til afgræsning/opfodring.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se brugsanvisningen).

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning eller ej, skal tages af den tilsynsførende læge.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Fjern forurenede tøj.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Ukrudtsmiddel 64-52

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Fluroxypryr40g/l (3,63 % w/w)

Copryralid20g/l (1,82% w/w)

MCPA200g/l (18,22% w/w)

Midlet indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

Indhold5 liter



Lokalirriterende



Miljøfarlig

Dow AgroSciences

GREENOR*



Producenten garanterer for varens kvalitet og ensartethed, samt at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader, utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet.

Ukrudtsmiddel

Indhold: 5 liter e

Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Lyngby · Tel: 45 28 08 00
www.dowagro.dk

*Varemærke – Dow AgroSciences LLC



P 0 0 1 4 0 6 1 6 1 0

Brugsanvisning

GREENOR* er et systemisk og kontaktvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i plæner, på golf- og boldbaner samt i parker. Bekæmpelsen foretages forår eller sommer. GREENOR optages gennem bladene og transporteres i vækstpunkterne, hvor celledelingen i rod- og skudspidser blokeres.

Ukrudtsplanterne vil visne bort i løbet af 2 – 3 uger.

GREENOR er regnfast 2 timer efter udsprøjtning.

Bemærk:

GREENOR er et bredspektret ukrudtsmiddel der effektivt bekæmper de mest almindelige tokimbladede ukrudtsarter i græsplaner. Den bedste ukrudtskontrol opnås, når planterne er i god vækst.

Ukrudtsplanternes kimbladsstadiet og op til 6 blivende blade bekæmpes lettest. Ved høj ukrudtsbestand anvendes den højeste anbefalede dosering.

Anbefalede doseringer for GREENOR	Dosering l/ha
Agersennep, burresnerre, bellis(tusindfryd), bleg-pileurt, brandbæger, fersken-pileurt, forglemmigøj, fuglegræs, gåsefod, hanekro, haremad, hønsetarm, kamille, hyrde taske, kløver, kålarter, mælkebøtte, nælde, pengeurt, raps, snerle-pileurt, svinemælk, svinemælde, smørblomst, valmue, vej-pileurt* og tvetand	4 - 5
Jordrøg, stedmoder, spergel, tidsel og vejbred	5 - 6

* God effekt på vej-pileurt ved behandling på kimbladstadiet.

Ny-etableret græs kan behandles med GREENOR 2 måneder efter såning eller ved græssets 5 bladsstadiet.

Behandling på ny-etableret græs først 5 dage efter klipning.

Eftersåning kan foretages igen 3-4 uger efter behandling.

Undgå klipning af græsset indtil 3 dage før og 3 dage efter behandling.

Sprøjteteknik:

Der anvendes 150 – 400 l vand pr. 10.000 m². GREENOR anvendes med god virkning når temperaturen på behandlingstidspunktet er over 10° - 12°C.

Sprøjtning med GREENOR frarådes, når ukrudtet er under stress på grund af tørke, vandlidende jord, samt hvis der er udsigt til en periode med frost omkring behandling. Det anbefales **ikke** at iblande gødning ved udsprøjtning af GREENOR opløsningen.

Tilberedning af sprøjtewæske:

Fyld beholderen halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde GREENOR. Resten af vandet tilsættes. Foretag omrøring eller ryst væskebeholderen under blanding og før udsprøjtning samt under udsprøjtning.

Lagring:

Hold beholderen lukket og opbevar GREENOR frostfrit.

Bemærk:

Mange grøntsager, blomster, prydblatter og træer kan skades af GREENOR. Ved udsprøjtning nær sådanne kulturer, skal man undgå at vinddrift får sprøjtewæsken til at drive over på planterne. Undlad at anvende græs behandlet med GREENOR til kompost. Sørg for at rense sprøjten grundigt efter anvendelse. Anvend vand tilsat 10 ml 3% ammoniak(salmiakspiritus) per liter vand. Skyl slanger og dyser. Skylllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker.

Tom emballage:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylllevandet hældes op i sprøjtewæsken.