

GRO-STOP® INNOVATOR

Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af oplagrede kartofler til industriel brug.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsæssigt og kræver gyldig autorisation.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Kan skade det ufødte barn (H360D).

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373).

Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411).

Indånd ikke tåge (P260).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj /ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overlydelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til spirehæmning af oplagrede kartofler til industriel brug.

Må kun udbringes med thermal fog-systemer i aflukkede opbevaringsrum.

Må ikke anvendes senere end 30 dage for forarbejdning af kartoflerne.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved ubehag.


Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op og fjern eventuelle kontaktlinser.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Ved hudirritation eller udslet:

Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).



Etiket nr.: 1
GODKENDT
16. juni 2016

for pakninger på
Miljøstyrelsen 10L &
2x10L

INDHOLD

Vækstreguleringsmiddel, nr. 631-2.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Analyse: Chlorpropham 300 g/l (32 % w/w)

Midlet er en ULV opløsning. Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

10 liter

Registreringsindehaver:

Certis Europe B.V.
Safariweg 55
3605 MA Maarssen
Holland



Salg og rådgivning:

Nordisk Kalkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

BRUGSANVISNING

GRO-STOP® INNOVATOR indeholder chlorpropham (CIPC) som virker spirehæmmende på kartofler. Behandlingen af kartoffelknoldene skal foretages inden de begynder at spire, men efter sårhelingen.

Behandlingen foretages ved hjælp af varm eller kold tåge-generator. Der er vigtigt, at kartoffelknoldene inden behandling fordeles jævnt på lageret (ikke stablet i en kogle).

Ved anvendelse lige efter høst inden kartoffelknoldene er skindfaste kan CIPC skade skindet på søde kartofler (feks. sorter med tynd hud) og/eller ved utilstrækkelig sårheling. Behandling af ikke-skindfaste knolde kan forlænge sårhelingsprocessen. Langsom sårheling kan øge risikoen for infektion med lagersydomme. Resultatet af spirehæmning med CIPC afhænger derfor af sorten, høstkvaliteten, opbevaringsstedet, opbevaringstemperaturen, knoldsydomme og andre faktorer. For at reducere risikoen for skader på kartoffelknoldenes overflade, udvikling af lagersydomme og andre skadelige bivirkninger bør følgende overvejes:

- Kartofler, som skal behandles, skal være i hvile, skindfaste, tørre og rene.
- Knoldenes sårhelingsproces skal være afsluttet.
- Sygdomsinficerede og ødelagte knolde skal fjernes.

Fremgangsmåde

Før behandling: Ventil& kort for at fjerne CO₂ fra lageret. Luk alle luftindtag og sæt ventilationen på intern cirkulation. Kontrol& at ventilationen sker ensartet og uden hindringer, men så afpasset at en tændt tændstik lige akkurat blæfrer overst i lageret.

Behandling: Lad tågegeneratoren forstøve tåge ind i luftstrømmen, som derved cirkuleres gennem boksen med kartoffelknolde. Lad apparatet arbejde indtil den forud fastsatte mængde er blæst ind. Lad derefter den interne cirkulation arbejde, indtil tågen er forsvundet.

Efter behandling: Hold lageret lukket yderligere 6-8 timer. Herefter kan ventilation ske efter de normale behov. Gå ikke ind på lageret før det er velventileret. Produktet kan anvendes både til varmt og koldt tågeudstyr.

Dosering:

Maksimal dosering: 100 ml pr.1000 kg kartofler, splittet op i flere doseringer. Den første dosering skal ske, når sårhelingen er komplet (efter 2-3 uger).

Hvis der foretages en basisbehandling med CIPC, når kartoflerne føres på lager, skal den efterfølgende behandling med Gro-Stop Innovator foretages, så den maksimale

mængde aktivstof ikke overskrider 30 g pr. ton kartofler.

Månedlig dosering: Når sårhelingen er komplet (efter 2-3 uger), anvendes maksimalt 25 ml pr. 1000 kg kartofler. Fire uger efter den første dosering følges op med 12,5 ml pr. 1000 kg kartofler.

Behandlingerne skal ske med 4 ugers interval. Der må maksimalt foretages 6 behandlinger efter den første. (Pr. 1000 kg kartofler: 1 x 25 ml Gro-Stop Innovator og 6 x 12,5 ml Gro-Stop Innovator).

Ugentlig dosering: Når sårhelingen er komplet (efter 2-3 uger), anvendes der pr. uge maksimalt 6 ml pr. 1000 kg kartofler i fire uger. Derefter anvendes 3 ml pr. 1000 kg kartofler om ugen i resten af lagringsperioden. Der må i alt anvendes op til 100 ml pr. 1000 kg kartofler.

VIGTIGT

Udsæd af enhver art må ikke opbevares i bygninger, hvor kartofler behandles. Der er også en risiko for skade på frø, som håndteres eller opbevares i bygninger eller kasser, som tidligere er behandlet. Dette gælder for læggekartofler, maltbyg, sædekorn og græsfrø samt ALLE andre slags frø og plantematerialer til forering, såsom hindbærstiklinger.

Opbevaring

Gro-Stop Innovator opbevares i køligt, velventileret og frostfrit rum.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Værnemidler

Brug handsker af nitrilgummi eller neopren, støvler, beskyttelsesdragt og høreværn.

Personale må ikke gå ind på lageret førend friskluftventilationen har kørt nogle timer. Hvis det alligevel er nødvendigt, skal ovennævnte værnemidler samt åndedrætsværn med filter A2P2 anvendes.

GRO-STOP® INNOVATOR

Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af oplagrede kartofler til industriel brug.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

INDHOLD

Vækstreguleringsmiddel, nr. 631-2.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidelforordningen 1107/2009

Analyse: Chlorpropham 300 g/l (32 % w/w)

Midlet er en ULV opløsning. Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

2 x 10 liter

Registreringsindehaver:
Certis Europe B.V.
Safariweg 55
3605 MA Maarssen Holland



Salg og rådgivning:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Kan skade det ufødte barn (H360d).

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373).

Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411).

Indånd ikke tåge (P260).

Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj /ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overlydelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til spirehæmning af oplagrede kartofler til industriel brug.

Må kun udbringes med thermal fog-systemer i aflukkede opbevaringsrum.

Må ikke anvendes senere end 30 dage før forarbejdning af kartoflerne.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved ubehag.

Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op og fjern eventuelle kontaktlinser.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Ved hudirritation eller udslæt:

Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

