



Herbatox

BV Plænerens

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i etablerede græsplæner.

1,5 Ltr.

Mechlorprop	250 g/l
MCPA	150 g/l
Dicamba	12 g/l

Herbatox BV Plænerens

FORSIGTIG

Vask huden efter arbejdet og undgå kontakt med midlet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i græsplæner.

Må ikke udbringes med vandkande.

Må ikke anvendes efter den 1. august.

Må kun anvendes én gang om året.

Må ikke anvendes på græsarealer der anvendes til afgræsning/optodring.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler, samt foderstoffer.

INDHOLD

Ukrudtsmiddel, nr. 16-169

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Mechlorprop	250 g/l
MCPA	150 g/l
Dicamba	12 g/l

Fabr.nr.

Bayer Environmental Science
Nørgaardsvej 32
Postbox 2040
2800 Kgs. Lyngby



BRUGSANVISNING

Herbatox Plænemiddel bekæmper bredbladet ukrudt som f.eks. agertidsel, bellis (tusindfryd), borst, brunelle, høgeurt, hønsetarm, kløver, kongepen, mælkebøtte, pileurt, potentil, ranunkel, røllike, vejbred og ærenpris.

Kløver, potentil, ranunkel og ærenpris kan være vanskelig at bekæmpe.

Virkemåde

Herbatox Plænemiddel optages gennem bladene. Derfor udryddes kun fremspiret ukrudt - bedst i forårs- og forsommeren, når ukrudtet er i god vækst. Må ikke anvendes efter 1. august. Plænen skades ikke. Nysåede plæner tåler dog først behandling efter 3 - 4 måneder.

Dosering

Der udsprøjtes 1,5 l Herbatox Plænemiddel pr. 1000 m². Det svarer til 1,5 ml pr. m².

Udbringning

På mindre arealer udbringes Herbatox Plænemiddel med havesprøjte.

Der anvendes 30 ml middel i 2 l vand pr. 20 m².

Bemærk

Hold husdyr borte mindst 1 døgn efter behandling.

Græsset bør ikke klippes 4 - 5 dage før og 3 - 4 dage efter sprøjtning. Regn indenfor 6 timer efter behandling kan forringe virkningen.

Sprøjt helst på tørre plæner, men ikke i tørkeperioder, da ukrudtet skal være i god vækst.

Undgå at sprøjtetåge driver ind over køkkenurter, pryplanter etc.

Opbevaring

Herbatox Plænemiddel tåler let frost.

Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til dagrenovationen.