

## BRUGSANVISNING:

IT-ETHOFUMESAT anvendes i et sprøjteprogram med andre roemidler til bekæmpelse af fremspiret tokimbladet ukrudt i bederoer efter roernes fremspiring. Der opnås ingen effekt på rod ukrudt som f.eks. Mælkebøtte, Svinemælk, Tidsler.

IT-ETHOFUMESAT virker systemisk og har både blad- og jordvirkning.

IT-ETHOFUMESAT er en formulering, som ikke indeholder organiske opløsningsmidler. Herved undgås lugtgener, problemer med blandingsprocedure og begrænsninger i vandmængder.

## ANVENDELSE:

Før sprøjtning skal sprøjten rengøres grundigt.

Sprøjtning bør normalt udføres tidligt på dagen, så snart duggen er væk. Meget varmt vejr og stærk solskin giver større og hurtigere effekt. Hvis der sprøjtes om formiddagen på en dag med stærk solskin, hvor temperaturen i løbet af dagen når op over +20°C, kan der ske skade på roerne. Under sådanne forhold skal sprøjtningen foretages sidst på eftermiddagen. Hvis sprøjtningen udføres under forhold, hvor der opstår store temperaturforskelle mellem dag og nat, kan der ske skade på roerne. Der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost. Bedste jordvirkning opnås ved udsprøjtning på fugtig jord. Der skal være mindst 2 timers tørvej efter udsprøjtningen.

## SPRØJTETEKNIK:

Den bedste fordeling af sprøjtevæsken opnås ved at anvende små dyser og dermed små dråber, som dækker bedre, og lettere bliver tilbageholdt på bladfladerne, hvilket er af afgørende betydning for effekten. En hensigtsmæssig udsprøjtning kan f.eks. udføres med:

Hardi dyse nr.	Tryk	Hastighed	Udsprøjet væskemængde
4110-14	3 atm	6 km/time	Ca. 180 l/ha

## DOSERING LTR. PR. HA OG SPRØJTETIDSPUNKT:

1. 1,5 ltr. PHENMEDIPHAM\* + 0,1 ltr. IT-ETHOFUMESAT + 1,0 kg. GOLTIX® + 0,3 ltr. SUPER-OLIE/33E OLIE.

2. 1,5 ltr. PHENMEDIPHAM\* + 0,2 ltr. IT-ETHOFUMESAT + 1,0 kg. GOLTIX® + 0,3 ltr. SUPER-OLIE/33E OLIE.

3. 1,5 ltr. PHENMEDIPHAM\* + 0,2 ltr. IT-ETHOFUMESAT + 1,0 kg. GOLTIX® + 0,3 ltr. SUPER-OLIE/33E OLIE.

PHENMEDIPHAM\*, der kan f.eks. anvendes HERBASAN®, BETANAL® SC.

1. Sprøjtningen udføres på ukrudtets kimbladstadiet uden hensyn til roernes størrelse.
2. Sprøjtningen udføres 6-8 dage efter første sprøjtning.
3. Sprøjtningen udføres på nyfremspiret ukrudt på kimbladstadiet.

For at opnå et godt resultat er det en forudsætning, at alle 3 sprøjtninger udføres, og at sprøjtningerne udføres på de angivne tidspunkter, idet de 3 angivne sprøjtninger skal ses som en samlet løsning.

Hvis et af sprøjtetidspunkterne forpasses, skal mængden af PHENMEDIPHAM\* og IT-ETHOFUMESAT øges.

## OLIETILSÆTNING:

Temperaturer under 15°C.....0,5 ltr. SUPER-OLIE/33E OLIE pr. ha.

15-20°C.....0,3 ltr. SUPER-OLIE/33E OLIE pr. ha.

Over 20°C.....Ingen olietilsætning.

## TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Fyld sprøjtetanken halvt med vand, start omrøringen. Hvis der anvendes et granuleret produkt tilsættes det først til sprøjtetanken. Når det granulerede produkt er fuldstændigt opløst tilsættes PHENMEDIPHAM\* produktet, derefter IT-ETHOFUMESAT og tilsidst SUPER-OLIE/33E OLIE. Fyld under stadig omrøring sprøjtetanken helt op med vand. Udsprøjtning skal udføres umiddelbart efter blandingen. Snavset vand, stærkt kalkholdigt vand, stærkt jernholdigt vand må aldrig anvendes.

## AFSTAND TIL ANDRE BEHANDLINGER:

Der skal være mindst 1 uges afstand til andre behandlinger.

Behandling af kvik bør først ske, når kvikken igen har overvundet en evt. svidning fra bladsprøjtningerne.

## BEMÆRK:

Alle forhold, der påvirker afgrøden negativt, f.eks. insektangreb, rodbland, manganmangel, skader af forudgående ukrudtssprøjtninger, store temperatursvingninger m.m. kan medføre, at roerne har sværere ved at nedbryde det aktive stof, hvorved der kan ske skade på roerne.

## BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

## OMRUSTES FØR BRUG.

## OPBEVARES FROSTFRIT.

GOLTIX® varemærke registreret af Bayer.  
HERBASAN® varemærke registreret af KVK AGRO.  
BETANAL® SC, varemærke registreret af AGREVO.

# IT- ETHOFUMESAT

## UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer

## FORSIGTIG:

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask altid huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.**

**Må i Bederoer ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.**

**Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt fodorstoffer.**

**Førstehjælp:** Hvis midlet kommer i øjnene, skyl straks med vand i mindst 15 min. Ved indånding søg til frisk luft. Ved indtagelse skylles munden med vand. Opkastning kan fremkaldes. Ved kontakt med huden vask huden med rigelige mængder vand og sæbe, fjern forurenet tøj. Søg lægehjælp for alle som tilsyneladende har symptomer som følge af indånding, indtagelse, kontakt med huden eller øjnene

Ukrudtsmiddel, nr. 221-73

Omfattet af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ethofumesat 500 gram pr. liter.

Nettoindhold: 1 ltr.

Fabrikationsnummer: påstemplet flasken

Etiket nr.: 11  
GODKENDT

- 6 APR. 2000

for pakninger på:  
Miljøstyrelsen

Inter-Trade Aalborg A/S  
Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77