

INTER-METAMITRON 700

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.)

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

HUDKONTAKT: Fjern forurenede tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe.

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket og leverandørbrugsanvisning til læge.



Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel nr. 221-147

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Metamitron 700 g/l, 57,9%

Nettoindhold: 5 ltr.

Flydende.

Fabrikationsnummer:

**INTER-TRADE AALBORG A/S – HALSVEJ 139 – 9310 VODSKOV
TLF. 98.93.89.77.**

INTER-METAMITRON 700

BRUGSANVISNING:

Midlet anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer (sukkerroer og foderroer). Midlet anvendes på allerede fremspiret ukrudt og virker da som både blad- og jordmiddel. Hvis ikke de anførte sprøjte-tider overholdes medfører det for store ukrudtsplanter og derfor usikker virkning. Der er ingen virkning mod kvik, tidsler og andet rod ukrudt, der spirer fra roden.

Generelt skal der sprøjtes når nyfremspiret ukrudt står på kimbladstadiet, eller det kan bedømmes, at virkning af tidligere behandling ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt.

For at opnå optimal virkning, bør der altid tilsættes olie til blandingerne, når den højeste temperatur ligger under 22⁰ C. Olietilsætning bør dog ikke foretages de første 3-4 dage efter vejrskifte fra køligt og fugtigt vejr til varmt og tørt vejr.

Under ekstremt tørre forhold, med kraftigt vokslag på planternes blade, kan det være påkrævet at anvende den høje oledosering ved temperaturer helt op til 25⁰ C.

Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed, f.eks. morgensprøjtning, temperaturer over 15⁰ C og på småt ukrudt.

Ved kraftig sol og dagtemperaturer over 25⁰ C, specielt efter en fugtig evt. kølig periode, bør sprøjtning foretages sidst på dagen.

I perioder med kraftige temperatursvingninger mellem dag og nat, kan der opstå svidninger på de unge kulturplanter.

Der må ikke sprøjtes i perioder med frost. Der må først sprøjtes 2-3 dage efter frost.

Er planterne skadede af sandflugt sprøjtes tidligst 8 dage efter.

Roerne skal være sunde.

Fugtighed i jordoverfladen fremmer virkningen som jordmiddel.

DOSERING, SPRØJTEPLANER:

Bekæmpelse af frø ukrudt samt vanskelige arter som Burrenerre, Enårig rapgræs, Hvidmelet gåsefod, Kamille, Liden nælde, Raps, Sort natskygge, Snerlepileurt, Vejpileurt.

Der må maksimalt anvendes 3,0 l/ha INTER-METAMITRON 700 pr. år.

INTER-METAMITRON 700 1,0 l/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5 l/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

INTER-METAMITRON 700 1,0 l/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5 l/ha + **ETHOFUMESAT 0,14 l/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

INTER-METAMITRON 700 1,0 l/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5 l/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

1. sprøjtning: udføres på ukrudtets kimbladstadiet.
2. sprøjtning: udføres 5-7 dage efter 1 sprøjtning.
3. sprøjtning: udføres 7-14 dage efter 2 sprøjtning.

For at opnå et godt resultat, er det en forudsætning, at alle tre sprøjtninger udføres, og at sprøjtningerne udføres på de angivne tidspunkter, idet de 3 angivne sprøjtninger skal ses som een samlet løsning.

*PHENMEDIPHAM der kan eksempelvis vælges følgende produkter: Betanal® Classic, Herbasan®, SweDane Betasana 2000, ND Betafam SE.

**ETHOFUMESAT der kan eksempelvis vælges følgende produkter: Ethosan® SC, Nortron® SC, Ethofol 500 SC, ND Ethofumesat 500.

OLIETILSÆTNING SKAL DOSERES EFTER TEMPERATUREN:

10-15 ⁰ C	0,50 l/ha Sun-Oil/Rapsodi
15-22 ⁰ C	0,25 l/ha Sun-Oil/Rapsodi
Over 22 ⁰ C	Ingen olietilsætning

SPRØJTETEKNIK.

Ved bredsprøjtning anvendes ca 200 liter vand pr. ha. På tørre planter må der ikke anvendes under 150 liter vand pr. ha.

HARDI DYSE NR	TRYK	HASTIGHED	UDSPRØJTET VÆSKEMÆNGDE
4110-14	3 atm	5,5 km/t	Ca 200 ltr/ha
ISO F-025-110	3 atm	6,0 km/t	Ca 200 ltr/ha
ISO LD-025-110	3 atm	6,0 km/t	Ca 200 ltr/ha

Filtre må ikke have en maskestørrelse mindre end 0,18 mm (80 mesh.).

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde INTER-METAMITRON 700 tilsættes under omrøring, tilsæt dernæst blandingspartneren og til sidst penetreringsolien. Fyld tanken helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

OMSÅNING OG EFTERFØLGENDE AFGRØDER:

Hvis omsåning er nødvendigt kan der uden pløjning igen sås bederoer.

Efter høst af bederoer, der er behandlet med INTER-METAMITRON 700, må der ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder eller rotationsafgrøder før 165 dage efter sidste behandling med INTER-METAMITRON 700 .

ANDRE SPRØJTNINGER:

Efter anvendelse af kvikmidler bør der ventes 5 dage før der anvendes INTER-METAMITRON 700. Før sprøjtning med kvikmidler bør kvikkens blade have overvundet evt. svidninger fra INTER-METAMITRON 700 behandlingen.

TANKBLANDINGER:

Der markedsføres forskellige produkter, hvor firmaerne angiver blandingsmuligheder. Følg disse firmaers anvisninger.

Blanding med insektmidler kan øge aggressiviteten overfor roerne. Brug derfor kun insektmidler, hvor blandingen angives på insektmidlets etikette.

Spørg altid planteavlskonsulenten til råds.

INTER-METAMITRON 700 kan blandes med: Betanal® Classic, Herbasan®, SweDane Betasana 2000, ND Betafam SE, Ethosan® SC, Ethofol 500 SC, ND Ethofumesat 500, Safari®.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Rengøring af sprøjte og traktor skal foretages enten i marken eller på vaskepladsen.

En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken.

Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark, uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel overskrides.

Der henvises til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 268 af 31/03-2009 om påfyldning og vask af sprøjter m.v. samt EU direktiv 2009/127/EF.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensmiddel. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyser køre i mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så også "sumpen" tømmes ud.
3. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og fedtopløsende rensmiddel.
4. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

OPBEVARES FROSTFRIT.

OMRYSTES KRAFTIGT FØR BRUG.

BØR HØJST OPBEVARES EET ÅR.

Betanal[®] Classic, Herbasan[®], Ethosan[®] SC, = varemærker registreret af Bayer CropScience.
Safari= varemærke registreret af E.I. du Pont Nemours & co. (Ind.) USA.

**INTER-TRADE AALBORG A/S – HALSVEJ 139 – 9310 VODSKOV
TLF. 98.93.89.77.**