INTER-PENDIMETHALIN 330

BRUGSANVISNING:
INTER-PENDIMETHALIN 330 virker ved optagelse gennem ukrudtets rødder og blade.
Produktet anvendes til bekæmpelse af visse enårige græsser og tokimbladet frøukrudt i vintersæd uden udlæg om efteråret, samt til ukrudtsbekæmpelse i ærter til modenhed og grønne ærter om foråret samt i helsæd. Virkning mod flerårige ukrudtsarter, kornblomst, flyvehavre, samt græs der vokser fra tuer er utilstrækkelig.

ANVENDELSE:
Såbedet skal være veltilberedt uden knolde, fri for stub, halm og andre planterester.
Udsæden skal være placeret i den rigtige dybde idet udsæd som ligger i det øverste jordlag eller ovenpå jorden, kan skades af sprøjtningen. Ved "direkte såning" uden forudgående jordbehandling forekommer ofte mangelfuld dækning af udsæden, sprøjtning kan derfor skade afgrøden.
Der må ikke sprøjtes på ubekvemt såbed og på vandlidende arealer på grund af risiko for skade på afgrøden.
Produktets ukrudtseffekt bliver mærkbart nedsat på jorder med over 10% humusindhold eller med uomsat plantemateriale.
Der må ikke sprøjtes ved udsigt til længere tids nattefrost.
Er afgrøden i en stress situation f.eks. på grund af tørke eller på vandlidende arealer, bør der ikke sprøjtes.

VINTERSÆD: Vinterhvede, Vinterbyg, Rug, Triticale.

Ukrudtsproblem	Anvendelsestidspunkt	Dosering/ha
Hyrdetaske, tvetand, kornvalmue, Fuglegræs, ærenpris + visse Enårige græsser	Efter fremspiring, når kornet har 1-2 blade og ukrudtet er på Kimbladstadiet, græsukrudt 1 blad. Kornets stadie 11-12.	1,45 ltr.

Ovennævnte er en del af en kombinationssprøjtning, spørg konsulenten om hvilke andre produkter, der kan tankblandes med, for at bekæmpe andre ukrudtsarter end ovennævnte.

SPRØJTETIDSPUNKT M.M.
Det optimale sprøjtetidspunkt er når det største ukrudt er på kimbladstadiet (græsukrudt 1 blad) på kornets 1-2 bladstadie.
Det seneste sprøjtetidspunkt er når ukrudtets løvblade begynder at udvikles. Der må păregnes nogen nedsat effekt i forhold til optimalt sprøjtetidspunkt.
God jordfugtighed og høj luftfugtighed (70-90%) sikrer det bedste resultat.
Der skal være 2-4 timers tørvejr efter udsprøjtning. Kontroller også blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtning.
Efter sprøjtning frarådes enhver form for jordbearbejdning, herunder også tromling og ammoniaknedfældning.

DYSEFORSLAG OG VANDMÆNGDE:

DYSE NR.	TRYK	HASTIGHED	UDSPRØJTET VÆSKEMÆNGDE
4110-16	3 atm.	6,7 km/t	ca. 200 l/ha
ISO F-025-110	3 atm.	6,0 km/t	ca. 200 l/ha
ISO LD-025-110	3 atm.	6,0 km/t	ca. 200 l/ha

OMSÅNING:
Efter udvintret vintersæd, der om efteråret er behandlet med INTER-PENDIMETHALIN 330, kan der efter harvning i min 15 cm dybde sås vårhvede og vårbyg og efter pløjning til normal dybde om foråret sås: majs, ærter, kløver, hestebønner, kartofler.

HELSÆD (BYG/ÆRT eller BYG/KLØVERGRÆS eller BYG/ÆRT/KLØVERGRÆS)
1,0 ltr. INTER-PENDIMETHALIN 330 + 1,0 ltr. BENTAZON 480 pr. ha.
Sprøjtetidspunkt: På ukrudtets kimbladstadie. Såfremt der er isået kløvergræs som udlæg sprøjtes når kløveren har udviklet spadebladet til 3 koblet blad.

ÆRTER TIL MODENHED og GRØNNE ÆRTER:
Delt sprøjtning (split)
1. 0,70 ltr. INTER-PENDIMETHALIN 330 + 0,4 ltr. BENTAZON 480 pr. ha
   Sprøjtning på ukrudtets kimbladstadie.
2. 0,75 ltr. INTER-PENDIMETHALIN 330 + 0,4 ltr. BENTAZON 480 pr. ha
   Sprøjtning 7-10 dage senere på nyfremspiret ukrudt.

For at opnå et godt resultat, er det en forudsætning, at begge sprøjtninger udføres, og at sprøjtningerne udføres på de angivne tidspunkter, idet de 2 angivne sprøjtninger skal ses som een samlet løsning.

INTER-PENDIMETHALIN 330
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn og ærter.

ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Farlig ved indånding og ved hudkontakt (R20/21).
Irriterer øjnene og huden (R36/38).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Meget giftig for vandlevende organismer; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).
Undgå kontakt med huden.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.
Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn og ærter.
Brugsanvisningen doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst.
Må i tørrede ærter ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
Må i vårsæd, i byg/ærter til ensilage med og uden udlæg af kløvergræs og i byg med udlæg af kløvergræs til ensilage ikke anvendes senere end 6 uger før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Opbevares utilgængeligt for børn
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

MINDRE ANVENDELSE:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pil.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglebælg til frø.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kål til frø.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl, udlagt i efteråret.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i alm. –ital, og hybridrajgræs til frøavl, udlagt i efteråret.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etableret frøgræs, efter høst af dæksæd eller flere års græsmarker.
Halm og andre rester må ikke anvendes til opfodring.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.
Må i vinterraps kun anvendes senere efter såning og inden fremspiring.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd, forår/efterår dog ikke senere end 8 uger før indhentning/ afgræsning.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af lucerne uden dæksæd, forår/efterår dog ikke senere end 10 uger før høst.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pastinak og persillerod og ikke senere end 3 måneder før høst.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær på friland og ikke senere end 10 uger før høst.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i persille på friland og ikke senere end 7 uger før høst.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:
ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
INDTAGELSE: Skyl straks munden med vand. Drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning.
INHALERING: Søg frisk luft. Søg lægehjælp.
Søg lægehjælp for alle som tilsyneladende har symptomer som følge af øjenkontakt, hudkontakt, indtagelse eller inhalation. Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Sundhedsskadelig   Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel nr. 221-140
Omfattet af Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 242 af 18. marts 2011 om bekæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse: Pendimethalin 330 g/l, (34%)
Indeholder Xylen.
NETTOINDHOLD: 10 ltr.
Fabrikationsnummer:

INTER-TRADE AALBORG A/S, HALSVEJ 139, 9310 VODSKOV. TLF: 98 93 89 77 11/11

Hvis ovennævnte sprøjtninger udføres under optimale forhold (se nedenstående), vil der opnås en tilfredsstillende bekæmpelse af følgende ukrudtsarter: hvidmelet gåsefod, kamille, ærenpris, spildraps, agerkål, hyrdetaske, fuglegræs, agerstedmoder, tvetand, alm. brandbæger, burresnerre, hanekro og gul okseøje.

Såfremt første sprøjtetidspunkt, nævnt under splitsprøjtning, forpasses bør følgende sprøjteplan anvendes:
1,45 ltr. INTER-PENDIMETHALIN 330 + 1,0 ltr. BENTAZON 480 pr. ha.
Sprøjtning på ukrudt med max 2 løvblade.
Der må păregnes en nedsat effekt af denne sprøjtning på f.eks. snerlepileurt, vejpileurt og hanekro i forhold til splitsprøjtningen.
ÆRTER MÅ IKKE TROMLES SENERE END 1 UGE FØR OG TIDLIGST 1 UGE EFTER SPRØJTNING.

DYSEFORSLAG OG VANDMÆNGDE:

DYSE NR	TRYK	HASTIGHED	UDSPRØJTET VÆSKEMÆNGDE
4110-16	3 atm.	6,7 km/t	ca. 200 l/ha
ISO F-025-110	3 atm.	6,0 km/t	ca. 200 l/ha
ISO LD-025-110	3 atm.	6,0 km/t	ca. 200 l/ha
Til bekæmpelse af gul okseøje, og ukrudt med mere end 2 løvblade:			
4110 12	3 atm.	4,4 km/t	ca. 200 l/ha
ISO F-02-110	3 atm.	4,8 km/t	ca. 200 l/ha
ISO LD-02-110	3 atm.	4,8 km/t	ca. 200 l/ha

MINDRE ANVENDELSE:

Vejledning Inter-Pendimethalin 330 i pil
Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pil.
Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i pil
Bekæmpelse:
Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt.
Dosering:
Der anvendes 1,4 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.
Der opnås bedst effekt på ukrudt i fremspiringsfasen, og mens ukrudtsplanterne er små.
Bedst effekt opnås, hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende nedbør fremmer effekten. Under sådanne forhold er der også størst risiko for skade på afgrøden.
Risiko for skade:
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.
Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 i humlesneglebælg til frø.
Ukrudtsmiddel: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglebælg til frø.
Advarsel:
Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i humlesneglebælg til frø:
Skadegører:
Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt.
Dosering og sprøjtetidspunkt:
1,4 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. Når humlesneglebælgen har udviklet et trekoblet blad.
Alternativt:
1. Sprøjtning med 0,6 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. I tankblanding med 0,4 ltr. Bentazone 480 pr. ha. På ukrudtets kimbladstadie.
2. Sprøjtning 5-7 dage senere med 0,6 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. I tankblanding med 0,5 ltr. Bentazone 480 pr. ha.
Risiko for skade:
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med en lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.
Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S og United Phosphorus LTD intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Command CS og Inter-Pendimethalin 330 i kål til frøavl
Ukrudtsmiddel:
Command CS (360 g/l Clomazon) Reg. BASF A/S
Inter-Pendimethalin 330 (330 g/l Pendimethalin) Reg. Inter-Trade Aalborg A/S
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kål til frøavl
Halm og andre rester må ikke bruges til opfodring
Advarsel:
"Se midlernes etiketter".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Command CS og Inter-Pendimethalin 330 i kål til frøavl
Dosering:
Der anvendes 0,15 l Command CS + 0,6 l Inter-Pendimethalin 330 pr. ha, efter såning. Der bør sprøjtes straks efter såning.
Risiko for skade:
For at mindske risikoen for skade, skal kål sås i 2-2,5 centimeters dybde og frøene skal dækkes. Nogle arter såsom pak choy er mere følsomme overfor Command CS end andre. Der kan derfor ses skader af Command CS i nogle sorter af pak choy.
Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Command CS kan medføre forbigående skader på kålen.
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.
Der tages forbehold for, at Inter-Trade Aalborg A/S og BASF A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 i skorzonerrod til frøavl
Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl.
Halm og andre rester må ikke opfodres
Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i skorzonerrod til frøavl
Bekæmpelse:
For at opnå den bedste ukrudtsbekæmpelse skal der sprøjtes før ukrudtets fremspiring eller på ukrudtets kimbladstadie. Sprøjtning i forbindelse med nedbør fremmer effekten.
Dosering:
Der anvendes 1,4 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.
Sprøjtetidspunkt:
1) Om efteråret efter høst på fugtigt jord.
2) Tidligt forår efter overvintring på fugtigt jord og inden ukrudtet spirer frem.
Risiko for skade:
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.
Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 i alm.-, ital.- og hybridrajgræs til frøavl, udlagt i efteråret
Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i alm.-, ital.- og hybridrajgræs til frøavl, udlagt i efteråret
Frøgræshalm må ikke bruges til opfodring
Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i alm.-, ital.- og hybridrajgræs til frøavl, udlagt i efteråret
Skadegører:
Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt.
Dosering:
Der anvendes 1,4 liter Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.
For at reducere risikoen for skader, skal udlægget sås i 2 cm dybde og dækkes af jord.
Sprøjtetidspunkt:
Der sprøjtes straks efter såning, og indtil rajgræsset har to blade.
Der opnås bedst effekt på ukrudt i fremspiringsfasen, og mens ukrudtsplanterne er små.
Bedst effekt opnås, hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende nedbør fremmer effekten. Under sådanne forhold er der også størst risiko for skade på afgrøden.
Risiko for skade:
Inter-Pendimethalin 330 kan skade alm.-, ital.- og hybridrajgræs til frøavl. Risikoen for skade kan reduceres ved at så frøet i mindst 2 cm dybde, og sikre at frøene er dækket af 2 cm jord.
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 i etableret frøgræs, efter høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker
Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etableret frøgræs efter høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker
Frøgræshalm må ikke bruges til opfodring
Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i etableret frøgræs, efter høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker
Bekæmpelse:
Inter-Pendimethalin 330 anvendes som led i et bekæmpelsesprogram til bekæmpelse af væselhale og nyfremspiret græsukrudt samt tokimbladet ukrudt. Bemærk at den nye tilladte maximale dosering af Pendimethalin ikke vil være i stand til en effektiv bekæmpelse af væselhale. Derfor bør der på ejendomme med problemer med væselhale anvendes langsigtede bekæmpelsesstrategier der også omfatter sædskiftet.
Dosering:
Der anvendes 1,4 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. Der skal behandles ved begyndende fremspiring.
Der opnås bedst effekt på ukrudt i fremspiringsfasen, og mens ukrudtsplanterne er små.
Bedst effekt opnås, hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende nedbør fremmer effekten.
Risiko for skade:
Etableret græs med mere end 4 blade påvirkes normalt ikke af Inter- Pendimethalin 330. Midlet er ikke afprøvet i alle arter og ikke under alle forhold. Der er derfor ingen garanti for at behandlingerne ikke kan forårsage skade.
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.
Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Halm og andre rester må ikke anvendes til opfodring.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 + Command CS til bekæmpelse af burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, tvetand, ærenpris i vinterraps
Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes til bekæmpelse af burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, tvetand, ærenpris i vinterraps
Advarsel:
Se midlernes etiket.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 + Command CS i vinterraps
Skadevoldere:
Inter-Pendimethalin 330 + Command CS kontrollerer forekomsten af burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, tvetand, ærenpris.
Dosering:
Der anvendes 0,6 ltr. Inter-Pendimethalin 330 + 0,5 ltr Command CS pr. ha.
Sprøjtetidspunkt og teknik:
Inter-Pendimethalin 330 + Command CS udsprøjtes efter såning og inden fremspiring af vinterrapsen.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæmpelse af kornvalmue m.fl. i vinterraps
Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes til bekæmpelse af kornvalmue m.fl. i vinterraps
Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i vinterraps
Skadevoldere:
Inter-Pendimethalin 330 kontrollerer forekomsten af kornvalmue ved lav dosering.
Dosering:
Der anvendes 0,6 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.
Sprøjtetidspunkt og teknik:
Inter-Pendimethalin 330 udsprøjtes efter såning og inden fremspiring af vinterrapsen. Der kan blandes med Command CS.
Der tages forbehold for, at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd efterår/forår
Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd efterår/forår.
Må i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd, forår/efterår ikke anvendes senere end 8 uger før indhentning/afgræsning.
Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd efterår/forår
Skadegører:
Græs- og tokimbladet ukrudt
Dosering efterår:
Der anvendes 1,4 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. Behandlingen bør afvente, at hovedparten af kløverplanterne har udviklet 1. løvblad (spadebladet). Frøene skal være dækket af jord, så der ikke er direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske.
Dosering forår:
Der anvendes 1,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 + 1,0 ltr Bentazone 480 pr. ha. Behandlingen bør vente til hovedparten af kløverplanterne har udviklet 1. løvblad (spadebladet). Frøene skal være dækket af jord, så der ikke er direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske.
Sprøjtetidspunkt og teknik:
Behandlingen udføres, når udlægget er fremspiret, og ukrudtet har 0-2 løvblade. Anvend 150-200 liter vand pr. ha.
Sprøjtefrist:
Må ikke anvendes senere end 8 uger før indhøstning eller afgræsning.
Risiko for skade:
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.
Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af lucerne uden dæksæd, efterår/forår
Ukrudtsmiddel:
- Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af lucerne uden dæksæd, efterår/forår.
- Må i lucerne ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af lucerne uden dæksæd, efterår/forår
Dosering:
Der anvendes 1,4 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. Der opnås bedst effekt ved sprøjtning på fugtig jord. Sprøjt ikke med udsigt til større mængder nedbør.
Sprøjtetidspunkt og teknik:
Behandlingen udføres efter såning inden lucernen spirer frem. Sådybden skal være ca. 2 cm, så lucernefrøene er dækket med jord. Anvend 150-200 liter vand pr. ha.
Risiko for skade:
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.
Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæmpelse af ukrudt i pastinak og persillerod.
Ukrudtsmiddel:
- Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pastinak og persillerod.
- Må i pastinak og persillerod ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i pastinak og persillerod
Anvendelsesområde:
Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt.
Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de forskellige ukrudtsarter henvises til etiketten for Inter-Pendimethalin 330.
Anvendelsestidspunkt og vilkår:
Inter-Pendimethalin 330 udsprøjtes umiddelbart efter såning
Inter-Pendimethalin 330 må kun anvendes én gang pr. sæson.
Sprøjtefristen før høst er 3 måneder i pastinak og persillerod.
Inter-Pendimethalin 330 skal indgå i en ukrudtsstrategi med andre midler eller metoder.
Optimale virkningsforhold:
Bedste effekt af Inter-Pendimethalin 330 opnås når:
- temperaturen er mellem 5 og 15 °C (min. 0 og max 25 °C).
- der er 2-4 timers tørvejr efter sprøjtningen.
- jorden har en god krummestruktur og er uden skorper og knolde.

Dosering:
Der anvendes maks. 2,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha som bredsprøjtning umiddelbart efter såning.
Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæmpelse af ukrudt i jordbær på friland.
Ukrudtsmiddel:
- Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær på friland.
- Må i jordbær på friland ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i jordbær på friland
Anvendelsesområde:
Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt. Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de forskellige ukrudtsarter henvises til etiketten for Inter-Pendimethalin 330.
Optimale virkningsforhold:
Bedste effekt af Inter-Pendimethalin 330 opnås når:
- temperaturen er mellem 5 og 15 °C (min. 0 og max 25 °C).
- der er 2-4 timers tørvejr efter sprøjtningen.
- jorden har en god krummestruktur og er uden skorper og knolde.

Anvendelsestidspunkt:
Nyplantede jordbær
I nyplantede jordbær udføres behandlingen umiddelbart efter plantning, og efter jorden er faldet godt til evt. efter tilvanding eller efter nedbør.
Etablerede jordbær
Forårsbehandling i etablerede jordbær udføres når jordbærplanterne fortsat er i vinterhvile, og medens jorden endnu er fugtig efter vinterperioden.
Efterårsbehandling i etablerede jordbær udføres sent efterår i oktober eller november. Bedste resultat opnås på arealer der i forvejen er renset rent for stort ukrudt og på fugtig jord.
Anvendelses vilkår og dosering
Ukrudtet må maks. have 3-4 løvblade.
Inter-Pendimethalin 330 må kun anvendes én gang pr. sæson.
Sprøjtefristen før høst er 7 uger i jordbær på friland.
Inter-Pendimethalin 330 skal indgå i en ukrudtsstrategi med andre midler eller metoder.
Der anvendes maks. 2,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha som bredsprøjtning eller afskærmet sprøjtning (40-60 cm) i rækkerne.
Afskærmet sprøjtning
Sprøjten skal monteres med separate dysestrenge, der sprøjter lige ned for at få den bedste afsætning af ukrudtsmidlet.
Ved brug af 2,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha som afskærmet sprøjtning (40-60 cm) i rækkerne, vil doseringen i rækkerne svare til 3,6-5,4 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.
Afdriften vil være minimal på grund af afskærmningen, og afsætningen på jorden vil være mindre end ved bredsprøjtning da sprøjtningen udføres over afgrøden.
Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæmpelse af ukrudt i persille på friland.
Ukrudtsmiddel:
- Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i persille på friland.
- Må i persille på friland ikke anvendes senere end 7 uger før høst.

Advarsel:
"Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten".
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i persille på friland
Anvendelsesområde:
Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt. Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de forskellige ukrudtsarter henvises til etiketten for Inter-Pendimethalin 330.
Anvendelsestidspunkt og vilkår:
Behandlingen udføres før fremspiring af persille som bredsprøjtning hen over hele arealet.
Inter-Pendimethalin 330 skal indgå i en ukrudtsstrategi med andre midler eller metoder.
Inter-Pendimethalin 330 må kun anvendes én gang pr. sæson.
Sprøjtefristen før høst er 10 uger i persille.
Optimale virkningsforhold:
Bedste effekt af Inter-Pendimethalin 330 opnås når:
- temperaturen er mellem 5 og 15 °C (min. 0 og max 25 °C).
- der er 2-4 timers tørvejr efter sprøjtningen.
- jorden har en god krummestruktur og er uden skorper og knolde.

Dosering:
Der anvendes maks. 2,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha som bredsprøjtning før fremspiring af persille.
Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

OPTIMALE FORHOLD:
Det bedste resultat opnås ved sprøjtning i varmt vejr (20 °C), med høj luftfugtighed (70-90%). Der skal desuden vælges et sprøjtetidspunkt, hvor der efter sprøjtningen er udsigt til stabilt varmt