

INTER-PROPAQUIZAFOP

Ukrudtsmiddel

31 JULI 1996
for pakninger på:
Miljøstyrelsen

5 Liter

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, ærter til modenhed og kartofler.

ADVARSEL:

Irriterer øjnene og huden. (R 36/38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R 43)

Giftig for organismer, der lever i vand. (R 51)

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved ud-sprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, ærter til modenhed og kartofler.

Raps, bederoer og kartofler må ikke behandles senere end 2 måneder før høst.

Ærter må ikke behandles senere end 10 uger før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra søer og vandløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

LÆS FØRST VEDLAGTE BRUGSANVISNING.

FØRSTEHJÆLP: Kommer midlet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes, medbring etikette. Kommer midlet på huden, fjern forurenede beklædning og vask straks huden med store mængder vand og sæbe. Søg frisk luft ved indånding. Ved indtagelse kontakt omgående læge og medbring etikette.



Lokalirriterende

Nettoindhold 5 liter

Ukrudtsmiddel, nr. 221-90

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse, Propaquizafof 100 g/l (9,7%)

Flydende

Fabrikationsnummer:

**INTER-TRADE AALBORG A/S - ELSAMVEJ 125 - 9310 VODSKOV.
TLF. 98.93.89.77.**

INTER-PROPAQUIZAFOP

BRUGSANVISNING:

INTER-PROPAQUIZAFOP er et systemisk virkende ukrudtsmiddel, der optages gennem plan-ternes grønne blade. Bekæmper kvik, flyvehavre, spildkorn, alm. rapgræs og engrapgræs, almindelig og italiensk rajgræs, agerrævehale og vindaks. Der kan ikke forventes en fuldstændig bekæmpelse af enårig rapgræs, effekten varierer betydeligt. Det bedste sprøjtetidspunkt er når enårig rapgræs har udviklet 1-3 blade.

3-5 dage efter sprøjtning stopper græssernes vækst. 10-14 dage efter sprøjtning ses den første synlige effekt i form af gul og/eller rødfarvning af bladene, efter yderligere 5-8 dage sker der en nedisning af planterne.

BEMÆRK:

Optimale virkningsforhold opnås når:

Den relative luftfugtighed er højere end 70%.

Temperaturen er 10-12 C. (minimum 6 C)

Temperaturudsvingene mellem dag og nat er relativt små.

Jordfugtigheden er høj.

Kvikplanterne har 3-5 blade.

Planterne er i god vækst.

Der skal være mindst 1 times tørvejr efter udsprøjtning.

Der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost.

SPRØJTETIDSPUNKT OG DOSERING:

Kvikbekæmpelse i bederoer:

Kvikplanterne skal have udviklet mindst 3 blade og være i god vækst.

1,5 liter INTER-PROPAQUIZAFOP pr. ha.

Under ekstreme vejrforhold f.eks. en lang tørkeperiode, kan en splitbehandling med 2X0,75 liter INTER-PROPAQUIZAFOP pr. ha anvendes.

Kvikbekæmpelse i ærter og vårraps:

Kvikplanterne skal have udviklet 3-5 blade og være i god vækst.

1,5 liter INTER-PROPAQUIZAFOP pr. ha.

Kvikbekæmpelse i kartofler:

Kvikplanterne skal have udviklet 3-5 blade og være i god vækst.

1,25 liter INTER-PROPAQUIZAFOP pr. ha.

Bekæmpelse af spildkorn og græsser i vinterraps:

Spildkorn og græsukrudt skal have udviklet mindst 3 og maximum 5 blade og være i god vækst. Rapsen skal have udviklet 2 blivende blade.

0,75 liter INTER-PROPAQUIZAFOP pr. ha.

Spildkorn af rug, som ønskes bekæmpet, kræver en dosering på 1,0 liter INTER-PROPAQUIZAFOP pr. ha.

Der kan ikke forventes nogen sikker effekt på enårig rapgræs.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, den afmålte mængde INTER-PROPAQUIZAFOP tilsættes under omrøring. Fyld under stadig omrøring tanken helt op med vand, fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

VANDMÆNGDE:

Minimum 200 liter vand pr. ha. Der skal anvendes en sprøjteteknik, som sikrer en høj dækningsgrad.

DYSEFORSLAG:

Hardi dyse nr.	Atm	Km/t	Liter/ha
4110-16	3	6,7	200

AFSTAND TIL ANDRE BEHANDLINGER:

Hvis afgrøden eller det ukrudt som ønskes bekæmpet, er hæmmet af en forudgående sprøjtning, skal sprøjtning med INTER-PROPAQUIZAFOP udsættes til der igen er normal vækst, hvilket oftest vil betyde en afstand på ca. 7 dage. Efter en sprøjtning med INTER-PROPAQUIZAFOP skal der holdes en afstand til en efterfølgende ukrudtssprøjtning på minimum 3 dage.

OMSÅNING:

Ved et normalt sædskifte kan alle afgrøder efterfølge en INTER-PROPAQUIZAFOP behandling afgrøde. Ved omsåning efter en INTER-PROPAQUIZAFOP behandling kan omså alle tokimbladede afgrøder. Ved omsåning af korn og græsser må omsåning tidligst ske 4 uger efter behandling med INTER-PROPAQUIZAFOP.

TANKBLANDINGER:

Effekten af INTER-PROPAQUIZAFOP kan nedsættes ved blanding med andre produkter. Det anbefales at anvende INTER-PROPAQUIZAFOP alene.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

OPBEVARES FROSTFRIT.

OMRYSTES FØR BRUG.

INTER-TRADE AALBORG A/S - ELSAMVEJ 125 - 9310 VODSKOV.

TLF. 98.93.89.77.