

Etikette nr: 1
GODKENDT
21. december 2016



for pakninger på
Miljøstyrelsen ^{SL}

CCL Label A/S
Tjærbyvej 90
DK-8930 Randers NØ
Telefon 8710 8710
Telefax 8710 8760

OB-nr.: 31609880

Godkendt

Dato: 2016.12.07

Godkendt med rettelse

Etiket str.: 135 x 175 mm

Ny korrektur fremsendes

Korrektur nr.: 4

Farver:

Sign.



Cyan



Mag



Gul



Sort

Oprulning:



1



2



3



4



5



6



7



8

Godkendelse skal ske inden 3 dage
hvis leveringstiden skal overholdes.

Godkendelse kan ske via mail til prepress.ran@cclind.com

INTER-TRINEX

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, havre, rug og triticale samt græsfrø.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL:

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Undgå indånding af spray. P261

Bær beskyttelseshandsker. P280.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, havre, rug og triticale samt græsfrø.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i rug, triticale og byg ikke anvendes senere end BBCH 45.

Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 39.

Må i havre ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 34.

Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyrt nær overfladevand. **SP1**

Opbevares utilgængeligt for børn. P102

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.



Vækstreguleringsmiddel nr.221-151

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-forordningen 1107/2009.

Trinexapac-Ethyl 250 g/l (25,5% w/w).

75% af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er emulgerbart koncentrat.

Nettoindhold 5 ltr.

Fabrikationsnummer og produktionsdata: Se emballagen.

Holdbarhed: 2 år i forhold til en produktionsdato.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand til iritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

INHALATION: Søg frisk luft.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

BRUGSANVISNING:

INTER-TRINEX er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs. INTER-TRINEX modvirker lejesæd samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

OPTIMALE FORHOLD:

Planter der behandles skal være i god vækst. Afgrøden må ikke være påvirket af tørke eller anden form for stress, hverken ved behandling eller umiddelbart efter behandling, da det i enkelte tilfælde kan give skade på afgrøden.

Optimal temperatur er fra 10°C.

Der skal være 3 timers tørvejv efter behandlingen.

AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT:

AFGRØDE	SKADEVOLDER	DOSERING (l/ha)	BEMÆRKNINGER
Vinterhvede Vårhvede BBCH 30-39	Vækstregulering	0,2-0,4	Anvend 0,2-0,4 l/ha INTER-TRINEX i strækingsfasen (BBCH 30-39). Højeste dosis anvendes i blødsråede sorter. I det tidligste vækststadium kan laveste dosis (0,2 l/ha) tankblandes med f.eks. 0,5 l/ha CCC (Chlormequat-chlorid) produkt.
Vinterbyg BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Anvend 0,4-0,6 l/ha INTER-TRINEX i strækingsfasen (BBCH 30-39). Højeste dosis anvendes i blødsråede sorter. I år med øget risiko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,6 l/ha.
Vårbyg BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Anvend 0,4-0,6 l/ha INTER-TRINEX i strækingsfasen (BBCH 30-39). Højeste dosis anvendes i blødsråede sorter.
Rug BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Rug er den kornafgrøde der lettest går i leje, hvorfor vækstregulering ofte er nødvendig. Anvend 0,4-0,6 l/ha INTER-TRINEX i strækingsfasen (BBCH 30-39). Højeste dosis anvendes i blødsråede sorter og ved stor risiko for lejesæd.
Triticale BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Anvend 0,4-0,6 l/ha INTER-TRINEX i strækingsfasen (BBCH 30-39). Højeste dosis anvendes i blødsråede sorter og ved stor risiko for lejesæd.
Havre BBCH 30-34	Vækstregulering	0,3	Anvend 0,3 l/ha INTER-TRINEX i strækingsfasen (BBCH 30-34). Højeste dosis anvendes i blødsråede sorter. Havre må aldrig behandles senere end BBCH 34.
Rødsvingel BBCH 30-49	Vækstregulering	0,8	Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningvækst ca. 25. april, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,8 l/ha under de fleste forhold fra slutningen af april og ca. 3 uger frem.

AFGRØDE	SKADEVOLDER	DOSERING (l/ha)	BEMÆRKNINGER
Almindelig rajgræs Italiensk rajgræs BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-0,8	Anvendes i strækingsfasen i marker med kraftig vækst.
Timothe BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-0,8	Vækstreguleringen foretages fra beg. strækingsvækst, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4-0,8 l/ha INTER-TRINEX, når planten er i god vækst.
Engsvingel BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-0,8	Vækstregulering med 0,4-0,8 l/ha INTER-TRINEX kan være aktuel i strækingsstadiet frem til skridning i kraftige marker i god vækst.
Strandsvingel BBCH 30-49	Vækstregulering	0,8	INTER-TRINEX 0,8 l/ha kan anbefales under de fleste forhold fra slutningen af april og ca. 3 uger frem. Det vigtigste er, at afgrøden er i god vækst og vækstforholdene i øvrigt er optimale, når der vækstreguleres.
Hundegræs BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-0,8	Vækstreguleringen foretages fra beg. strækingsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,8 l/ha INTER-TRINEX, når planten er i god vækst.

SPRØJTETEKNIK:

INTER-TRINEX skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldestyret eller udstyr til direkte injektion.

En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Fyld ca. 75% af den ønskede vandmængde i beholderen.

Omrøreren startes. Omrøreren skal køre under hele proceduren også under udsprøjtningen.

Udsprøjtning foretages umiddelbart efter blandingen.

PRÆPARATFYLDEUDSTYR:

Ved anvendelse af præparatfyldestyret og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken (dunken omrystes kraftigt inden tilsætning). Efterfølgende skylles præparatfyldestyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af INTER-TRINEX i fyldestationen.

DIREKTE INJEKTION:

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det uførtynede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtes tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Når blanding er tilendebragt fyldes sprøjtetanken helt med vand.

VANDMÆNGDE:

Det anbefales at bruge 150-200 l vand pr. ha. Højeste vandmængde i tætte afgrøder. Hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb, bør der anvendes "low drift" dyser.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

OMSÅNING, EFTERFØLGENDE AFGRØDER:

Ingen restriktioner

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen.

En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken.

Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark, uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel overskrides.

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylling/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensmiddel, også under traktorens og sprøjtes bug.

OPBEVARES FROSTFRIT.

OMRYSTES FØR BRUG.

HOLDBARHED: 2 ÅR EFTER PRODUKTIONS DATO.

PRODUKTANSVAR:

Inter Trade er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

INTER-TRINEX

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, havre, rug og triticale samt græsfrø.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL:

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Undgå indånding af spray. P261

Bær beskyttelseshandsker. P280.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, havre, rug og triticale samt græsfrø.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i rug, triticale og byg ikke anvendes senere end BBCH 45.

Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 39.

Må i havre ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 34.

Halm fra græsfrø må ikke anvendes til foder.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. **SP1**

Opbevares utilgængeligt for børn. P102

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.



Vækstreguleringsmiddel nr.221-151

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-forordningen 1107/2009.

Trinexapac-Ethyl 250 g/l (25,5% w/w).

75% af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er emulgerbart koncentrat.

Nettoindhold 5 ltr.

Fabrikationsnummer og produktionsdata: Se emballagen.

Holdbarhed: 2 år i forhold til en produktionsdato.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Ved hudirritation eller udstøt: Søg lægehjælp (P333+P313).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

INHALATION: Søg frisk luft.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Inter-Trade® Aalborg A/S . Sct. Knuds Allé 39 . 9800 Hjørring . Danmark . Tel: +45 20 13 20 76

