

INTER-HALOXYFOP

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs i frøgræsmarker med rødsvingel og så- og priklegebede med planteskolekulturer.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Brandfarlig (R10).

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse (R48/22)

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne (R36/37).

Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65).

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67).

Undgå kontakt med øjnene (S25).

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet (S39).

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs i frøgræsmarker med rødsvingel og så- og priklegebede med planteskolekulturer. Rødsvingel må ikke behandles senere end 7 uger før høst, og halmen

må ikke bruges til foder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet

(søer og vandløb m.m.).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26).

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S62).

INHALATION: Søg frisk luft. Søg lægehjælp hvis der opstår sygdomstegn.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.



CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

OB-nr.: 331 Godkendt

Deres nr.: _____ Godkendt med rettelse

Dato: 2005.09.01 Ny korrektur fremsendes

Etiket str.: 155x135 mm

Farver: Sort + P reflex blå + P021

Korrektur nr.: 1 _____ Sign.

LIMSIDE



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel, nr. 221-59

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Haloxyfop-Ethoxyethyl 125 g/l, 12,93%.

Indeholder solventnaphta (råolie), let aromatisk.

Nettoindhold: 1,0 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer:

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

09/05

149 mm

BRUGSANVISNING:

INTER-HALOXYFOP er et systemisk virkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsser. Virker primært som bladmiddel. Aktivstoffet fordeler sig hurtigt i planten og resulterer i en hæmning af celledelingen i både rod og bladmasse.

Plantens vækst standser efter få dage og efter 1-2 uger vil der ske en farveændring. Den fulde virkning vil normalt være opnået efter 3-6 uger.

RØDSVINGEL:

ENÅRIG RAPGRÆS: Den bedste effekt på enårig rapgræs fås ved behandling i dennes vegetative stadie. Når enårig rapgræs sætter sine småaks, bliver den vanskeligere at bekæmpe. Derfor skal en bekæmpelse af enårig rapgræs foretages om efteråret med en dosering på 1,5-2,0 l/ha.

SÅ- OG PRIKLEBEDE MED PLANTESKOLEKULTURER:

ENÅRIG RAPGRÆS:

Dosering: 1,5-2,0 l/ha.

Den bedste effekt på enårig rapgræs fås ved behandling i dennes vegetative stadie. Sprøjtning inden enårig rapgræs sætter sine småaks.

EFFEKT PÅ ANDET UKRUDT:

Ved en dosering på 1,5-2,0 l/ha Inter-Haloxyfop bekæmpes også: frøplanter af alm. kvik, alm. rapgræs, engrapgræs, flyvehavre, gold hejre, hundegræs, mosebunke, rajgræs, vindaks, spildkorn (byg, hvede, havre, rug), hvis behandling er foretaget på 3-6 bladstadiet.

KLIMAFORHOLD:

Den bedste effekt opnås under gode fugtige vækstforhold med temperaturer over 10°C. Vejrforholdene efter behandlingen, såsom frost, tørke eller en længere kold periode kan påvirke effekthastigheden, men har ikke indflydelse på hverken sluteffekten eller afgrødetolerancen. Undgå at sprøjte på meget våde planter. Produktet er regnfast efter 1 time.

SPRØJTETEKNIK:

Det er vigtigt at anvende en sprøjteteknik, der giver en optimal dækning af bladene, og som er tilpasset størrelsen og dækningen af de græsser der sprøjtes på. INTER-HALOXYFOP udsprøjtes typisk i 150-200 liter vand pr. ha. Med en fladsprededyse f.eks. Hardi 4110-14 eller 4110-16 med 3 atm. tryk. Jo større græsmasse der sprøjtes på jo større vandmængde.

Hardi dyse nr.	Atm	Km/t	Liter/ha
4110-16	3	6,7	ca 200
ISO F-025-110	3	6,0	ca 200
ISO LD-025-110	3	6,0	ca 200

BLANDING:

Den bedste effekt opnås ved at udsprøjte INTER-HALOXYFOP alene. Spørg firmaet hvis produkt man ønsker at blande med om de anbefaler deres produkt blandet med INTER-HALOXYFOP. INTER-HALOXYFOP må ikke blandes med olie.

- 1 -

146 mm

AFSTAND TIL ANDRE SPRØJTNINGER:

Da andre behandlinger kan skade eller påvirke væksten af græsserne, må udsprøjtning af INTER-HALOXYFOP afvente at græsserne er kommet i god vækst igen efter den forrige behandling. Dette vil typisk tage en uge. Hvis INTER-HALOXYFOP behandlingen efterfølges af en anden sprøjtning, bør man være opmærksom på, at der kan være afstandskrav, da den anden sprøjtning kan give skader.

EFTERFØLGENDE AFGRØDE OG OMSÅNING:

I et normalt sædskifte kan alle afgrøder efterfølge en INTER-HALOXYFOP behandlet afgrøde. Ved omsåning efter en INTER-HALOXYFOP behandlet afgrøde kan sås alle tokimbladede afgrøder. For de enkimbladede skal der for korn gå 8 uger og for majs 12 uger fra behandlingstidspunktet til såning.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde INTER-HALOXYFOP tilsættes under omrøring. Fyld tanken helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning skal udføres umiddelbart efter blandingen.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter endt sprøjtning renses tank, pumpe og slanger med en opløsning bestående af 0,25 kg soda (Na₂CO₃) pr. 100 ltr. vand.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt soda. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyser køre i mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så også "sumpen" tømmes ud.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og soda.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensmiddel – også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE SAMT RESTER:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

OPBEVARES FROSTFRIT.

INTER-TRADE AALBORG A/S · HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV · TLF. 98 93 89 77

- 2 -

145 mm

