



JANUS[®]

FS 180

200 liter

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til indendørs bejdning i lukkede industrielle bejdseanlæg af bederoefrø.

Etikette nr.: III
GODKENDT

10 JAN. 2011

for pakninger på 200 L
Miljøstyrelsen

©=Bayer CropScience

Anvendelsesområde

Janus FS 180 er et insektmiddel, der anvendes ved pillering af bederoefrø for beskyttelse mod skadedyr.

Brugsanvisning

Janus FS 180 er et bejdsemiddel til bederoefrø. Bejdningen sker i specielle maskiner med lukket anlæg. Bejdningen udføres efter kvalitetsaftale med Bayer CropScience.
Janus FS 180 giver normalt bederoefrøplanten en god beskyttelse mod de vigtigste skadedyr frem til 4-6 bladsstadiet.

Frø må kun bejdes på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Dosering: 100 ml Janus FS 180 / unit frø (10 g + 8 g a.l./unit).

Virkningsforhold

Clothianidin udskilles i en zone rundt om bederoefrøet og optages herfra af plantens rodsystem. Derefter transporteres stoffet systemisk rundt i planten, hvilket sikrer en høj beskyttelse helt frem til 6-bladsstadiet. Beta-cyfluthrin giver en høj beskyttelse mod angreb både på frøet for fremspiring og i plantens tidlige udviklingstrin.

Virker mod:

Jordlopper (Phyllotreta sp.)
Runkelrobbille (Atomaria liniaris)
Bedefluen (Pegomya hyoscyami)

Håndtering

Bland ikke mere væske end der skal anvendes til behandlingen. Efter afsluttet behandling rengøres udstyret med vand. Mere omhyggelig rengøring kan derefter udføres med et alkalisk rengøringsmiddel. Anvend altid mindst beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved rengøring af den tomme emballage og udstyr.

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farlig affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

11.2010

Uddrag af Leverandørbrugsanvisning

Førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Søg omgående til læge.
Hud: Undgå kontakt med huden. Kommer stoffet på huden vaskes med rigelig vand.
Efter hudkontakt anvend E-vitamincreme eller almindelig lotion. Søg læge ved vedvarende symptomer.

Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 min, også under øjenlåget. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge.

Indtagelse: Skyl straks munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.

Personlige væremidler: I henhold til Arbejdstilsynets vejledning anbefales:

Ved arbejde med produktet: Helmaske, ved håndtering af produktet mens beholderen ikke er lukket og produktkontakt derfor ikke kan forekomme. Sikkerhedsbriller med sideskærm, forklæde/overtræksbukser, støvler og nitril gummihandsker.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indtagelse (R22).

Farlig ved indånding (R20).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Irriterer huden (R38).

Meget giftigt for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/R53).

Undgå kontakt med huden (S24).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt kovalgtilgængelige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til indendørs bejdning i lukkede industrielle bejdseanlæg af bederoefrø.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Den bejdsede udsæd skal umiddelbart efter bejdningen emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede frø er bejdsset med clothianidin og beta-cyfluthrin.

Den bejdsede udsæd er farlig og må ikke anvendes til meneskæde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er giftige for fugle.

Ved såning skal de bejdsede frø dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamlles. Såning af den bejdsede udsæd på samme areal må kun finde sted hvert 3. år.

Der skal anvendes passende rådsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Må ikke udlødes til kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Insektmiddel, nr. 18-486

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Clothianidin 100 g/tr (9,46%)

Beta-cyfluthrin 80 g/tr (7,6%)

Midlet indeholder (3(2H)-isothiazolon, 5-chlorine-2-methyl, blandet med 2-methyl-3(2H)-isothiazolon i forholdet 3:1.

Netto 200 liter

Flydende

Fabr.nr. Påtrykt emballagen

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk



Bayer CropScience