

**Brugsanvisning:** Kemifam Pro SC anvendes til bekæmpelse af tokimblad-ukrudt i bederoer efter fremspiring.

**Virkemåde:** Kemifam Pro SC virker primært gennem bladene, dels svindende på en række ukrudtsplanter og dels efter optagelsen vækststandsende.

Jordvirkningen er begrænset.

Kemifam Pro SC har god effekt på en række ukrudtsarter, som f.eks.: agersennep, agerstedmoder, burresnerre, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdeetaske, kamille, pileurter, tvetand, ærenpris m.fl.

Et væsentligt bredere virkningsspekter opnås ved tankblanding med Metamitron 700.

**Sprøjtetidspunkt og dosering:** Ukrudtsbekæmpelsen i bederoer udføres bedst med et sprøjteprogram, hvori indgår 3 behandlinger.

1. sprøjtning Først fremspiret ukrudt på kimbladstadiet.
2. sprøjtning 6-8 dage efter 1. sprøjtning.
3. sprøjtning 10-14 dage efter 2. sprøjtning, eller ved genfremspiring.

**Kemifam Pro SC anvendes i fig. sprøjteprogram:**

1. sprøjtning a	1,0 ltr. Kemifam Pro SC +1,5 ltr. Metamitron 700 + 0,3-0,5 ltr. Rapsodi pr. ha
2. sprøjtning	1,0 ltr. Kemifam Pro SC +1,5 ltr. Metamitron 700 + 0,3-0,5 ltr. Rapsodi pr. ha
3. sprøjtning	1,0 ltr. Kemifam Pro SC +1,5 ltr. Metamitron 700 + 0,3-0,5 ltr. Rapsodi pr. ha

Bliver de tidligere nævnte sprøjtetidspunkter forpasset, så ukrudtet kommer ud over kimbladstadiet, må mængden af Kemifam Pro SC øges til 1,5 ltr. pr. ha.

**Lavbundsjorder:** På jorder med højt humusindhold, hvor jordmidlerne kun har svag effekt, kan det anbefales at behandle alene med Kemifam Pro SC.

Doseringen skal da være 2,0-2,5 ltr. Kemifam Pro SC pr. ha. Der udføres 3 sprøjtninger med samme tidsfølge som tidligere omtalt. Effekten mod kamille, sort natskygge og liden nælde vil normalt være svag med denne ensidige behandling.

**Olie:** Tilsætning af olie øger optagelsen af ukrudtsmidlerne og forbedrer dermed effekten.

Oliemængden skal være afstemt efter temperaturen og andre klimaforhold.

Følgende mængder kan være retningsgivende:

Under 15°C	0,5-0,7 ltr. Rapsodi
15-20°C	0,2-0,5 ltr. Rapsodi
Over 20°C	Undlad normalt olietilsætning.

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag f.eks. efter flere dage med høje temperaturer og blæst uden nedbør, anbefales, uafhængig af temperaturen, tilsætning af 0,5-0,7 ltr. Rapsodi pr. ha.

**Vejrforhold:** Det optimale resultat opnås, når sprøjtningen udføres på saftspændte, men tørre planter under gode vækstforhold. I køligt og overskyet vejr bør der sprøjtes først på dagen. Under varme og solrige vejrforhold bør der sprøjtes sidst på dagen.

Hvis der er udsigt til lave nattemperaturer - eventuelt nattefrost, bør sprøjtning undlades, idet der er stor risiko for stor udtynding af roerne.

**Sprøjteteknik:** Sprøjteteknikken er af væsentlig betydning for resultatet. Der bør sprøjtes med små dråber, der dækker bladene godt og tilbageholder sprøjtevæsken på bladfladerne. En god sprøjtning kan udføres med Hardi-dyse 4110-12 - 3. atm., 6 km pr. time. Vandmængde 145 ltr. pr. ha.

**Fremstilling af sprøjtevæsken:** Omryst dunken omhyggeligt før brug. Fyld tanken halvt med vand. Hvis Metamitron 700 indgår i blandingen, tilsættes det først under omrøring til fuldstændig opløsning. Derefter tilsættes Kemifam Pro SC. Olie tilsættes til sidst.

Undgå anvendelse af jernholdigt eller snavset vand. Den færdige sprøjtevæske (tankblanding) bør ikke stå mere end nogle få timer.

**Blandinger:** Kemifam Pro SC kan blandes med Metamitron 700, Goltix FL, Safari, penetreringsolier, pyretroider og Pirimor G (Pirimicarb).

**Afstand til andre sprøjtninger:** Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger. Kvikkbekæmpelse med Fusilade Xtra eller Gallant bør først udføres når kvikken har overvundet svidningen efter blad-sprøjtningerne. Oftest bør det foretrækkes at bekæmpe kvikken efter at sprøjtning mod tokimbladet ukrudt er færdig.


**Bortskaffelse af tom emballage:** Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyll vandet hældes op i sprøjtevæsken.

Opbevaring: Kemifam Pro SC tåler ned til -5°C, og op til 40°C.

Bayer A/S  
Bayer CropScience  
Nørgaardsvej 32  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 23 50 00  
www.bayercropscience.dk



**Bayer CropScience**



**BAYER**

**Kemifam<sup>®</sup> Pro SC**


**5 liter**

**DK05609924C**

**Ukrudtsmiddel**

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

® = Bayer CropScience



**BAYER**

**Kemifam<sup>®</sup> Pro SC**


**ADVARSEL**  
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.  
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)  
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)  
Undgå kontakt med huden. (S24)  
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)  
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovlige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.  
Vask huden efter arbejdet.  
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.  
**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.**  
**Bederoer må ikke behandles senere end 2 måneder før høst.**  
**Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).**  
**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**  
**Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)**  
**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)**

Ukrudtsmiddel, nr. 18-420  
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.


**Analyse:**  
Phenmedipham ..... 75g/ltr. (7,4%)  
Desmedipham ..... 15g/ltr. (1,5%)  
Ethofumesat ..... 115g/ltr. (11,3%)

**Netto 5 liter**  
Flydende  
Fabr.nr og dato: se pakningen


Bayer A/S  
Bayer CropScience  
Nørgaardsvej 32  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 23 50 00  
www.bayercropscience.dk



**Bayer CropScience**



**Lokalirriterende**



**Miljøfarlig**

<b>RIFMO</b>	<b>PMR: DK05609924C</b>	<b>Bayer CropScience DK</b>	
	Form.: 576x139 mm	Date: 11-12-2006	<input checked="" type="checkbox"/> Use only for corrections
	Artwork: 4039c	Country: DK	<input type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server
	Job no.: 26-3420	Colour: <b>CMYK</b>	