

Etiket nr: 11  
GODKENDT

14. marts 2017

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 10L

+130. mm

+145. mm

# KOMPAKT 5C

50200252

## Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering i prydplanter i væksthuse  
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Kan sætte metaller (H290).  
Farlig ved indtagelse (H302).  
Farlig ved hudkontakt (H312).  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).  
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).  
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).  
Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391).  
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til vækstregulering i prydplanter i væksthuse. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker.**

**Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskafling skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).**

**Må ikke tømmes i kloakafløb.**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

**I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:** Ring til en GIFTINFORMATION/ læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand. Ring til en GIFTINFORMATION/ læge i tilfælde af ubehag (P302+P352+P312).

**I tilfælde af indånding:** Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. Ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp.

**Øjenkontakt:** Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30°C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp.

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P262+P364).

### Opbevaring:

Frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. Opbevares i original emballage.

### Rester og bortskafling af tom emballage:

Indholdet/beholderen bortskafler i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskafler med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskafling. Skyllevandet hældes op i sprøjtevasken.

Emballagen må ikke genbruges.

### Deklaration:

Vækstreguleringsmiddel nr. 49-94

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidelforordningen 1107/2009.

### Indhold:

Aktivstof: Chlormequat-clorid 460 g/l (41,4% w/w)  
Hjælpestof: Cholinchlorid 320 g/l (28,8% w/w)

Nettoindhold: 10 liter

Præparattype: Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Holdbarhed: Mindst 2 år fra produktionsdatoen.


Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver: Klarso A/S

Søholm Park 1

2900 Hellerup

Danmark



10 liter

### BRUGSANVISNING

KOMPAKT 5C kan anvendes i mange kulturer. Planterne optager KOMPAKT 5C gennem både rødder og blade. Midlet kan derfor både sprøjtes og vandes ud. Udover at virke væksttæmmende, så virker KOMPAKT 5C ofte fremmende på blomstringen. KOMPAKT 5C virker optimalt, når temperaturen ligger mellem 15-18°C. Temperaturer over og under hæmmer optagelsen og virkningen. Virkningen af KOMPAKT 5C kommer 1-3 dage efter behandlingen, og den varer som regel i 5-10 dage. Optørringen skal ske langsomt, og der bør ikke vandes for dagen efter.

KOMPAKT 5C optages bedst gennem unge, fuldt udviklede blade, og derfor opnås den største effekt ved sprøjtning. For at undgå bladskader kan KOMPAKT 5C vandes ud. Ved udvanding hæves koncentrationen ofte betydeligt for at opnå tilstrækkelig effekt. Når KOMPAKT 5C vandes ud, sker optagelsen gennem rødderne. For at få en god optagelse af KOMPAKT 5C skal der være et aktivt klima i væksthuset, der sikrer en god fordampning fra planterne.

KOMPAKT 5C anbefales til følgende prydplanter:

Sort	Antal applikationer per vækstsæson
Azalea, Rhododendron simsii,	1
Abutilon spp., Anisodonta capensis, Argyranthemum frutescens, Campanula spp., Capsicum annum, Dahlia, Dianthus spp., Euphorbia pulcherrima, Fuchsia hybrida, Geranium, Hibiscus rosa-sinensis, Hypoestes phylllostachya, Impatiens spp., Nerium oleander, Pelargonium spp., Petunia, Viola, Verbena	1-2
Osteospermum ecklonis	3-4

#### Dosering ved sprøjtning:

0,05-0,26% styrke (50-260 ml/100 l vand)

Der anvendes 100-200 ml væske pr m<sup>2</sup> - afhængig af bladmassen.

#### Dosering ved udvanding:

0,26% styrke (260 ml/100 l vand)

Der anvendes 50-100 ml væske per plante - afhængig af pottestørrelse.

Overnævnte doseringer er vejledende. Det anbefales, at følge Gartnerirådgivningens dyrkningsvejledninger for hver enkelt plantear. Behandlingen kan typisk udføres med 1 til 3 ugers mellemrum og maximum 3 gange. Ved udvanding med KOMPAKT 5C tilføres der klorid og kvælstof, og det kan være nødvendigt at korrigere gødningsblandingen herefter.

Da forskellige sorter under varierende vækstforhold reagerer forskelligt, anbefales hver gang og altid, at KOMPAKT 5C først afprøves på et mindre areal. Der holdes øje med eventuelle skadevirkninger 7-10 dage efter sprøjtning.

Undgå at behandle planterne i stærkt sollys. Undgå at behandle pelargonium spp. hvis temperaturen vil falde til under 10°C.

Midlet er skånsomt over for populationer af *Typhlodromus pyri*, *Aphidius rhopalosiphii*, *Poecilus cupreus*, *Aleochara bilineata* og *Chrysoperla carnea*.

Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.

Mange forskellige faktorer, såvel lokalt som regionalt betingede, kan påvirke produktets virkning. Herunder hører f.eks. vej- og jordforhold, kulturplantesorter, sædskifte, behandlingstidspunkter, doseringer, blandinger med andre produkter, forekomst af organismer, som er resistente over for det aktive stof, sprøjte teknik osv. Under særlig ugunstige betingelser kan en ændring i midlets virkning eller en beskadigelse af kulturplanterne derfor ikke udelukkes. Fabrikanten eller forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne følger.

### Forholdsregler ved brug:

#### Tilberedning af sprøjtevaske:

Inden tilberedning af sprøjtevasken skal sprøjte, filtre, og dyser være omhyggelig rengjorte samt efterset for belægninger. Dette gælder især, hvis sprøjten/anlægget har været anvendt til sprøjteopgaver i andre kulturer.

Påfyldningen må kun ske i det væksthuse, hvor midlet skal anvendes, og her gælder de samme regler for opsamling af eventuel spild og skyllevand som for vaskepladser generelt.

Vandpåfyldning foretages således, at der ikke er mulighed for tilbagebøl til vandforsyningen. Tanken fyldes ¾ op med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt. Der skal være konstant omrøring indtil udbringning.

#### Sprøjte teknik:

Udbringning af sprøjtemidler skal til enhver tid ske på en sådan måde, at overlappning på det behandlede areal samt spild uden for arealet begrænses til et minimum og at aldrift til omgivelserne undgås.

Der skal altid vælges en passende bomhøjde over behandlingspunktet således at det kan ske en jævn fordeling på kulturen. Ved sprøjtning anvendes 100-200 ml væske pr m<sup>2</sup> - afhængig af bladmassen.

Ved udvanding holdes væsken under konstant omrøring. Udvandingen foregår via eksisterende anlæg eller særskilt udvandingssystem. Der anvendes 50-100 ml væske pr m<sup>2</sup> - afhængig af bladmassen.

#### Rengøring:

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten rengøres på det behandlede areal eller på vaskepladsen.

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes i henhold til gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen nr. 19, 2016, jævntfor Miljø- og Fødevarerministeriet bekendtgørelse nr. 906 af 24/06/2016

#### Værnemidler:

##### Ved oplanding:

Handsker og støvler, overtræksbukser eller forklæde og beskyttelsesbriller.

##### Ved udbringning indendørs:

Sprøjtebom (sprøjteforer i huse) tryk under 20 bar. Åndedrætsværn, halvmaske med filtertype A2P2, beskyttelsesbriller, beskyttelsesdragt med hætte, handsker og støvler.

Vandkande: Overtræksbukser eller forklæde, handsker og støvler.

Ved andre udbringningsmetoder henvises til informationsmateriale fra BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejds miljøudvalg.

##### Uddannelseskrav:

Sprøjtecertifikatbevis i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler.



Jobnaam: 3701030\_50200252\_KOMPAKT\_5C\_KLARSO\_PG1\_PG2.ap

Datum: 8/03/2017

STEURS nv  
graphic solutions

Black

Stans

PANTONE 485 C

Lange Elzenstraat 71 | 2018 Antwerpen - België

T +32 (0)3 242 86 00 | F +32(0)3 242 86 01

www.steurs.com

GOED VOOR DRUK

OPGELET: KLEUREN TER INDICATIE EN NIET BINDEND!!