

# LFS CLIOPHAR

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hver 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.

### Deklaration

Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler:

**Ukrudtsmiddel nr.:** 318-99  
**Analyse:** Clopyralid 100g/l (9,56%)  
20°

**Indhold:** 1 liter

**Godkendelsesindehaver:** LFS Kemi  
Tarp Byvej 81  
6715 Esbjerg N



Miljøfarlig



Sundhedsskadelig

## FORSIGTIG

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hver 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2½ måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

### Førstehjælp

#### Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Opsøg lægehjælp.

#### Øjenkontakt:

Skyld øjnene grundigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og fortsæt skylningen.

#### Hudkontakt:

Vask grundigt med sæbe og vand.

#### Indånding:

Flyt skadeslidte ud i frisk luft.

## BRUGSANVISNING

### Anvendelse

LFS Cliophar er velegnet til bekæmpelse af bredbladede ukrudtsarter i roer og vinterraps samt til pletsprøjtning i skovkulturer. LFS Cliophar optages primært gennem bladene.

### Virkningsforhold

Bedste effekt af LFS Cliophar opnås når ukrudtet er i god vækst, og temperatur over 12°C. Det frarådes at sprøjte, under ekstremt høje temperaturer, samt ved tørke eller nattefrost.

### Dosering

Afgrøder	Dosering	Tidspunkt
Bederoer, rødbeder rosenkål (*) (**)	Max 0,25 l/ha	Forår - sammen med andre produkter
Vinterraps (*)	0,80 l/ha	Forår - planter i god væksttemp. 10-12C.
Skovkulturer (***)	1,5 l/ha	Om foråret

(\*) Der kun må behandles hvert 4. år

(\*\*) Må kun bånd- eller pletsprøjtes

(\*\*\*) Må kun pletsprøjtes.

I en mark, hvor der er anvendt LFS Cliophar, kan der i efteråret kun sås vintersæd eller vinterraps. Næste forår kan der sås korn, græs, majs, bederoer og vårraps. Er der foretaget en findeling af behandlede planterester og efterårspløjning, kan der sås følsomme afgrøder i foråret.

### Bederoer

Anvend 0,251/ha i kombination med andre bred sprekrede ukrudtsmidler. Midlet må kun bruges til plet- eller båndsprøjtning og kun hvert 4. år.

### Vinterraps

Der sprøjtes med 0,8 l/ha LFS Cliophar når væksten begynder om foråret. LFS Cliophar må kun anvendes hvert 4. år.

### Blandinger

LFS Cliophar kan normalt blandes med de mest anvendte midler. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.

LFS Cliophar bør ikke blandes med Safari.

### Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt op med rent vand. tilsæt LFS Cliophar og fyld resten af vandet i. Tilsæt eventuel tankblandings-partner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

### Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter pr. ha.

### Dyseforslag:

Dysestørrelse ISO	Ydelse liter min. ved 3 bar	Liter ha ved 6 km/t
02	0,8	160
0,25	1,0	200
03	1,2	240

### Uønskede effekter

Uomsatte planterester fra en behandlet afgrøde kan give lokale skader på næste afgrøde. Afdrift kan skade kartoffel, ært, hestebohøne, lupin, gulerod og andre skærmpflanter voldsomt. Plantemateriale fra en behandlet afgrøde bør ikke bruges i drivhuse eller til kompost.

### Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

### Renngøring

Umiddelbart efter sprøjtningen rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten grundigt både ud- og indvendigt med rent vand. Udsprøjt skyllevandet på allerede behandlede arealer. Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.