

Etikette nr: ||
GODKENDT

3. februar 2016

for pakninger på
Miljøstyrelsen

 0,150kg
& 1kg

LFS Clopyralid 72SG Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps,
sukkerroer, foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Ukrudtsmiddel nr.: 318-182

Analyse:	Indhold:	Godkendelsesindehaver:
Clopyralid	1 kg netto	LFS Kemi
720 g/kg	Vandopløseligt	Navervej 4
(72% w/w)	Granulat	6600 Vejen

LFS Kemi ApS påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af forkert anvendelse af
produktet i strid med de angivne instruktioner.

Batch nr. påtrykt emballagen Udlobsdato påtrykt emballagen

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs
nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, rødbeder, kål og skovkulturer hvert 4. år.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i raps ikke anvendes senere end vækststadiet 55.
Må i sukkerroer, foderroer, rødbeder, hovedkål, blomkål og rosenkål ikke anvendes senere end maj.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om
eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Opsøg lægehjælp.

Øjenkontakt: Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter.

Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og fortsæt skylningen.

Hudkontakt: Vask grundigt med sæbe og vand.

Indånding: Flyt skadelidte ud i frisk luft.

BRUGSANVISNING

LFS Clopyralid 72SG er et systemisk virkende ukrudtsmiddel, som anvendes til bekæmpelse bredbladet ukrudt i raps, sukkerroer, foderroer, rødbejder, kål og skovkulturer. Produktet må kun anvendes hvert 4. år. I skovkulturer må kun anvendes pletsprøjtning (maksimalt 20% af marken).

I bederoer, rødbejder og rosenkål må der maksimalt anvendes 0,14 kg/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning. LFS Clopyralid 72SG optages primært gennem bladene. Ukrudtsplanterne vil stoppe væksten og visne bort i løbet af 2-3 uger.

LFS Clopyralid 72SG anvendes til bekæmpelse af kamille, tidsel, svinemælk, haremad, gul okseøje, grå bynke, brandbæger og andre kurvblomstrede planter.

Behandlingstidspunkt

Optimal bekæmpelse opnås generelt på småt ukrudt i god vækst.

Tidslær bekæmpes bedst ved en størrelse på 15-20 cm.

Behandlingen anbefales udført som en morgensprøjtning; på saftspændte og gerne fugtige planter; og i perioder hvor den gennemsnitlige dagstemperatur er over 10 °C.

Behandling frarådes ved risiko for perioder med nattefrost omkring behandlingstidspunktet, og når afgrøden er under stress, f.eks. ved tørke eller høj temperatur. LFS Clopyralid 72SG optages gennem bladene og for at sikre bladotagelsen skal der tilsættes 0,5 l/ha "super"-olie.

Blandinger

LFS Clopyralid 72SG kan ikke blandes med mikronæringsstoffer som bl.a. Microtop og Solobur, samt Safari. Der bør endvidere gå mindst 14 dage fra en behandling med Safari før der behandles med LFS Clopyralid 72SG mod tidslær, da det er vigtigt at tidslærne igen er i god vækst.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af en ny sprøjteopgave.

Fyld tanken 1/2 med vand og tilsæt derefter den beregnede mængde LFS Clopyralid 72SG under omrøring. Fyld tanken efter med vand. Evt. sprede/klæbemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet.

Sprøjteteknik

Ved udsprøjtning af LFS Clopyralid 72SG anbefales anvendelse af Hardi ISO F-02-110 og F-03-110, et tryk på 2,5-3 atm samt en kørehastighed på maksimalt 8 km/t. Anbefalet fra 200 til 300 liter per hektar.

Resistensstrategi

For at undgå resistensudvikling anbefales, at der anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet – gerne i blandinger.

Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje.

Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

Lagring

Hold emballagen tillukket og opbevar frostfrit.

Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse

BEMÆRK! Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktivér alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet.

3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.

4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.

Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken, kan punkt 3 også startes. Tankspuledysen og omrøringen skal holdes i gang, mens der køres hjem.

For at opfylde kravene i Bekendtgørelse 268 skal restsprøjtevæsken fortyndes min. med faktor 50. Vaske- og skyllevand må ikke udledes på arealer, men skal udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

Rengøring af sprøjter uden monteret tankspuledyse

For at opfylde kravene i Bekendtgørelse 268 skal restsprøjtevæsken fortyndes min. med faktor 50. Vaske- og skyllevand må ikke udledes på arealer, men skal udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

BEMÆRK!

Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med LFS Clopyralid 72SG p.g.a. dets indhold af clopyralid:

– kartofler og andre natskyggearter

– ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter

– guleros og andre skærmpplanter

– salat og andre kurvblomstrede.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet på etiketten, og som er blevet findelt, spredt og nedpløjet om efteråret, vil ikke skade en forårssået følsom afgrøde.

Plantemateriale med rester af clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom afgrøde (f.eks. læggekartofler) umiddelbart efter, at plantemateriale fra en afgrøde behandlet med LFS Clopyralid 72SG er nedpløjet.

Plantemateriale fra en LFS Clopyralid 72SG-behandlet afgrøde bør ikke anvendes i drivhuse og til kompost.

Efter sprøjtning med LFS Clopyralid 72SG skal man sørge for, at sprøjteudstyret er grundigt rengjort før behandling af en følsom afgrøde (se ovenfor). Vær opmærksom på risiko for vinddrift.

Vær specielt omhyggelig ved anvendelse af LFS Clopyralid 72SG forud for læggekartofler, da clopyralid kan koncentreres i knolde og forårsage unormal vækst.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. (P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emnallagen må ikke genbruges.

Dosering

Afgrøde	Skadegører	Dosering	Tidspunkt	Bemærkninger
Vinterraps Vårraps	Kamille, kurv- blomstret ukrudt	0,11 kg + 0,5 l olie	Afgrødens stadium 31-55	Tilsætning af olie anbefales. Må max. anvendes hvert 4. år på samme areal.
Etablerede trækulturer Granarter, arter	Brandbæger, gråbynke,	0,165 kg+ 0,5 l olie	Forår når ukrudt er 10-30 cm	Kun som pletsprøjtning i max. 20% af arealet. Tilsætning af olie anbefales.
Blomkål Fodersuk- kerroer Hovedkål Rosenkål Rødbejder Sukkerroer	Kamille, kurv- blomstret ukrudt	0,14 kg + 0,5 l olie	Forår på ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade)	Kun som rækkebehandling/bånd- sprøjtning i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Tilsætning af olie anbefales.
Blomkål Fodersuk- kerroer Hovedkål Rosenkål Rødbejder Sukkerroer	Kamille, kurv- blomstret ukrudt snerlepileurt	0,035 kg+ 0,5 l olie	Forår på ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade)	Anvendes i blanding med andre her- bicide for at forstærke effekten på kamille og snerlepileurt. Tilsætning af olie anbefales.