

LFS CLOPYRALID

Ukrudtsmiddel.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel nr.: 318-22

Analyse: Clopyralid 100 g/l (9,56%)

Indhold: 1 liter

Godkendelsesindehaver: LFS Kemi
Tarp Byvej 81
6715 Esbjerg N



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

FORSIGTIG

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen:

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved plet-sprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2½ måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst.

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Førstehjælp

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning tages aflægen.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Hudkontakt: Vask grundigt med sæbe og vand.

Øjenkontakt: Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og forsæt skylningen i flere minutter.

Oplysninger til læge:

Ingen speciel modgift. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning med den enkelte patients symptomer. Medbring evt. denne etiket ved evt. læge / hospitalsbesøg.

BRUGSANVISNING

Anvendelse

LFS Clopyralid er velegnet til bekæmpelse af bredbladede ukrudtsarter i roer og vinterraps samt til pletsprøjtning i skovkulturer. LFS Clopyralid optages primært gennem bladene.

Virkningsforhold

Bedste effekt af LFS Clopyralid opnås når ukrudtet er i god vækst, og temperatur over 12°C. Det frarådes at sprøjte, under ekstremt høje temperaturer, samt ved tørke eller nattefrost.

Dosering

Afgrøder	Dosering	Tidspunkt
Bederoer, rødbeder	Max 0,25 l/ha	Forår sammen med andre produkter
Rosenkål (*) (**)		
Vinterraps (*)	0,80 l/ha	Forår planter i god vækst temp. 10-12°C
Skovkulturer (***)	1,5 l/ha	Om foråret

(*) Der kun må behandles hvert 4. år

(**) Må kun bånd- eller pletsprøjtes

(***) Må kun pletsprøjtes.

I en mark, hvor der er anvendt LFS Clopyralid, kan der i efteråret kun sås vintersæd eller vinterraps. Næste forår kan der sås korn, græs, majs, bederoer og vårraps. Er der foretaget en findeling af behandlede planterester og efterårspløjning, kan der sås følsomme afgrøder i foråret.

Bederoer

Anvend 0,25 l/ha i kombination med andre bred sprekrede ukrudtsmidler. Midlet må kun bruges til plet- eller båndsprøjtning og kun hvert 4. år.

Vinterraps

Der sprøjtes med 0,8 l/ha LFS Clopyralid når væksten begynder om foråret. LFS Clopyralid må kun anvendes hvert 4. år.

Blandinger

LFS Clopyralid kan normalt blandes med de mest anvendte midler. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger. LFS Clopyralid bør ikke blandes med Safari.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt op med rent vand. tilsæt LFS Clopyralid og fyld resten af vandet i. Tilsæt eventuel tankblandingspartner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen.

Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter pr. ha.

Dyseforslag:

Dysestørrelse ISO	Ydelse liter min. ved 3 bar	Liter ha ved 6 km/t
02	0,8	160
0,25	1,0	200
03	1,2	240

Uønskede effekter

Uomsatte planterester fra en behandlet afgrøde kan give lokale skader på næste afgrøde. Afdrift kan skade kartoffel, ært, hestebønne, lupin, gulerod og andre skærmpanter voldsomt. Plantemateriale fra en behandlet afgrøde bør ikke bruges i drivhuse eller til kompost.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Rengøring

Umiddelbart efter sprøjtningen rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten grundigt både ud- og indvendigt med rent vand. Udsprøjt skyllevandet på allerede behandlede arealer. Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.