

LFS Cyazofamid Svampemiddel

Må kun anvendes til stampbeholdelse i kartofler

Svampemiddel nr.: 318-89

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:
Cyazofamid 400 g/l (35%)
20°C

Indhold: 1 liter

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi
Tarp Byvej 81
6715 Esbjerg N



Miljøfarlig

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadedydere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyrer nær overfladevand.

Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter som indeholder cyazofamid kun anvendes 6 gange pr. sæson og maksimalt 3 gange i trek.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og fodrestoffer.

Førstehjælp:

Generelt: Fjern straks alt forurennet tøj.

Indånding: Undgå indånding af aerosolåger. Bring personen i frisk luft. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Søg læge hvis vedvarende symptomer.

Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og lægse kontaktes; evt. kontaktlinser fjernes.

Indtagelse: Skyl straks munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning; Søg læge.

Brugsanvisning

LFS Cyazofamid er et svampemiddel med effekt mod kartoffelskimmel.

LFS Cyazofamid skal anvendes forebyggende. Afhængig af sygdomstrykkelsholdes et sprøjteinterval på 7 til 10 dage.

Behandlingsprogram og intervaller i kartofler

Første behandling mod kartoffelskimmel bør foretages, når varslingsystemerne melder om en situation, hvor væsentlige sygdomsangreb er sandsynlige, hvilket som regel sker ved rækkelukning. Behov for sprøjtning kan være tidligere, hvis der findes knoldsmitte eller stærk smitte i området Under perioder med kraftigt sygdomstryk og hurtig tilvækst bør behandlingen gentages mindst hver 7. dag.

Når sygdommen er mindre faretruende, især efter kartoflerne er afblomstret, kan intervallet være op til 10 dage.

LFS Cyazofamid anvendes med maksimalt 3 sprøjtninger i trek. Anvend herefter mindst 1 behandling med et andet svampemiddel. Det anbefales, at der anvendes 2-3 sprøjtninger med LFS cyazofamid i sidste halvdel af det planlagte sprøjteprogram, da LFS Cyazofamid har en særlig god effekt mod Knoldskimmel.

Dosering

Der anvendes 0,2 liter pr. ha LFS Cyazofamid

Ved blanding med Dithane anvendes 0,1 LFS Cyazofamid + 1,0 kg Dithane pr. ha.

Denne blanding anvendes i tilvækstfasen, når smitterisikoen er middel.

Vandmængde

200-400 l/ha i konventionelle sprøjter. Det er vigtigt at hele planten så vidt muligt bliver dækket. LFS Cyazofamid kan anvendes i både konventionelle og luftassisterede sprøjter

Tankblandinger

Blandbart med mikronæringsmidler, pyrethroider, Select og Titus

Renngøring af sprøjtestyr

Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt.

Skyl sprøjten både ind- og udvendigt med rent vand.

Udsprøjt skyllevandet på allerede behandlede arealer.

Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.

Resistens

Det er vigtigt at undgå opbygning af resistens. Følg derfor følgende regler for brug af LFS Cyazofamid:

Anvend LFS Cyazofamid forebyggende.

Sprøjt maksimalt 3 gange i trek med LFS Cyazofamid

LFS Cyazofamid må maksimalt anvendes 6 gange pr. år.

Indsætmidler med forskellig virkemåde som f.eks. Dithane, Shirian, Acrobat og Tutoo.

Følg anvisninger om dosering og interval mellem sprøjtningerne.

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Etiket nr.: I
GODKENDT

19 MAR. 2010

for pakninger på 1L
Miljøstyrelsen