

LFS Cypro - Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i hvede, byg og rug.

Svampemiddelnr.: 318-68

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Cyprodinil 250 g/l (24% w/w)
Propiconazol 62,5 g/l (6% w/w)
Tung aromisk solventnaphtha.

Indhold: 5 liter

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N



Miljøfarlig



Sundhedsskadelig

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse (R65). Irriterer huden og øjnene (R38/36). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelses-handsker under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør-brugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i hvede, byg og rug. Må ikke anvendes mod andre skadedydere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i byg til modenhed ikke anvendes senere end 7 uger før høst.

Må i byg til høst ikke anvendes senere end 5 uger før høst. Må i hvede og rug ikke anvendes senere end 8 uger før høst. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.) Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Generelt:

Fjern straks alt forurenede tøj.

Indånding

Bring personen i frisk luft.

Søg læge ved betydelig påvirkning.

Hud:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Søg læge ved vedvarende symptomer.

Øjne:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning - søg læge.

Brugsanvisning

Afgrøder/sygdomme

LFS Cypro anvendes mod stråbasis og bladsygdomme i korn.

Især velegnet i Vårbyg og vinterbyg Hvede og rug

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Stadie BBCH | 26-51 | 26-39 |
|-------------|-------|-------|

LFS Cypro er særdeles effektiv mod disse afgrøders mest betydende svampesygdomme så som meldug, bygbladplet, bygrust, skoldplet, knækkefodsye, gulrust, hvedegråplet, hvedebrunplet, brunrust.

Dosering:

I byg er LFS Cypro doseringen 1,6 liter pr. ha pr. behandling. I hvede og rug 2,0 liter pr. ha pr. behandling.

Splitdoseringsprogram:

I vår og vinterbyg 0,4-0,8 l/ha eller en blanding af LFS Cypro+Tern hvis meldug er et problem. I hvede og rug anbefales 0,8-1,0 l/ha. Betingelserne for et godt resultat mod bladsygdømmene er, at første behandling sker, så snart de første sygdomstegn viser sig og følges op ved behov.

Knækkefodsye:

Knækkefodsye i hvede og rug behandles ad en gang med en dosering på 1,0-2,0 l/ha i stadium 30-32.

Tilberedning af sprøjtevæsken:

Fyld tanken halvt med vand, tilsæt LFS Cypro under omrøring. Omrør under udsprøjtning, som afsluttes få timer efter blanding.

Sprøjteteknik

| Dyser | Bar | Km/t | L/ha |
|---------------------|-----|------|------|
| ISO-F-025-110 Lilla | 3 | 5,9 | 200 |
| ISO-F-02-110 Gul | 3 | 6,4 | 150 |

Ved optimal sprøjteteknik og optimale vejrforhold kan vandmængden nedsættes til 120 l pr. ha.

Vejrforhold:

LFS Cypro bekæmper svampesygdomme, så snart afgrøden er i vækst (allerede fra temperaturer på 6° C). Ved stærk solskin og dagtemperaturer over 25° C, bør sprøjtningen udføres efter klokken otte om aftenen eller før klokken seks om morgenen, 2 timers tørvej efter behandling er tilstrækkelig til at opnå en tilfredsstillende effekt.

Langtidsbeskyttelse:

I de anbefalede doseringer beskytter LFS Cypro afgrøden mod nye sygdomsangreb i op til 4 uger. Anvendes der lavere doseringer, reduceres langtidsbeskyttelsen tilsvarende.

Multieffekt/systemisk:

LFS Cypro indeholder to systemiske virkninger, som virker to forskellige steder i svampens udvikling (hhv. aminosyre- og ergosterol biosyntesen). Dette modvirker, at svampen opbygger modstandskraft over for LFS Cypro, selv om produktet anvendes flere gange i samme sæson. De to systemiske virkninger i LFS Cypro optages hurtigt i planterne og fordeles med den op- og udgående saftstrøm til alle stængel- og bladele, herunder ny tilvækst.

Tankblandinger:

Alle nedennævnte produkter kan anvendes i tankblanding med LFS Cypro under forudsætning af, at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes, er det vigtigt, at begge etiketforskrifter omkring sprøjtefrister m.m. overholdes. Bland aldrig LFS Cypro med mere end et produkt, herunder indbefattet anvendelse af spredemidler.

Midler mod tokimbladet ukrudt

MCPA, Briotril, Express, Harmony, Ally, Stomp SC, Oxitril, Starane 180.

Midler til vækstregulering: Moddus, chlormequat, Cerone, Terpal.

Midler mod bladsygdomme: Tern, Tilt, Amistar, Comet.

Rengøring

Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten grundigt både ind- og udvendigt. Sprøjt skyllevandet ud på allerede behandlede arealer. Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.

Tom Emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

100

95

75

25

5

0