

LFS Diflubenzuron - Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af flue- og myggelarver i champignonkulturer samt fluelarver i stalde, fjerkræhuse og minkfarme og på udendørs godningsanlæg

Deklaration

Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler:

Ukrudtsmiddel nr.: 318-124

Analyse: Diflubenzuron
25% 250g/kg

Pulverprodukt.

Indhold: 500 g

Godkendelsesindehaver: **LFS Kemi**
Tarp Byvej 81
6715 Esbjerg N



Miljøfarlig

BRUGSANVISNING

LFS Diflubenzuron anvendes til bekæmpelse af skadedyr i champignonkulturer samt til bekæmpelse af fluelarver i stalde, fjerkræhuse, minkfarme og på udendørs godningsanlæg.

Virkemåde

LFS Diflubenzuron virker ved at hindre dannelse af kitin i larvernes hudskellet så larverne dør. Der er ingen virkning på udvoksede insekter, hvorfor behandling skal foretages ved sværmning og aflagning eller tidligt larvestadie for at sikre optimal bekæmpelse af skadedyrene.

Anvendelse mod skadedyr på vækster

Champignonkulturer:

I champignonkulturer bekæmpes larver af champignonmyg med 4 g LFS Diflubenzuron pr. m² champignonbed. Der foretages udvanding af produktet i 1/4 l vand pr. m² lige efter der er lagt dækjord på de nyplantede bede.

Anvendelse mod fluer:

LFS Diflubenzuron anvendes til fluebekæmpelse i alle staldd typer samt på møddinger og andre steder hvor fluer opformerer. Der er kun virkning på fluelarver, og det er derfor nødvendigt at behandle alle steder, hvor fluelarver findes. Preparatet virker ikke øjeblikke dræbende, men hindrer larverne i at blive til fluer. LFS Diflubenzuron har virkning i 3-4 uger, hvorefter der skal behandles igen. LFS Diflubenzuron bekæmper også fluer som er resistente overfor andre fluemidler.

I bokse med dybstroelse behandles stroelsen 3-7 dage efter rensning med 4 g LFS Diflubenzuron i 1 liter vand pr. m² ved vanding eller sprøjtning. Det er vigtigt at behandle alt stroelse helt ud til yderkanter af bokse. Efter 3-4 uger behandles igen.

I dybstroelsesstalde med tunge dyr, som store kreaturer eller heste, er det muligt at begrænse behandlingen til de områder der ikke betrædes af dyrene. Der behandles i ca. 1 meters bredde langs kanter og andre steder, hvor godningen ikke betrædes.

I håsestalder skal der på steder, hvor der samles godningsrester eller foderrester (særlig bag krybbekanter), behandles med 3 ugers interval.

I riste og spaltetalder vil der på kanten af godningskanalen være fluelarver, og disse kanter skal derfor behandles hver 3.-4. uge.

I svinestalde med fast gulv behandles hver 3-4 uge hele gulvfladen i såvel området med stroelsen som i rensegangen med 4 g LFS Diflubenzuron pr. m². Det er vigtigt at behandle omhyggeligt langs kanter af stierne.

I fjerkræhuse bekæmpes fluerne ved at behandle ansamlinger af godning med 4 g LFS Diflubenzuron pr. m³ hver 3-4 uge.

I minkfarme behandles sandlaget under burene efter udmugning i 1 meters bredde to gange med 14 dages mellemrum, startende medio maj, når fluerne's formering starter.

Godningsrekken behandles 2-4 gange med 14 dages mellemrum, første gang 1 uge mellem de to behandlinger af sandlaget. Denne behandling gentages i efteråret (september), hvorved flueproblemer året efter forebygges. Anvend 4 g LFS Diflubenzuron i 1 liter vand pr. m².

På møddinger kan nyudkort godning behandles med 4 g LFS Diflubenzuron i 1-2 liter vand pr. m².

Tilberedning:

Den afvejede mængde LFS Diflubenzuron udøres i en lille vandmængde til en vælling for den hældes i den 3/4 fyldte beholder, som fyldes helt op under omrøring.

Opbevaring:

LFS Diflubenzuron opbevares tørt og køligt. Tåler frost.

Bortskaffelse af emballage:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæskan.

Etiket nr.: I
GODKENDT

26 OKT. 2007

for pakninger på: 500 g
Miljøstyrelsen

ADVARSEL

Før at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meger giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/R53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelle forpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af flue- og myggelarver i champignonkulturer samt fluelarver i stalde, fjerkræhuse og minkfarme og på udendørs godningsanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadedydere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Fodertrug skal tildækkes og foder og malkeredskaber fjernes inden sprøjtningen.

Må i champignon ikke anvendes senere end 18 dage før høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må ikke tømmes i kloak afløb.

Førstehjælp:

Indånding:

Brisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden:

Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

Øjnene:

Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt læge.

1.0
9.5
7.5
2.5
5
0