

LFS Diquat

Må kun anvende til ukrudtsbekæmpelse i visse frøafgrøder
samt til nedvisning af kartofler og visse afgrøder

Deklaration


Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel nr.: 318-76

Indhold: **5 l**

Analyse:

Diquat dibromid 374 g/l, 31% w/w
ved 20° C (tilsvarende diquat 200 g/l.)



Giftig

Miljøfarlig

Etikette nr.: 11
GODKENDT

22 MRS. 2006

for pakninger på: **5 l**

Miljøstyrelsen

Importør:

LFS kemi

Tarp Byvej 81-83
Postboks 4061
6715 Esbjerg N

ADVARSEL

Før at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.

Giftig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indtagelse (R48/25)
Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R 50/53)
Undgå indånding af aerosoltåger (S23)
Undgå kontakt med huden (S24)
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37)
Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.
Læs nærmere i den eventuelt lovlige leverandørbrugsanvisning
samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelses-
midler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse i visse frøafgrøder. Valmuer må ikke
behandles senere end 75 dage før høst.

Nedvisning af kartofler. Må ikke behandles senere end 7 dage
før høst. Kartoffeltoppe må ikke anvendes til foder.

Nedvisning af visse frøafgrøder. Behandlede afgrøder, halm og
frø deraf må ikke benyttes til fødevarer og foder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb,
søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med
beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand.

Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Farlig for bier.

Før at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette
produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

Emballagen må ikke genanvendes."

Førstehjælp:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand
(S28).

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående
lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt (S45).

BRUGSANVISNING

Generel information

LFS Diquat er et kontaktmiddel. Det virker på planternes grønne dele, hvor LFS Diquat ved hjælp af lyset danner brintoverilte, der ødelægger plantecellerne. Virkningen af LFS Diquat ses meget hurtigt, og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Nedvisning af kartofler		
	LFS Diquat	Bemærkninger
Kraftig grøn top (Splitdosering med 5 dages mellemrum)	2 x 2,5 l/ha	Der nedvisnes når knoldene har opnået den ønskede størrelse ved konstateret skimmelangreb eller mindst 14 dage før det planlagte optagelsestidspunkt.
Begyndende afmodning (gulgrøn top) eller split 5 dages mellemrum ved splitdosering	1 x 2,5 l/ha	Læggekartofler nedvisnes, når knoldene har den ønskede størrelse eller ved risiko for virusoverførsel med bladlus.
	1 x 1-1,5 l/ha 1 x 2 l/ha	Efter ca. 2 uger er knoldene afmodnede og klar til optagning.
Næsten afmodnede kartofler (75% vissen)	1 x 1,5 l/ha	Tilsæt ikke LFS Contact ved nedvisning af kartofler.
Nedvisning af afgrøder		
	LFS Diquat	Bemærkninger
Radis, purløg, spinat nemesia, chrysanthemum stauder, nigella, papaver, iberis, gysophilla, godeltia, cynoglossum, convolvulus	1 x 2-2,5 l/ha	Tilsæt 0,1 l LFS Contact pr. 100 l vand.
Ukrudtsbekæmpelse		
	LFS Diquat	Bemærkninger
Hvene, hvidkløver, hvidkløver med udlæg af engrapgræs, samt i engrapgræs	1 x 2 l/ha	sprøjtning udføres i december-februar, når væksten i afgrøden er helt ophørt efter en periode med frost. Tørre planter og klart vejr giver det bedste resultat. I svage engrapgræsmarker bør LFS Contact udelades.
Valmuer	1 x 2 l/ha	Valmuer tåler LFS Diquat efter fremspiring. Spøjtning kan tidligst ske, når valmuerne har blivende blade. Det vil oftest være nødvendigt at gentage sprøjtningen, når valmuerne har 4-6 blade.
5 dages mellemrum	2 x 1 l/ha 1 x 2 l/ha	Tilsæt ikke LFS Contact.

Sprøjteteknik

Ukrudtsbekæmpelse

Vandmængde 150-300 l/ha
Dyse ISO F 110-025, -03, 04
Tryk 2-3 bar

Nedvisning

Vandmængde 150-400 l/ha
Dyse ISO F110-025, -03, -04, -05
Tryk 2-3 bar
Hastighed Max 5 km/t.

Eksempler på sprøjteteknik

Ukrudtsbekæmpelse 150 l/ha, ISO F110-025, 2,3 bar, 7,0 km/t (små ukrudt)
Nedvisning 250 l/ha, ISO F110-03, 2,3 bar, 5,0 km/t.

Opblanding

Fyld tanken halvt op med vand og tilsæt den ønskede mængde LFS Diquat og evt. LFS Contact under omrøring. Fyld til den ønskede vandmængde.

Rengøring

Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug.

- 1) Skyl med rent vand + LFS Contact 0.1%, Udsprøjt skyllevandet over den netop sprøjtede afgrøde.
- 2) Fyld sprøjten med vand tilsat LFS Contact og soda. Slang, dyser, ventiler og filtre gennemskylles, og sprøjten henstår under omrøring mindst 15 min. Filtre og dyser rengøres separat i vand tilsat LFS Contact og soda.
- 3) Tank, dyser og bom skylles grundigt mindst 2 gange. Skyllevandet skal udelades, hvor det ikke kan forurene brønde, vandløb eller lignende.

Optimale virkningsforhold

Regnfasthed: LFS Diquat er regnfast 10 minutter efter udsprøjtning.
Temperatur: LFS Diquat er uafhængig af temperaturen, men bør ikke udsprøjtes på frose planter.

Lys: Klart vejr og sol giver en hurtig nedvisning. I diset og overskyet vejr er virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen er god. Ved nedvisning af kartofler med LFS Diquat kan der under specielle vejrsmæssige forhold opstå skade, såkaldte navlede-nekroser. De skyldes direkte påvirkning af LFS Diquat. Skader som disse forekommer kun når der sprøjtes på en meget tørkestresset kartoffelafgrøde. Anbefalingen er derfor generelt at udsprøjt LFS Diquat om formiddagen på tørre planter. Dette sikrer en hurtig og effektiv virkning af LFS Diquat.

Bemærk

Tvangsmodning af kartofler kan give mørkfärvning af kartoffelens karstreng, hvis det foregår under ugunstige vejrforhold eller hvis kartoflerne i øvrigt er stressede, uanset om tvangsmodningen sker kemisk, ved flammebehandling eller ved mekanisk aftøpning.

Tankblanding

Ved tilberedning af sprøjtbevæskes tilsættes LFS Diquat til sidst. Tankblanding med andre midler er ikke aktuel.

Tom emballage

Emballagen må ikke genanvendes. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Omsåning - efterfølgende afgrøder

Alle afgrøder kan sås/plantes umiddelbart efter anvendelse af LFS Diquat. På ekstremt sandede jorder kan inaktiveringen dog vare op til 3 dage.

