

LIFS

Etikette nr.: 1
GODKENDT

18 MAR. 1997

for pakninger på: 100 g
Miljøstyrelsen

TO METSULFURON

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret

Deklaration

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

318-15

Ukrudtsmiddel nr.: ~~3632~~


Indhold: 100g

Analyse:

Metsulfuron-methyl 20%

Batch nr.:

Importør:



UMANAKPARKEN 298
DK-6715 ESBJERG N
TEL/FAX 45 7515 8915

FORSIGTIG

Meget giftig for organismer, der lever i vand.
Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. f.eks. informationsmateriale fra Arbejdsulsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret og ikke senere end 2 måneder før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

LIFS - KEMI
TARP BYVEJ 81
6715 ESBJERG N
TEL 75168188

LFS METSULFURON

Brugsanvisning

Generelt

LFS Metsulfuron har både kontakt og jordvirkning på en række bredbladede ukrudtsarter og kan bruges i alle sorter af vår- og vinterbyg, vår- og vinterhvede, rug og havre. LFS Metsulfuron er formuleret som granulat. LFS Metsulfuron hæmmer dannelsen af visse aminosyrer i planternes vækstpunkter, hvorved væksten standser og planten dør.

Behandlingsfrister og restriktioner

LFS Metsulfuron må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret.

Undlad jordbehandling 7 dage efter behandling.

LFS Metsulfuron må ikke bruges i korn med udlæg.

Ved omsåning efter en behandling med LFS Metsulfuron, må der kun sås korn. Sker omsåningen inden for den første måned efter sprøjtning, må der kun sås vårhvede eller havre, og fortrinsvis efter en pløjning. Der må efterfølgende ikke bruges LFS Metsulfuron på arealet.

Hvis der anvendes mere end 20 g/ha, kan der ikke dyrkes vinteraps for 6 måneder efter behandling. Anvendes 20 g/ha eller derunder kan der dyrkes vår- og vinterraps, kartofler, ærter, hestebønner, hør eller korn med eller uden udlæg. Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller andre afgrøder, der ikke er nævnt her, hverken samme eller det følgende år.

Sprøjteteknik og optimale forhold

Vandmængde	:	100-200 l/ha
Dyse	:	Hardi 4110-14 16
Tryk	:	2-3 Bar
Temperatur	:	Fra 7°C
Luftfugtighed	:	Høj
Jordfugtighed	:	Høj

Dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde	Dosering g/ha	Tidspunkt
Vinterhvede	15-30	Tidligt forår
Vinterrug	15-30	Tidligt forår
Vinterbyg	15-20	Tidligt forår
Vårsæd	20	Ukrudt 2-4 løvblade

Til bekæmpelse af burrenerre, snerle- og vejpileurt i vintersæd, kan der tilsættes 0,3-0,6 l fluoxypyridin. Hvis gul okseøjede dominerer bruges tillige med 50 ml non-ionisk spredemiddel pr 100 l vand. Blandingen må kun bruges, hvis afgrøden ikke er stresset.

Virkningsspektrum

Effektiv virkning: Agergåseurt, Agersennep, Agerstedmoder, Agertidsel, Bleg-pilerut, Fersken-pileurt, Fuglegræs, Gulurt, Hanekro, Haremad, Hundepersille, Hyrdetaske, Kamille, Pengeurt, Spildraps, Svinemælk, Rød tvetand, Valmue, Ærenpris, flerkronet og storkronet

God virkning: Forglemmigej, Gul okseøjede, Hejrenæb, Melde, Snerle-pileurt og Vindaks

Svag virkning: Burrenerre, Galtetand, Liden-nælde, Læge-jordrog, Sortnatskygge, Vej-pileurt og Vedbend Ærenpris.

Blanding af sprøjtevæsken

Brug kun en omhyggelig rengjort sprøjte.

Efter halv fyldning af sprøjten med den nødvendige væskemængde startes returløbet og LFS Metsulfuron tilsættes. Ved tankblanding med andre produkter tilsættes LFS Metsulfuron altid først.

Tankblanding

LFS Metsulfuron kan blandes med en række midler. Dog skal brugsanvisningen for blandingspartneren altid følges nøje. Bland ikke LFS Metsulfuron med andre produkter til vårhvede. LFS Metsulfuron kan blandes med bl.a. manganmidler, hormonmidler, fluoxypyridin, isoproturonmidler, propiconazol midler, fenpropimorph og cycocel. Det frarådes, at blande mere en én blandingspartner sammen med LFS Metsulfuron.

Efter sprøjtning

Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten grundigt både ud- og indvendigt med rent vand. Hvis det er nødvendigt kan der bruges enten 1 kg soda pr 100 l vand, 1 l salmiakspiritus pr 100 l vand eller et andet egnet specialrengøringsmiddel til at opløse eventuelle rester. Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affalds-ordning.

Opbevaring

LFS Metsulfuron opbevares tørt i aflåst rum, utilgængeligt for børn.

Importør:

LFS KEMI
Tarp Byvej 81
6715 Esbjerg N