

Etikette nr.: II  
GODKENDT

31 MAR. 2010

for pakninger på 0,2 kg  
Miljøstyrelsen

**LFS Picolinafen**  
**Ukrudtsmiddel**  
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

**Deklaration:**  
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

**Ukrudtsmiddel nr.:** 318-140

**Analyse:**  
Picolinafen 750 g/l (75%) (20°C)

**Indhold:** 0,2 kg

**Godkendelsesindehavere:** LFS Kemi  
Tarp Byvej 81,  
6715 Eshbjerg N



Miljøfarlig

**ADVARSEL**

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.  
Meget giftigt for organismer der lever i vand: kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (RS035).  
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt loypligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.  
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.  
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.  
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.  
Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.  
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.  
Undgå at forurenede vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyret med overløbetvand. Undgå forurening via øjen fra gardspladser og veje.  
Må ikke tømmes i kloakløb.  
Opbevares udfølgeligt for børn.  
Må ikke opbevares sammen med føde, aret, drikkevarer og foderstoffer.  
Forsigtigheds: Generelt: Ejern straks alt forurenede tøj.  
Indånding: Båge personen i frisk luft.  
Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Søg læge ved vedvarende symptomer.  
Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes.

**Virkning:**

LFS Picolinafen er formuleret som et vandopløseligt granulat. LFS Picolinafen virker som et bredspektret kontaktmiddel mod toktimbladet frokrudd i vintersæd om efteråret i afgrødens st. 11-12, eller om foråret st. 25-29.  
LFS Picolinafen har god effekt på en række af de mest almindelige forekomme ukrudtsarter som agersæmpe, agersneppe, brandbæger, burresnerre, fuglegræs, hyrdetasker, lugtløs kamille, rød vintand, mark ærenpris og storkronet ærenpris.  
LFS Picolinafen optages primært igennem ukrudts blade, hvor der sker en afblegning/hvidfarvning af ukrudtet.  
En synlig virkning ses allerede 2 uger efter behandling.  
De behandlede ukrudtsplanter om efteråret dør i løbet af efteråret og vinteren, hvorimod ukrudtsplanter efter en forårsbehandling kan stå længe i afgrøden med hvide planedele.  
2 uger efter behandling med LFS Picolinafen kan der især i vinterbyg ses momentane lyse pletter, der dog hurtigt forsvinder igen, - og ikke har indflydelse på udbyttet.  
Undgå at behandle stærkstressede afgrøder, som f.eks. ved mangansulfat.

Der er ingen restriktioner i valg af efterfølgende afgrøde.

**ANVENDELSESTIDSPUNKT OG DOSERING:**

LFS Picolinafen anvendes alene og i blanding med både jord- og bladmidler f.eks. Stomp midler eller bladmidler som Oxitriil.  
LFS Picolinafen kan anvendes i vintersæd (hvete, rug, triticale og byg) om efteråret eller om foråret.  
Om efteråret anvendes LFS Picolinafen efter fremsprøjt, på fugtig jord og efter evt. tromling i vintersædens stadi 11-12, dvs. fra ukrudtet har kimblade og frem til der er 2-4 blivende blade.  
Om foråret anvendes LFS Picolinafen i vintersædens stadi 25-29, dvs. frem til afsluttende buskning.  
Normaldoseringen for LFS Picolinafen er 133 g produkt pr. ha, svarende til BI på 1,00.  
LFS Picolinafen er godkendt til brug i vintersæd i nedensående løbet og kombinationer.

Fortsætsanvendelse	
Vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og vinterriticale	Forår Afgrødestadium BBCH 25-29
Agersneppe, alm. fuglegræs, hyrdetasker, agersæmpe, agersneppe, rød vintand, mark ærenpris, vedbend ærenpris	0,133 kg/ha LFS Picolinafen
Agersneppe, alm. fuglegræs, hyrdetasker, lugtløs kamille, burresnerre, agersæmpe, kornalmue, rød vintand, mark ærenpris, storkronet ærenpris, vedbend ærenpris	0,053 kg/ha LFS Picolinafen + 1,0 l/ha Oxitriil CM

**LFS Picolinafen + Stomp Pentagon/Stomp**  
24 g LFS Picolinafen + 2,5 l Stomp Pentagon/Stomp pr. ha. I blanding med Stomp Pentagon eller Stomp (SC400) giver LFS Picolinafen en forstærket effekt på især agersæmpe og burresnerre.

**UDBRINGNING OG SPRØJTE TEKNIK:**

For at opnå en god effekt af sprøjtemidler skal det uanset afgrødens størrelse sikres, at sprøjtevæsken dækker planterne så godt som muligt. Der enkelte sprøjteudstyr, opgaven samt vind- og vejforhold bestemmer hvordan dette bedst kan lade sig gøre. Vinddrift til nabomarker med fuldsomme afgrøder skal undgås. På grund af virkemåden af LFS Picolinafen, skal der udvises stor opmærksomhed overfor bredbladede afgrøder og beplantninger, da sprøjteåge med små dråber nemt giver en synlig påvirkning på bladene. Husk altid at overholde det for produktet angivne afstandskrav på 2 meter til søer og vandløb.

**Anbefalet væskemængde: 150 - 300 ltr. pr. ha.**

Dyserstil lug til ISO-Fluldyser

Dyserstørrelse	Ydelse (l/min)	Hæstighed (km/h)	Væskemængde (l/ha)
025	1,0	6,0	200
03	1,2	5,7	240

Hvor der er risiko for afdrift, bør ovennævnte fladsprededyser erstattes af lavdrift dyser, der reducerer antallet af små dråber væsentligt, dog med risiko for nedsat effekt.

**RENGØRING AF SPRØJTE UDSTYR:**

Efter endt sprøjtning rengøres sprøjten grundigt umiddelbart efter både ind- og udvendigt. Dette bør kun ske på et bevokset areal, et biobed eller hvor opsamling af skyllevand er mulig, og altid i god afstand til brønde og boretting. Til rengøring brug en sodavop-løsning til tank, bom, slanger, pumpe og ventiler og skyl i mindst to gange. Dyser og filtre rengøres separat med samme opløsning.

**Blandinger**

LFS Picolinafen kan blandes med Stomp, Stomp Pentagon, Boxer EC, Oxitriil CM samt SU-produkter. Om foråret kan der tilsættes Cyocel-produkter til LFS Picolinafen blandinger.

**BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE**

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med slagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjte-væsken.

**LAGRING**

LFS Picolinafen bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.