

LFS Propaquizafop - Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddelnr.: 318-33

Analyse: Propaquizafop 100g/l (9,7%)
20 °C

Indhold: 1 liter



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indånding (R20). Irriterer øjnene og huden (R36/38). Mulighed for kræftfremkaldende effekt (R40). Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53). Undgå indånding af aerosolløser (S23). Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesudrustninger (S36/37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelle lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overvådelse, af nedensidende særligt fremkaldte forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler. Må i senere end 2 måneder før høst. Må i tørrede ærter ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i friske ærter uden bølge ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Generelt:

Fjern straks alt forurenet tøj

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Hud:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. (S28) Søg læge ved vedvarende symptomer.

Øjne:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes. (S26)

Evt. kontaktfølelse fjernes.

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Brugsanvisning

Generelt

LFS Propaquizafop er et effektivt herbicid mod ukrudtsgræsser, inklusiv kvik, spildkom og flyvehavre i afgrødemere, ærter, raps og kartofler. Midlet er systemisk og transporteres med safstrømmen til vækspunkterne herunder udloberne af kvik.

Dosering og sprøjetidspunkt

Vent mindst 1 uge efter foregående sprøjtninger, hvis ukrudtet eller afgrøden er trykket. Efterfølges LFS Propaquizafop sprøjtningen af en anden sprøjtning, bør der gå mindst 3 dage.

Afgrøde	Skadegører	Dosis l/ha	Tidspunkt
Raps, bederoer	Kvik	0,75-1,5	3-5 blade
	Spildkom	0,25-0,75*	2-3 blade
	Græskrudt**	0,4-0,75	1-3 blade
	Flyvehavre	0,4-0,75	2-3 blade
Kartofler	Kvik	0,75-1,25	3-5 blade
	Spildkom	0,25-0,75	2-3 blade
	Græskrudt**	0,4-0,75	1-3 blade
	Flyvehavre	0,4-0,75	2-3 blade
Ærter	Kvik	0,75-1,5	3-5 blade
	Spildkom	0,25-0,75	2-3 blade
	Græskrudt**	0,4-0,75	1-3 blade
	Flyvehavre	0,4-0,75	2-3 blade

1,0 l/ha mod rug i foråret i vinterraps

Bekæmper ikke rødsvingel og stivbladet svingel.

Ved anvendelse af doseringer på 0,75 l/ha eller derover kan der under gunstige forhold opnås en studeeffekt på en halv rapsgræs med max. 3 blade.

Sprøjeteknik og optimale forhold

Vandmængde:	150-200 l/ha
Dyse:	Iso-dyse 025
Tryk:	2-3 bar
Temperatur:	10-12°C
Luffthøjhed:	Høj
Jordfugtighed:	Høj
Græskrudt:	Safstrøget og i vækst
Tidens tørvej:	1 time

Blanding af sprøjtevæsken

Efter trokvarv fyldning af sprøjten med den nødvendige væskemængde startes returløbet og LFS Propaquizafop tilføjes. Fortsæt omrøring under sprøjtning.

Tankblanding

LFS Propaquizafop kan blandes med en række midler. Dog skal brugsanvisningen for blandingspartnere altid følges nøje. Blanding med herbicider kan medføre nedsat effekt af LFS Propaquizafop. LFS Propaquizafop kan endvidere blandes med manganchlorid.

Rengøring af sprøjten

Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten grundigt både ud og indvendigt med vand tilsat soda og lidt nonionisk spredemiddel. Sprøjt skyllevandet ud på allerede behandlede arealer. Husk at gemmeskylling alle slanger og dyser.

Omsåning

Ved omsåning efter en LFS Propaquizafop-behandling kan alle tokinbladede afgrøder sås. Ved omsåning af korn og græsser skal omsåning ske tidligst 4 uger efter behandling med LFS propaquizafop.

Opbevaring

LFS Propaquizafop opbevares i aflast frostfrit rum og utilgængeligt for børn.

Tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Etiket nr.: J
GODKENDT

16 JAN. 2008

for pakninger på: 14.
Miljøstyrelsen

