

LFS Tebuconazol EW

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesydomme i korn, raps og frøgræs

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-forordningen 1107/2009.

Svampemiddel nr.: 318-153

Analyse: Tebuconazol
200 g/l (19,8% w/w)

Indhold: 10 liter

Godkendelsesindehaver: LFS Kemi
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N

Etiketne nr.: |
GODKENDT

16. december 2014

for pakninger på
Miljøstyrelsen 5L &
10L



Sundhedsskadelig

Batch nr.: Se emballagen Udløbsdato: Se emballagen.

ADVARSEL

Før at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet (R52/53).
Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesydomme i korn, raps og frøgræs.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningens nævnte.

Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadiet 69 og ikke senere end 5 uger før høst. Maksimalt 2 behandlinger om året.

Må i byg og havre ikke anvendes senere end vækststadiet 65 og ikke senere end 6 uger før høst. Maksimalt 2 behandlinger om året.

Må i raps ikke anvendes senere end vækststadiet 69. Maksimalt 2 behandlinger om året.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloak afløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Indånding: Bring personen i frisk luft og kontakt læge

Indtagelse: Ved indtagelse skyl straks munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning, søg læge.

Kontakt med huden: Ved kontakt med huden fjernes alt forurenede tøj straks og huden vaskes med rigeligt vand og sæbe.

Kontakt med øjnene: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.

Generelt: Søg læge ved vedvarende ubehag. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.

BRUGSANVISNING

Anvendelse

LFS Tebuconazol EW kan anvendes til bekæmpelse af svampesydomme i korn, raps og frøgræs.

LFS Tebuconazol EW er et systemisk svampemiddel som transporteres med saftstrømmen rundt i planten. LFS Tebuconazol EW forbliver forholdsvis jævnt fordelt i bladmassen. Når LFS Tebuconazol EW optages i svampene hæmmes dannelsen af ergosteroldannelse. Virkningstid 3-4 uger ved fuld dosering og afhængig af vpkst.

Afgrøder/sydom

| Afgrøde | Skadegørere | Dosering |
|-------------|--|--|
| Vinterhvede | Meldug, gulrust, brunrust, hvedebrunplet, hvedegråplet*, aksfusarium og sneskimmel | 0,75-1,25 l/ha Stadie 30-69 |
| Vårhvede | Meldug, gulrust, brunrust, hvedebrunplet, hvedegråplet* og aksfusarium | 0,75-1,25 l/ha Stadie 30-69 |
| Vinterbyg | Bygbladplet*, bygmeldug, bygrust, skoldplet*, sneskimmel og trådkølle | 0,75-1,25 l/ha Stadie 30-65 |
| Vårbyg | Bygmeldug, bygrust, skoldplet* bygbladplet* | 0,75-1,25 l/ha Stadie 30-65 |
| Triticale | Gulrust, brunrust, hvedegråplet* hvedebrunplet, meldug og sneskimmel | 0,75-1,25 l/ha Stadie 30-69 |
| Rug | Rugmeldug, brunrust og skoldplet | 0,75-1,25 l/ha Stadie 30-69 |
| Havre | Meldug og kronrust | 0,75-1,25 l/ha Stadie 30-65 |
| Raps | Gråskimmel, skulpsvamp og storknoldet knoldbægersvamp | 0,75-1,25 l/ha Stadie 65-69 |
| Raps | Rodhalsråd (phoma) | 0,75-1,25 l/ha Efterår på afgrødens st. 14-18 |
| Frøgræs | Meldug og rust I hundegræs: Mastigosparium og skoldplet I rajgræs: Bygbladplet | 0,75-1,25 l/ha Stadie 31-55 |

* Kun moderat effekt på hvedegråplet, skoldplet og bygbladplet.

LFS Tebuconazol EW er særdeles effektiv mod disse afgrøders mest betydende sygdomme, som meldug, gulrust, aksfusarium, bygrust, gråskimmel, storknoldet knoldbægersvamp og skulpsvamp. Produktet har moderat effekt mod hvedegråplet, skoldplet og bygbladplet.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekaniske kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette,

anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med en anden virkemekaniske enten i form af en tankblanding eller ved at skifte middel. Der er observeret nedsat følsomhed hos *Septoria tritici* svampen over for triazolol. For at mindske resistensudvillingen bør triazololerne maksimalt anvendes to gang pr. vækstsæson. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse. Resistensklasse 3.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt med vand. Tilsæt LFS Tebuconazol EW under omrøring. Der omrøres under udsprøjtningen, som bør afsluttes inden for få timer efter opblanding.

Tankblanding: Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med LFS Tebuconazol EW, under forudsætning af, at brugstidspunktet for produkterne er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes, er det vigtigt, at begge etikette-forskrifter overholdes.

Blandingspartnere, som firmaerne står inde for

(som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartnere):

Accurate Delta, Alliance, Ally ST, Amistar (Syngenta Crop Protection A/S), Aproach, Briotril 400 EC, Bumper 25 EC, CCC 750, Cuadro 25 EC, Cycocel 750, Express ST, Folpan 500 SC, Harmony Plus ST, Hussar, Hussar OD, Karate 2,5 WG, Maredo 125 SC, Mavrik 2F (Makhteshim-Agan Holland B.V.), Moddus M, Mustang forte, Nexide CS, Opera (BASF A/S), Oxitiril CM, Pirimor G, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Rubric, Starane 180S, Tern, Tomahawk 180 EC, Trece 750, Trimaxx, Magnesiumsulfat 10% Mg, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32

Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges

Agro Bizz Epoxiconazol 125 SC, Agro Bizz Tau-flu 2F, Agro Bizz Thiacloprid OD 240, Agros MF, Agros Tau, Agros Tri, Bachlor 125 SC, Biscaya OD 240, Cythrin 500, LFS Epoxiconazol SC, LFS Thiacloprid, Nautius, Optimus, TO Epoxiconazol

Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger

Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Vejrforhold

LFS Tebuconazol EW bekæmper svampesydomme så snart afgrøden er i vækst dvs. fra 6°C. Ved stærk solskin og temperatur over 25°C, bør først udsprøjttes efter kl. 20.00 eller før kl. 06.00.
Regn 1 time efter behandling påvirker ikke effekten.

Rengøring

Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten grundigt både ind- og udvendigt. Sprøjt skyllevandet ud på allerede behandlede arealer. Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale af-faldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæske.