


Lodin 200 EC

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, græsmarker, samt i fodermajs

Åbnes her 

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FARE	Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
EUH401	Brandfarlig væske og damp.
H226	Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejen.
H304	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H319	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H336	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH066	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H410	Undgå indånding af spray.
P261	Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P280	

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, græsmarker, samt i fodermajs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i vinter- og vårsæd ikke anvendes senere end 2 måneder for høst.

Må på græsmarker ikke anvendes senere end 14 dage for afgræsning.

Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder for høst.

SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilmusset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJENNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P370+P378 Ved brand: Anvend vand til brandslukning.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12



Ukrudtsmiddel nr. 594-22

Omfatter af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Emulgerbart koncentrat

Indeholder: Fluroxypyr 200 g/l (20,4 %). Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 5 L

Etikette nr: **GODKENDT II**

17. december 2015

for pakninger på
Miljøstyrelsen 5L &
4x5L



Registreringsindehaver:

AgriChem bv (part of UPL Europe Ltd)
Koopvaardijweg 9
4906 CV Oosterhout
Holland



UPL Europe Ltd
The Centre, 1st Floor
Birchwood Park
Warrington, Cheshire WA3 6YN
United Kingdom
Tel +44 1925 859000

Lodin 200 EC

Læs først vedlagte brugsanvisning.

BRUGSANVISNING

Lodin 200 EC er et systemisk herbicid til bekæmpelse af enårig og flerårig ukrudt om foråret, især burre-snerre, stor nælde og fuglegræs og vårsæd, i fodermajs og i nysåede eller etablerede græsmarker.

Det bedste resultat opnås ved bekæmpelse af ukrudt på tidlige udviklingstrin og under gode vækstbetingelser i afgrøder der efterfølgende kan give god konkurrence. Temperaturen på behandlingstidspunktet bør være over 12 °C. Behandl ikke afgrøder som er under stress fra f.eks. tørke, vandlidende jord, varme og kuldeekstremer, sygdomsangreb, næringsmangel o.l.

Sprøjt ikke med udsigt til frost eller hvis nattemperaturerne er lave.

Lodin 200 EC indeholder aktivstoffet fluroxypyr, tilhørende pyridin-gruppen (HRAC gruppe O). Fluroxypyr har auxinvirkning. Aktivstoffet findes som methyl heptyl ester.

ANVENDELSE OG DOSERING

1. KORN

Lodin 200 EC kan anvendes på alle sorter af vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterhavre, vinterrug, durum hvede og tritcale. Må ikke anvendes i afgrøder med udlæg af kløver eller andre bælgplanter. Afgrøder med udlæg af græs må sprøjtes, forudsat at græsset er i buskningsstadiet.

Forårssprøjtning i vinterafgrøder

Vinterhvede og vinterbyg:

Anvendes BBCH 12-39. Dosering: 0,6-0,7 L/ha.

Vinterhavre, vinterrug, durum hvede og tritcale:

Anvendes BBCH 12-39. Dosering: 0,6-0,7 L/ha.

Forårssprøjtning i vårsæd

Vårhvede og vårbyg:

Anvendes BBCH 12-32. Dosering: 0,5-0,7 L/ha.

Vårhavre:

Anvendes BBCH 12-37. Dosering: 0,5-0,7 L/ha.

2. FODERMAJS

Anvendes når majsplanten har mellem 3 og 6 blade, men før afgrøden er højere end 20 cm. Dosering: 0,6-1,0 L/ha.

Vandmængde: Anvend 200-300 L vand/ha.

3. GRÆS OG FRØGRÆS

Lodin 200 EC kan anvendes i etablerede græsmarker eller nysåede græsmarker når græsset har mindst 3 fuldt udviklede blade. Behandlingen skal ske om foråret. Det er vigtigt at ukrudtet er i vækst når behandlingen foretages. Sprøjtfristen for græs er 14 dage.

Dosering: 0,75-2,0 L/ha.

Vandmængde: Lodin 200 EC udsprøjtet i 150-400 L vand/ha. Den laveste mængde anvendes i åbne afgrøder og små ukrudtsplanter. Ved tætte afgrøder og større ukrudtsplanter anvendes der op til 400 L vand/ha.

Bemærk:

Halm og plantemateriale der har været behandlet med Lodin 200 EC må ikke anvendes i drivhus eller til kompost.

Sprøjteteknik

Lodin 200 EC skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldedstyr eller udstyr til direkte injektion.

Dysetype	Tryk	Km/t	Vand l/ha
ISO 02	3	6,4	150
ISO 025	3	6,0	200
ISO 025	3	4,8	250
ISO 04	3	6,4	300
ISO 04	3	4,8	400

Undgå vinddrift da naboafgrøder kan skades.

Anvend evt. lowdrift dyser.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sorg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterser for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Omrør grundigt før og under udsprøjtning. Sprøjtbevæskan skal bruges med det samme.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Lodin 200 EC i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtbevæskan og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal usanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtbevæskan kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtbevæskan. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Frostfrit.

Ansvarsklausul

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.