

# MAISTER

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs

# DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 570-36

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold : **375 gram**

Analyse : Foramsulfuron 300 g/kg (30%w/w)  
Iodosulfuron 9 g/kg (0,9%w/w)  
Isoxadifen-ethyl 300g/kg (safener)  
(30%w/w)

# ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand: kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Undgå kontakt med huden (S24) Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler

Vask huden efter arbejdet

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs og ikke senere end 75 dage før høst.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.)**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Registreringsindehaver:

**AGRO BIZZ**

Herluf Trolles Vej 257  
5220 Odense SØ  
Tlf 7020 4903



Lokalirriterende



Miljøfarlig

# BRUGSANVISNING

## Anvendelse

MaisTer anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.

## Sprøjetidspunkt

Anvend MaisTer når ukrudtet er kommet frem. Ofte anbefales en splitbehandling, hvor første sprøjtning udføres når ukrudtet har 2 lovblade efterfulgt af den anden behandling 10 – 14 dage senere. MaisTer anvendes ikke senere end majsens 6 bladsstadie. MaisTer blandes altid med Maisoil, se doseringer nedenfor.

## Doserings- og anvendelsesskema

Ukrudsart	Dosering liter gr. pr. ha
Agersennep Enårig rapsgræs Flyvehavre Fuglegræs Hanekro Hyrdetaske Raps Sort Natskygge	50 g MaisTer + 0,67 l Maisoil
Agerrøvhale Agersvinemælk Alm Rajgræs Forglemmigej Hvidmelet gåsefod Kamille Læggejordrug Tvetand	Splitbehandling 2 gange 50 g MaisTer + 0,67 l Maisoil  eller en behandling med 100 g MaisTer + 1,33 l Maisoil
Burresnerre Grøn Skærmaks Hanespore Kvik Pileurt bleg/fersken	Splitbehandling 100 g MaisTer + 1,33 l Maisoil efterfulgt af 50 g MaisTer + 0,67 l Maisoil
Pileurt snerle Pileurt vej Ærenpris	Tilsæt 0,25 l Starane 180

## Klima

MaisTer anvendes når ukrudtet er i aktiv vækst og temperaturen er over 8°C. MaisTer er regnfast 2 timer efter sprøjtningen. Der bør ikke behandles når der er udsigt til nattefrost.

## Restriktioner

Maister kan ikke anvendes i sorten Abraxas og i sukkermajs. Anvendes ikke på vandlidende jorde. Sprøjt ikke på stressede planter.

## Sprøjeteknik

Anvend normalt 150 – 200 l/ha

ISO – Alm fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysetørrelse	Ydelse (l/minut)	Væskemængde l/ha
02	0,8	160
025	1,0	200
03	1,2	240

## Blandinger

MaisTer kan blandes med Starane 180, Terbutylazin og optil 1,5 kg mangansulfat. Husk altid at læse etiketten på blandingsparteneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger. MaisTer kan ikke blandes med Laddok. Efter en behandling med dimethoat skal der gå mindst 1 uge inden behandling med MaisTer.

## Efterfølgende afgrøde

MaisTer nedbrydes hurtigt i jorden, så der er ingen restriktioner på efterfølgende afgrøde.

## Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt MaisTer og fyld resten af vandet i, og tilsæt olien. Tilsæt eventuel tankblandingspartner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

## Rengøring af sprøjten

Efter sprøjtning rengøres sprøjten med vand og et ammoniumbaseret rengøringsmiddel. Tøm sprøjten på det allerede sprøjtede areal.

## Resistens

For at forebygge resistens bør Maaister ikke bruges hvert år, men veksle med midler fra en anden gruppe af herbicider. MaisTer tilhører gruppen af sulfonyureaamider, så en eventuel resistens overfor MaisTer vil give resistens overfor alle i gruppen.

## Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyll vandet hældes op i sprøjtevæsken.

## Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

## Førstehjælp

### Indånding:

Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

### Hudkontakt:

Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

### Øjenkontakt:

Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.