

Colors : **CYAN** **MAGENTA** **YELLOW** **BLACK**

DK84464449A

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Indånding: Bring personen ud i frisk luft (undgå afkøling).

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Øjenkontakt: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge.

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde:

Merit® Turf anvendes på græsarealer som angribes af oldenborrens, gåsebillens og stankelbenets larver, som f.eks. idrætsanlæg og golfbaners fairways og semirough.

Virkemekanisme

Merit® Turf er et systemisk virkende insektmiddel, der virker som kontakt- og ædegift. Merit®Turf har en god fordelingssevne og virker i en relativt lang periode overfor angreb af larver.

Anvendelsestidspunkt:

Imod gåsebillens og oldenborrens larver: Behandlingen foretages i billens æglægningsperiode. Det optimale tidspunkt er i begyndelsen til midten af juni måned, men behandlingen kan udføres frem til begyndelsen af juli med godt resultat.

Imod stankelbenets larver: Stankelben sværmer i midten af september og larverne klækkes efter 14 dage. Behandlingen foretages når larverne klækkes. Det optimale behandlingstidspunkt er i slutningen af september til slutningen af oktober.

Merit® Turf har ingen specielle temperaturkrav, men det kan anbefales at udbringe Merit® Turf på fugtigt græs, eller i forbindelse med nedbør.

Dosering:

Doseringen er 30 kg Merit® Turf pr. hektar efterfulgt af regn/vanding. Kun en behandling pr. år.

Skadegører	Dosering	Behandlingstidspunkt
Larver af gåsebillen og oldenborre	30 kg pr. hektar	Juni – juli På græsarealer med tæt og veletableret græsbestand. Det optimale tidspunkt er i begyndelsen til midten af juni måned, men behandlingen kan udføres frem til begyndelsen af juli med godt resultat.
Larver af stankelben	30 kg pr. hektar	September - oktober Stankelben sværmer i midten af september og larverne klækkes efter 14 dage. Det optimale behandlingstidspunkt er i slutningen af september til slutningen af oktober.

Udbringningsmetode:

Granulatet fordeles jævnt på arealet med f.eks. gødningsspreder, såmaskine eller andet egnet udbringningsudstyr. Produktet kan eventuelt opblandes i tørt sand eller topdressing inden udbringning, hvis udbringningsudstyret kræver højere volumen for at fungere optimalt. Behandlingen foretages lige før regnvej. Der skal tilføres 5-10 mm vand (5-10 L/m²), så granulater bliver opløst, og aktivstoffet bringes i kontakt med græssets rødder og det øverste jordlag. OBS: Vandet må ikke løbe af jorden.

Beskyttelsesforanstaltninger:

Ved håndtering og udbringning af plantebeskyttelsesmidler anvendes altid egnet værnemidler, såsom egnede gummihandsker, arbejdstøj, støvler og beskyttelsesbriller.

Resistensdannelse

Merit® Turf indeholder aktivstoffet imidacloprid der tilhører gruppen af neonicotinoider (IRAC gruppe 4A). Gruppen vurderes af have lav risiko for udvikling af resistens. Der er ikke i Danmark fundet resistens hos skadegørere der bekæmpes med Merit Gran. Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Ansvar:

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Rengøring af udbringningsudstyr

Efter endt udbringning skal udbringningsudstyret rengøres på en vaskeplads. Et uvasket udbringningsudstyr skal placeres under tag. Vaskevandet kan opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Bortskaffelse af rester og tom emballage:

• Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

• Anvend ikke produktet når der er blomstrende vegetation græsset. Slå græsset før udbringning og regelmæssigt efter.

• Gåsebillens larver er kun et problem på lette jordtyper.

• Forsøg har vist, at skadetærsklen på tæt og veletableret græs er cirka 60 larver pr. m². Denne skadetærskel vil være noget lavere på dårligt etablerede græsarealer.

• Larverne opholder sig 2-5 cm under jordoverfladen og lever af græssets rødder, hvilket vil kunne ses som mistrivsel og gulfarvning af græsset. Den store synlige skade som observeres i september/oktober skyldes, at de store fugle (skader, krager og råger) i deres søgen efter larverne flår græstæppet op.

!

ADVARSEL

!

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i græsarealer.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).
Må ikke tømmes i kloak afløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Declarations:

Insektmiddel nr. 18-485

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indhold: Imidacloprid 5 g/kg (0,5% w/w)

Netto: 5 kg

Midlet er et granulat.

DK84464449A

Bayer

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.bayer-es.dk

Opbevares tørt og køligt.

Produktionsdato: Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.

Batch nr. påtrykt emballagen.

5 701363 010822

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(IMIDACLOPRID MIXTURE)

ARTICLE 84075817

1

9

INSEKTMIDDEL

✓ Effektivt

✓ Langtidsvirkende

✓ Æn behandling pr. sæson

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i græsarealer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Nettoindhold:

1 x 5 kg e

Etikette nr: V

GODKENDT

19. maj 2015

for pakninger på 5 kg

Miljøstyrelsen

Syrene Agnate

Systemisk insekticid

Bayer Environmental Science • AGCI • Date : 15/05/15 • Auteur : Méli

Dossier : Merit Turf • Contenu : 1 x 5 kg • Pays : DK • Réf. : DK84464449A • ARTICLE: 84075817 • Dim. : L 1030 mm x H 174 mm