

# Metafol SC

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer med  
maksimalt 4,5 l/ha pr. år (3 x 1,5 l/ha pr år eller 4 x 1,1 l/ha pr. år)

## Deklaration:

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

**Ukrudtsmiddel:** 14-221

**Aktivstof:** 467 g/l metamitron (40,9%)

**Indhold:** 5 liter

**Type:** Flydende

## Forsigtig

Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige væremidler skal følges ved udbringningen, jf. f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer med maksimalt 4,5 l/ha pr. år (3x1,5 l/ha pr. år eller 4x1,1 l/ha pr. år).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.



## Anerkendt af

### Statens Jordbrugsforskning

SweDane Betasana 2000 + Metafol SC til bekæmpelse af forglemmigej, fuglegræs, hanebro, hvidmelet gæsefod, nat linurt, hyrdetasker, sort natskygge, liden næske, kamille, fersken-, snerle- og vejpileurt, raps, enårig rapgræs, agersennep, tvetand og ærenpris med 3 x (1,5+1,5) l/ha på ukrudtets kimbladsstadiet og på nyfremspiret ukrudt i bederoer. Der tilsættes 0,3 l Renol pr. ha til alle sprøjtinger.

SweDane Betasana 2000 + Ethofol 500 SC + Metafol SC til bekæmpelse af burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanebro, hvidmelet gæsefod, nat linurt, hyrdetasker, sort natskygge, liden næske, kamille, fersken-, snerle- og vejpileurt, raps, enårig rapgræs, agersennep, agerstedmoderblomst, tvetand, ærenpris og valmue med 3 x (1,5+0,2+1,5) l/ha på ukrudtets kimbladsstadiet og på nyfremspiret ukrudt i bederoer. Der tilsættes 0,3 l Renol pr. ha til alle sprøjtinger.

Omrystes før brug.

Fabrikationsnr.:

# AgroDan A/S

dlg

Hovedforhandler:  
DANSK LANDBRUGS GROVARESELSKAB

# Metafol SC

## Brugsanvisning

Metafol SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer, sukker- og foder-sukkerroer. Metafol SC er bredtvirkende, med effekt på de fleste tokimbladede ukrudtsarter samt enlige græsser der spirer fra frø. Metafol SC har ingen effekt mod rodukrudt som f.eks. kvik og tidsler.

Metafol SC optages som bladmiddel på fremspiret ukrudt, og virker som jordmiddel for den del der rammer jorden. Hermed forhindres eller svækkes eventuel nyfremspiring. Der må max. ialt anvendes 4,5 liter Metafol SC pr. ha. pr. år.

Metafol SC anvendes med bedst effekt i et sprøjteprogram, hvori indgår tankblandinger med andre roeukrudtsmidler, udsprøjet efter fremspiring af ukrudtet. Der anbefales normalt 3 (evt. 4) sprøjtninger.

## Forslag til renholdelsessystemer med Metafol SC - liter pr. ha:

Lille til almindelig ukrudtsmængde - ingen dominerende	
1. sprøjtning første ukrudt på kimpladstadiet	1,4 liter SweDane Betasana 2000 + 0,2 liter Ethofol 500 SC + 1,5 liter Metafol SC + olie
2. sprøjtning 6-8 dage efter 1. sprøjtning	1,4 liter SweDane Betasana 2000 + 0,2 liter Ethofol 500 SC + 1,5 liter Metafol SC + olie
3. sprøjtning 1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved nyfremspiring	1,4 liter SweDane Betasana 2000 + 0,2 liter Ethofol 500 SC + 1,5 liter Metafol SC + olie

Almindelig til stor ukrudtsmængde - korsblomsfede ukrudt, pileurt, buresnerre, storkenæb evt. hundepersille	
1. sprøjtning første ukrudt på kimpladstadiet	1,5-2,0 liter SweDane Betasana 2000 + 0,2 liter Ethofol 500 SC + 1,5 liter Metafol SC + olie
2. sprøjtning 6-8 dage efter 1. sprøjtning	2,0 liter SweDane Betasana 2000 + 0,2 liter Ethofol 500 SC + 1,5 liter Metafol SC + olie
3. sprøjtning 1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved nyfremspiring	2,0 liter SweDane Betasana 2000 + 0,2 liter Ethofol 500 SC + 1,5 liter Metafol SC + olie

Ved forekomst af hundepersille tilsættes 0,3 liter Matrigon pr. ha i hver sprøjtning.

Ethofol SC indhold: 500 g Ethofumesate pr. liter.

NB: Det er vigtigt at der altid sprøjtes på ukrudt i kimpladstadiet.

Under tørre forhold i sprøjteperioden kan det være en fordel at afkorte intervallerne mellem sprøjtningerne, og fordele de nævnte doseringer på 4 sprøjtninger.

## Olietilsætning

Tilsætning af olie øger sikkerheden for god virkning af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen:

Under 15°C	0,5-0,7 liter DLG Super-olie pr. ha
15-20°C	0,2-0,5 liter DLG Super-olie pr. ha
Over 20°C	undlades normalt olietilsætning

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med høje temperaturer og blæst uden nedbør, anbefales uafhængigt af temperaturen tilsætning af 0,5-0,7 liter DLG Super-olie pr. ha.

## Sprøjteteknik

En dyse der giver små dråber og dermed optimal dækning og tilbageholdelse af sprøjtevæsken bør foretrækkes.

Der anvendes 150-200 liter vand pr. ha - Hardi dyse 4110-12/14.

Fremstillet af: AgroDan A/S · Skolegade 81, 3. sal · DK-6700 Esbjerg · Tlf. 76 11 48 00

## Fremstilling af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, hvorefter Metafol SC tilsættes gennem sien. Husk omrøring. Når Metafol SC er fuldt fordelt tilsættes SweDane Betasana 2000 og Ethofol 500 SC. DLG Super-olie tilsættes herefter.

## Vejrforhold

Metafol SC og tankblandinger hvori midlet indgår, virker bedst på saftspændte, varme tørre planter under gode vækstforhold.

Tankblandinger med SweDane Betasana 2000 udsprøjtes under kølige vejrforhold først på dagen. I perioder med varmt og sroligt vejr sprøjtes sidst på dagen.

I perioder med store temperaturforskelle mellem dag og nat, f.eks. varme dage efterfulgt af lave nattemperaturer, evt. nattefrost, frarådes sprøjtning.

## Afstand til andre behandlinger

Det anbefales, at der er en uges afstand til andre sprøjtninger. Evt. kvikbekæmpelse med Fusilade X-tria, Agil eller Gallant anbefales først udført, når kvikken er fri for eventuelle svidninger efter forudgående sprøjtning.

## Renngøring af sprøjtning

Inden fremstilling af sprøjtevæsken, skal det sikres, at sprøjten er ren og absolut fri for eventuelle rester fra tidligere sprøjtninger.

Efter sprøjtning med Metafol SC og/eller tankblandinger med andre roemidler rengøres sprøjten grundigt. DLG Sprøjterens er et effektivt og sikkert middel. Følg brugsanvisningen.

## Bemærk

Blandinger med Metafol SC, SweDane Betasana 2000 og Ethofol 500 SC er normalt skånsomme overfor roer, der er sunde og i normal vækst. Ved behandling under afvigende vejrforhold eller på svækkede roer p.g.a. rodband evt. mangelsygdomme kan der opstå forbigående vækstdepressioner. Røer der er skadet af f.eks. sandflugt, bør først behandles når sårhelingen er overstået.

## Blandinger

Udover de i sprøjteplanerne nævnte blandinger kan Metafol SC blandes med DLG Cyperb og Pirimor G. Det frarådes at blande med DLG Dimethoat 40 eller evt. andre midler der kan indeholde organiske opløsningsmidler.

## Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

## Opbevaring

Frostfrit.

# AgroDan A/S