

MITAC[®] 20 EC

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr på prydplanter i væksthuse

ANALYSE

Amitraz 200 g/ltr. (21,2%)

Indeholder solvent naphta (råolie) tung aromatisk

Flydende.



Brandfarlig

Sundhedsskadelig

ADVARSEL

Insektmiddel nr. 6-170

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

Kan give lungeskade ved indtagelse (R65)

Undgå kontakt med øjnene og indgå indånding

Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler skal følges ved anvendelsen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt fx. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr på prydplanter i væksthuse

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Emballagen må ikke genanvendes.

Førstehjælp:**Generelt**

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding

Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende

Indtagelse

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand. Personen holdes i ro, og der søges lægehjælp. Fremkald ikke opkastning.

Hudkontakt

Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med rigelige vand og sæbe

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge.

1 liter

Skal opbevares frostfrit

BRUGSANVISNING

Afgrøder

Mitac 20 EC anvendes i bla. rosenkulturer.

Anvendelsesområde og virkningsspectrum

Mitac 20 EC anvendes til bekæmpelse af skadedyr på pryddplanter i væksthuse

Virkemåde

Mitac 20 EC er et lokalsystemisk kontaktmiddel med en god indtrængningsevne der bekæmper væksthusspindemider. Mitac 20 EC er skånsom overfor bier samt mariehøns og visse andre nyttige insekter, som lever af bl.a. bladlus, spindemider og bladlopper.

Sprøjteteknik

Der sprøjtes til begyndende afdrypning, normalt svarende til 150-200 ml pr. m².

Sprøjtetidspunkt

Mitac 20 EC kan anvendes til bekæmpelse af væksthusspindemider i bl.a. rosenkulturer. Der sprøjtes ved begyndende angreb.

Doserings og anvendelseskema

Væksthusspindemider - (Tetranychus urticae)	Dosering
Larver/nymfer& voksne	0,25% Mitac 20 EC, svarende til 250 ml pr. 100 liter væske*
Æg/larver/nymfer& voksne	0,25% Mitac 20 EC + 0,04% Apollo® 50 SC.

* Behandling gentages efter behov

Produktmæssige begrænsninger

- *Da tålsomheden overfor andre pryddplanter end roser, både af Mitac 20 EC og af blandingen med Apollo 50 SC, enten ikke er kendt eller kan variere afhængig af bl.a. sort og art, bør der altid foretages en prøvesprøjtning med mindst 14 dages iagttagelsestid før større arealer behandles. Især nyudviklede blade og blomster kan være følsomme.*

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser.