


ND Betafam SE

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer og rødbeder



Etikette nr.: ✓
GODKENDT

17 MAR. 2011

for pakninger på 20L
Miljøstyrelsen

MILJØFARLIG

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovlige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer og rødbeder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn .

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Sørg for frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.

Hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i 10 min. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge.

Nedab ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Brugsanvisning

Indeholder: Phenmedipham 157 g/l

ND Betafam SE anvendes til bekæmpelse af ukrudt i sukkerroer, foderroer og rødbeder. ND Betafam SE er formuleret med særlig henblik på at have god effekt ved anvendelse alene, men er tillige velegnet til at indgå i tankblanding med andre produkter som ND Ethofumesat 500, ND Metamitron 700 eller Matrigon.

ND Betafam SE er virksomt mod de fleste tokimbladede frøkrudsarter i kimbladstadiet frem til 2-4 løvblade, men bekæmper ikke rod ukrudt (tidsler, mælkebøtter).

Virkningen sker ved optagelse gennem bladene og er uafhængig af jordtype og jordfugtighed, men det er af stor betydning for god virkning, at udsprøjtningen sker med fin forstøvning, så der sikres god dækning af alle planter. Bedste bekæmpelse af ukrudt i roer fås ved behandling flere gange med passende interval.

Anvendelse

For at opnå en god bekæmpelse af et stort antal ukrudtsarter i roerne er det nødvendigt at sprøjte med en tankblanding af produkterne ND Betafam SE + ND Ethofumesat 500 eller ND Betafam SE + ND Ethofumesat 500 + ND Metamitron 700.

Det er nødvendigt at foretage behandling 2 eller 3 gange med en dosering afpasset efter plantestørrelse og temperatur ved behandlingen.

Dosering og sprøjtetidspunkt for bederoer

ND Betafam SE anvendes som vist i efterfølgende skema. Der er angivet blandinger af 3 produkter, og der kan foretages små ændringer i de angivne mængder, hvor forholdene bedømmes at være til stede.

For at opnå det bedste resultat med ND Betafam SE og evt. blandinger med denne skal der tilstræbes at sprøjte med små dråber for at få en god dækning af alle blade, og for at være sikker på, at også små ukrudtsplanter bliver ramt af sprøjtevæske.

Hardi dyse 4110-14 med tryk på 3 bar, 6 km/t og 180 l vand pr. ha.

eller ISO F/LD 110-025 med tryk 3 bar, 6 km/t og 200 l vand pr. ha.

Sprøjteplan	Liter pr. ha.
1. sprøjtning: Når ukrudt og roer har store kimblade	1,5 ND Betafam SE 0,04 ND Ethofumesat 500 1,0 ND Metamitron 700
2. sprøjtning: 7-10 dage efter 1. sprøjtning	1,5 ND Betafam SE 0,05 ND Ethofumesat 500 1,0 ND Metamitron 700
3. sprøjtning: 10-14 dage efter 2. sprøjtning	1,5 ND Betafam SE 0,05 ND Ethofumesat 500 1,0 ND Metamitron 700

Det er også muligt at anvende fuld dosering 0,14 l/ha af ND Ethofumesat 500 i 1. behandling, hvis ukrudtet er over 2-bladsstadiet. Efterfølgende 2. og 3. behandling skal så være uden ND Ethofumesat 500.

Løsningen er velegnet på arealer i god kultur med moderat ukrudtsbestand og nøje afpasning af rettidig behandling og gode sprøjteforhold.

Ved større forekomst af tidsel, kamille og gul okseøjle bør der også tilsættes 0,3 l pr. ha af et Clopyralid 100 g/l produkt (Matrigon, Cliophar m.fl.)

Tilsætning af penetreringsolie kan øge/sikre virkningen af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen.

Under	15°C	0,5 l "superolie" pr. ha.
Fra	15-20°C	0,2 l "superolie" pr. ha.
Over	20°C	Olietilsætning undlades

Anvendes penetreringsolie af typen Sun Oil 11-E bruges højere dosering af olien. Se etiketten for den valgte olie. Under særlig tørre forhold, hvor planterne har udviklet et kraftigt vokslag, efter flere dage med høje temperaturer og blæst, anbefales det at anvende 0,5 liter "superolie" pr. ha.

Ved anvendelse af førnævnte anvisninger er det en forudsætning for at opnå et godt resultat, at sprøjtningerne foretages på de nævnte tidspunkter, idet de angivne sprøjtninger skal ses som en samlet løsning. Ved unormale forhold, hvor der kan være opstået et særligt behov for ekstra virkning, kan der anvendes højere doseringer af midlerne enkeltvis eller samlet.

Den samlede dosering af ND Metamitron og ND Ethofumesat må ikke overstige henholdsvis 2100 g a.s./ha (3 l/ha) og 71 g a.s./ha (0,14 l/ha).

Det må ligeledes iagttages, at kulturen ved behandling skal være i sund vækst, og at roerne ved 1. sprøjtning i kimbladstadiet kun skal have lav ND Ethofumesat 500 dosering. Der skal sprøjtes på tørre planter uden udsigt til regn inden for 2 timer.

Rødbeder

Behandling kan foretages, når rødbeder har 2 blivende blade med ND Betafam SE alene eller i tankblanding med ND Metamitron 700 med doseringer som i bederoer.

Tilberedelse af sprøjtevæske

De anviste tankblandinger kan blandes på følgende måde:

1. Fyld tanken halvt med vand.
2. Tilsæt ND Metamitron 700 under omrøring og tilsætning af mere vand.
3. ND Betafam SE tilsættes, når ND Metamitron 700 er helt opløst og omrøring fortsættes.
4. ND Ethofumesat 500 tilsættes.
5. Penetreringsolie tilsættes.

Rengøring af sprøjten:

Efter ND Betafam SE sprøjtning skylles hele sprøjten straks igennem med rent vand, også selv om den næste dag igen skal bruges til ND Betafam SE. Den tomme emballage skylles godt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Opbevaring

ND Betafam skal opbevares køligt, men frostfrit.

Bortskaffelse af emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Deklaration:

Phenmedipham 157 g/l.

Ukrudtsmiddel nr. 242-21.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Aktivstof: phenmedipham 157 g/l ved 20°C.

Indhold 20 l.

UN 3082

Nedab ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg