

ND Mastana SC

Svampemiddel Mancozeb 455 g/l

"Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og blomsterløg."

Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63)
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)
Irriterer åndedrætsorganerne (R37)
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet.
Undgå indånding af aerosoltåger.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og blomsterløg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Førstehjælp

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Brugsanvisning

ND Mastana SC er et svampemiddel til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og blomsterløg.

ND Mastana SC's virkemåde:

ND Mastana SC er et kontaktvirkende svampemiddel, som anvendes forebyggende mod kartoffelskimmel og rodfiltsvamp på blomsterløg.

Aktivstoffet blokerer for forskellige enzymprocesser, således at svampesporer ikke kan spire og udvikles på behandlede plantedele. Den specifikke virkemåde medfører, at svampe ikke har mulighed for at udvikle resistente typer. Virkningstiden afhænger af de klimatiske forhold, smittetryk samt afgrødens tilvæksthastighed.

ND Mastana SC er formuleret med en meget lille partikelstørrelse og indeholder samtidig forskellige overfladeaktive hjælpestoffer. Derfor opnås en særdeles god fordeling og vedhæftning af det aktive stof. Indholdet af mangan (91 g/l) og zink (11,6 g/l) kan desuden stimulere bladudviklingen i nogle afgrøder.

Behandlingsindeks 1.0 = 3,3 | ND Mastana SC

ND Mastana SC's anvendelsesområde:

ND Mastana SC bør udsprøjtes på tørre planter og ikke umiddelbart før kraftig regn eller vanding.

Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før indhøstning.

Dosering og anvendelse

| Skadegørere | Dosering | Sprøjtefrist |
|-------------|----------|--------------|
|-------------|----------|--------------|

Kartofler

| | | |
|------------------------|----------|--------|
| Kartoffelskimmel | 3,3 l/ha | 7 dage |
|------------------------|----------|--------|

Første sprøjtning inden rækkerne lukker eller efter varsling.

Følgende sprøjtninger med 7-10 dages intervaller efter behov.

Afsvampning af blomsterløg

Rodfiltsvamp

| | |
|------------------|-----------------|
| Gråskimmel | 2,5 % opløsning |
|------------------|-----------------|

Inden lægning neddyppes løgene 1 time i opløsningen.

Sprøjteteknik

Den gode effekt af sprøjtemidlet sikres bedst ved at planten dækkes så godt som muligt af sprøjtemidlet. Det enkelte sprøjteudstyr og opgaven samt vejr- og vindforhold bestemmer, hvordan dette bedst kan lade sig gøre. Der kan således vælges en dysetype, der giver små dråber, hvilket medfører, at der kun skal anvendes en lille vandmængde pr. ha. Vind- og afdrift skal til enhver tid undgås, og husk altid at overholde det for produktet angivne afstandskrav til søer og vandløb.

Sprøjtevæskens tilberedning

Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggelig rengjort med et egnet rengøringsmiddel og eftersat for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, filtre og sier. Tanken fyldes 3/4 op med vand. Den afmålte mængde ND Mastana SC tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Blandinger

I landbrugsafgrøder kan ND Mastana SC blandes med insektmidler.

Rengøring af sprøjten:

Efter ND Mastana SC sprøjtning skylles hele sprøjten straks igennem med rent vand, også selv om den næste dag igen skal bruges til ND Mastana SC. Den tomme emballage skylles godt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjte-væsken. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Deklaration

Svampemiddel nr. 242-24.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Mancozeb 455 g/l.

Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit.

Indhold: 18 l.

NEDAB APS – Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg