

**Advarsel**

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

• Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53) • Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdata-

**Miljøfarlig**

blad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler • Vask huden efter arbejdet • Emballage må ikke genbruges • Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf • **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret og ikke senere end 2 måneder før høst** • For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides • **Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand** • **Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandlingen** • **Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje • **Opbevarer utilgængeligt for børn** • **Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer**



Nicanor® 20 SG

UKRUDTSMIDDEL

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORNOG FORÅRET.

Ukrudtsmiddel, nr. 3-175

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Metsulfuron-methyl

Vægtprocent: 200 g/kg (20% w/w)

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER

FORSTEHJÆLP: Indånding: Bring personen ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Drik 1 eller 2 glas vand. Søg læge i alvorlige tilfælde. Vis etiketten, hvis det er muligt.

Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Skift tøj, hvis det er gennemblødt. Ved vedvarende hudirritation, søg læge. **Øjenkontakt:** Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Ved vedvarende irritation af øjne, søg læge. **Nødtelefon:** (+45) 3531 3531

Registreringsindehaver:
DUPONT DANMARK ApS
Skøjtevej 26 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 47 98 00
www.dupontagro.dk

Distributør:
Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V.
P.O. Box 355 - NL-3830 AK Leusden, Holland
www.mabeno.com

® Registreret varemærke: Makhteshim-Agan Holland B.V.

Fabrikationsnr.: Se emballagen.

Fabrikationsdato:

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikationsdato.



8718077002347

K-19381/30810 - DENMARK



DENMARK

100 g e
opløseligt granulat

6218-DEC12-AF





BRUGSANVISNING

Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.

Generel information

NICANOR® 20 SG er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og vintersæd uden udlæg.

NICANOR® 20 SG optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.

NICANOR® 20 SG optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stopper dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer da planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer

kommer først efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskedet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.

NICANOR® 20 SG har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.

Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal dyrkes andet end korn.

Virkningsspektrum

Når brugsanvisningen følges, har NICANOR® 20 SG effektiv virkning (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende



BLACK





effekt, især på arter nævnt under "Effektiv virkning".

Effektiv virkning:

Agergåseurt	Hundepersille	Raps, spild
Agersennep	Hyrdetaske	Stedmoderblomst, ager
Agertidsele*	Kamille, lugtløs	Svinemælk*
Fuglegræs, alm.	Kamille, skive	Tvetand, rød
Gulurt (Amsinckia)	Pengeurt, alm.	Valmue, korn
Hanekro	Pileurt, bleg	Ærenpris, flerfarvet
Haremad	Pileurt, fersken	Ærenpris, storkronet

God virkning (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet):

Forglemmigej, mark	Okseøj, gul	Pileurt, vej
Hejrenæb	Pileurt, snerle	

Svag virkning:

Burresnerre	Mælde, svine-	Ærenpris, mark
Galtetand arter	Natskygge, sort	Ærenpris, vedben

Gåsefod, hvidmelet Nælde, liden

Jordrøg, læge Vindaks**

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet.

** svingende virkning

Begrænsning i anvendelse

NICANOR® 20 SG må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.

Begrænsning i anvendelse – efterfølgende afgrøde

Hvis der er anvendt **op til 20 g NICANOR® 20 SG pr. ha**, kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinter- og vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.

Hvis der er anvendt **mere end 20 g NICANOR® 20 SG pr. ha**, kan der ikke dyrkes vinterraps inden for 6 måneder efter be-



BLACK





handlingen.

Der kan ikke dyrkes roer, grønsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år NICANOR® 20 SG er anvendt eller det følgende år.

Der ikke må anvendes produk-ter indeholdende tribenuron-methyl, metsulfuron-methyl, iodosulfuron, triasulfuron eller thifensulfuron i samme vækstår, som NICANOR® 20 SG anvendes.

Omsåning af et areal behandlet med NICANOR® 20 SG

Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn må der ikke anvendes NICANOR® 20 SG, ALLY® ST, EXPRESS® ST, HARMONY® PLUS ST eller andre sulfonyleurea produkter.

Anvendelse

Dosering: Der må maksimalt anvendes 30 g NICANOR® 20 SG pr. ha. per sæson

VINTERSÆD

Vinterhvede, triticale, vinterrug og vinterbyg*: Stedmoderblomst, flerfarvet ærenpris, storkronet ærenpris, lugtløs kamille, alm. fuglegræs, spildraps, hanekro, hyrdetaske, alm. pengeurt, rød tvetand, korn valmue og andre ukrudtsarter nævnt under "Effektiv virkning".

Forår:

Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt, men kan anvendes med god virkning, indtil fanebladet bliver synligt i vinterhvede og vinterrug - stadie 37. I vinterbyg må NICANOR® 20 SG ikke anvendes efter begyndende strækning - stadie 30.





Ukrudt 0-4 løvblade (opfølgning af efterårsbekæmpelse):

Dosering: 10 – 15 g NICANOR® 20 SG pr. ha.

Ukrudt 0- 4 løvblade (ingen efterårsbekæmpelse):

Dosering: 15 – 20 g NICANOR® 20 SG pr. ha.

Ukrudt > 4 løvblade og/eller dominerende agerstedmoderblomst og flerfarvet/storkronet ærenpris:

Dosering: 20 – 30 g NICANOR® 20 SG pr. ha.

* **Vinterbyg:** Der kan anvendes op til 20 g NICANOR® 20 SG (4 g.a.s.) pr. ha pr. vækstsæson i vinterbyg, hvis afgrøden er i god vækst.

Burresnerre: Blandingen NICANOR® 20 SG + TOMAHAWK® 180 kan udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans. Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme, opnås den bedste sam-

lede effekt ved at udsprøjte NICANOR® 20 SG tidligt og TOMAHAWK® 180 senere - evt. sammen med andre midler.

Dosering: 15 – 30 g NICANOR® 20 SG + 0,6 l TOMAHAWK® 180 pr. ha.

Dosering af NICANOR® 20 SG ud fra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af TOMAHAWK® 180 kan justeres efter anbefaling på produktets etikette.

Tilsætning af sprede-/klæbemiddel:

Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til NICANOR® 20 SG, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af NICANOR® 20 SG. Ved doser under 18,75 g/ha og tørt vejr, kan tilsætningen af 0,05% sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen således, at der i nogle tilfælde kan opnås en tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse.





VÅRSÆD

Agerstedmoderblomst, hanekro, lugtløs kamille og andre ukrudtsarter nævnt under "Effektiv virkning".

Behandling foretages på fugtig jord og saftspændte ukrudtsplanter med kimblade - 4 løvblade.

Dosering: 15 – 20 g NICANOR® 20 SG pr. ha.

Højeste dosering ved mange agerstedmoderblomster og flerfar-vet/storkronet ærenpris.

Gul okseøjje: Behandling foretages på fugtig jord med saftspændte ukrudtsplanter med kimblade - 4 løvblade.

Dosering: 15 – 20 g NICANOR® 20 SG + 0,5 l BRIOTRIL® CM pr. ha.

Tilsætning af 0,05% sprede- / klæbemiddel kan med fordel erstatte Briotril® CM, til bekæmpelse af gul okseøjje, især under

tørre forhold med voks på bladene. En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes bekæmpelse af hvidmelet gåsefod. I vårsæd må NICANOR 20 SG ikke anvendes efter begyndende strækning - stadie 30.

Maksimaldosering:

For at sikre at den mængde Nicanor® 20 SG, der rammer jorden overholder kravene til godkendelsen, tilpasses den maksimalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadium.

Afgrødens vækststadium Zadoks	Maksimal dosering Per hektar
Fra st. 12	10 g
St. 25-29	10 g
St. 30	15 g
St. 31	28 g
St. 32	30 g





Nicanor® 20 SG indeholder aktivstoffet tribenuron-methyl, som tilhører virkemådeklasse: **HRAC gruppe: B**

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende.

Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonyleurea produkt, er arten resistent over for alle produkter i virkemåden HRAC gruppe: B. Der er fundet flere tilfælde af resistens i alm. fuglegræs, kornvalmue, kamille, et enkelt tilfælde af hanekro, lugtløs, vindaks og gul okseøje samt flere tilfælde af agerrævehale.

Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjt en tankblanding af disse to midler.

Anbefalinger

- 1) Hvis der er konstateret resistens over for NICANOR® 20 SG, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet, effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
- 2) For at forebygge, at der opstår resistens, anvendes Nicanor® 20 SG i tankblanding efter følgende retningslinjer:
Efterårsanvendelse:
To-kimbladet ukrudt: Der tankblandes med Briotril/Duotril, diflufenican eller eventuelt med et bredspektret græsmiddel der også bekæmper to-kimbladet ukrudt
Forårsanvendelse:
For nuværende anbefales det at udsprøjt Nicanor® 20 SG i tankblanding med anbefalet dosering af fluroxypyr-holdige produkter (f.eks. Tomahawk) eller Briotril/Duotril.





Sprøjteteknik, vandmængde og sprede-klæbemiddel

NICANOR® 20 SG udsprøjtes med en teknik der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend fladsprededyser, f.eks. en ISO 110-02 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse. Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledningen.

For at sikre en optimal optagelse og effekt ved lave doseringer, kan NICANOR® 20 SG udsprøjtes med tilsætning af et spredeklæbemiddel, se anbefalinger.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:

Korn (der anvendes 100 – 200 l vand pr ha)

Dyse: ISO F - 02-110 eller ISO LD-02-110

Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l vand pr ha
Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l vand pr ha

Dyse: ISO F - 025-110 eller ISO LD-025-110

Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l vand pr ha
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l vand pr ha

Anbefalede non-ionisk sprede-klæbemiddel:

AGROPOL, DLG CONTACT.

Dosering: 50 ml/100 liter vand.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde rester, der frigøres





og giver skade i en senere afgrøde. Påfyldning skal ske på plads med opsamling eller i marken. Dette gælder alment for alle produkter.

Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt det beregnede mængde NIKANOR® 20 SG direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede-klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet.

Sprøjtetanken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.

Sprøjteudstyret

Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

Straks efter endt udsprøjtning af NIKANOR® 20 SG skal sprøjtemateriellet rengøres grundigt, også selv om sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at "fedthinder" og belægnings af sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en eventuel indtørring i filtre med videre.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages, så overlapninger undgås.

Rengøring af sprøjteudstyr efter NIKANOR® 20 SG

Alle sprøjter skal have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10 - 15 % af tankens kapacitet, som sikrer tilstrækkelig rengøringen indvendig kan ske i den mark, der lige er be-





handlet.

Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er mindre end 2 % af den oprindelig koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.

Indvendig rengøring af sprøjten.

BEMÆRK! Husk at aktivere alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtet udover den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter All Clear™ Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom

og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.

4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear™ Extra pr. 10 liter vand.



BLACK





Blandinger med andre midler

NICANOR® 20 SG kan generelt blandes med relevante ukrudts og svampemidler i korn. NICANOR® 20 SG kan endvidere blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2kg/100l vand og der må ikke blandes med sprede-/klæbemiddel. Der bør maksimalt blandes 2 produkter.

Praktisk erfaring har vist at NICANOR® 20 SG kan blandes med Agropol, Amistar®, Boxer®, Briotril®, Comet®, chlormequat, DFF-Oxitril®, DLG-Contact, Duotril, Folicur®, Gratil®, Lissapol®, maneb, manganprodukter, Maredo 125 SC, Opus®, Orius 200 EW, Oxitril® CM, Primus®, Starane® XL, Stereo®, Tilt® Top, Tomahawk® og Zenit®.

Bortskaffelse af tom emballage og rester

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

EAK-kode: 02010500

FORHOLDSREGLER

Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: "Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler".

- **ved fremstilling af sprøjtevæsken anvendes:**
Handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigts-skærm.
- **ved udbringning anvendes:**





Marksprøjte (*spredébom på traktor, bom < 1 m over jordoverfladen, tryk < 3 bar*): Handsker, støvler og overtræksbukser. Hvis førerhuset er lukket, anvendes handsker og overtræksbukser kun udenfor førerhuset.

Se også Arbejdstilsynets vejledning: "SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER".

• **ved transport:**

ADR/RID: UN-NR.: 3077

Benævnelse: Miljøfarligt fast stof n.o.s.
(metsulfuron-methyl 20 %)

Klasse: 9

Forpakningsgruppe: III

Punkt: 12 (c)

BRAND

Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer

som f.eks. gødning.

Passende slukningsmidler: CO₂, pulver, vandtåge eller skum. Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.

Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.

Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulilter, svovlilter og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

SPILD

Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet.





Produktet fejes sammen og opsamles sammen med evt. forurenet jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hvis der er spildt nær værdifulde beplantninger, fjernes straks 5 cm af jordoverfladen.

Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Varemærke registreret af:

Express[®], Harmony[®]: DuPont; All Clear™ Extra: Service Chemicals; Comet[®], Opus[®]: BASF; Oxitril[®], DFF-Oxitril[®], Folicur[®]: Bayer CropScience; Briotril[®], Nicanor[®], Stereo[®], Tilt[®] Tomahawk[®]; Makhteshim-Agan; Amistar[®], Lissapol[®], Zenit[®]: Syngenta; Starane[®], PRIMUS[®]: DowAgroScience.



BLACK





 OPEN HERE
Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

• Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53) • Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler • Vask huden efter arbejdet • Emballage må ikke genbruges

• Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf • **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret og ikke senere end 2 måneder før høst** • For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides • **Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand** • Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandlingen • **Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje • **Opbevarer utilgængeligt for børn** • **Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer**

**Miljøfarlig**

Nicanor® 20 SG

UKRUDTSMIDDEL

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET.

Ukrudtsmiddel, nr. 3-175

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Metsulfuron-methyl

Vægtprocent: 200 g/kg (20% w/w)

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER

FORSTEHJÆLP: Indånding: Bring personen ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Drik 1 eller 2 glas vand. Søg læge i alvorlige tilfælde. Vis etiketten, hvis det er muligt.

Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Skift tøj, hvis det er gennemblødt. Ved vedvarende hudirritation, søg læge. **Øjenkontakt:** Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Ved vedvarende irritation af øjne, søg læge. **Nødtelefon:** (+45) 3531 3531

Registreringsindehaver:
DUPONT DANMARK ApS
Skøjtevej 26 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 47 98 00
www.dupontagro.dk

Distributør:
Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V.
P.O. Box 355 - NL-3830 AK Leusden, Holland
www.mabeno.com

® Registreret varemærke: Makhteshim-Agan Holland B.V.

Fabrikationsnr.: Se emballagen.

Fabrikationsdato:

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikationsdato.



K-19381/30810 - DENMARK



DENMARK

100 g e
opløseligt granulat

6218-DEC12-AF

CYAN MAGENTA JAUNE BLACK



DENMARK 10 x 100 g

Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

• Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53) • Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler • Vask huden efter arbejdet • Emballage må ikke genbruges • Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf • **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret og ikke senere end 2 måneder før høst** • For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides • **Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand** • Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandlingen • Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjte udstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje • Opbevares utilgængeligt for børn • **Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer**



Miljøfarlig



Nicanor® 20 SG

UKRUDTSMIDDEL

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET.

Ukrudtsmiddel, nr. 3-175
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmid-delforordningen 1107/2009.

Analyse: Metsulfuron-methyl

Vægtprocent: 200 g/kg (20% w/w)

Se også brugsanvisningen under FORHOLDS-REGLER.

FØRSTEHJÆLP: Indånding: Bring personen ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Drik 1 eller 2 glas vand. Søg læge i alvorlige tilfælde. Vis etiketten, hvis det er muligt.

Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Skift tøj, hvis det er gennemblødt. Ved vedvarende hudirritation, søg læge.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Ved vedvarende irritation af øjne, søg læge. **Nødtelefon:** (+45) 3531 3531

Registreringsindehaver:
DUPONT DANMARK ApS
Skøjtevej 26 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 47 98 00
www.dupontagro.dk

Distributør:
Makhteshim-Agan
Benelux & Nordic B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Holland
www.mabeno.com

© Registreret varemærke: Makhteshim-Agan Holland B.V.

Fabrikationsnr.: Se emballagen.
Fabrikationsdato:
Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.



6218-DEC12-C

BLACK P.151 P.021



Fabrikatio