

Nuance® WG**Ukrudtsmiddel**

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL: Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. **Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.** Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i virafrøgrøder i vækststadiet 11-28 er 5,0 g Nuance/ha og i vækststadier over 28 er den 10,0 g Nuance/ha. For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 5,0 g Nuance/ha i vækststadiet 11-29. Om foråret er den maksimale dosis 10,0 g Nuance/ha i vækststadier over 30. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (SPe1). **Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se sikkerhedsdatabladet for Nuance® WG



Etikette nr: VI

GODKENDT

18. maj 2015

for pakninger på
Miljøstyrelsen 100 gram

100 gr

10033340

Brugsanvisning:**Afgroeder:**

Nuance® WG kan anvendes i korn (vår- og vintersæd). Nuance® WG bekæmper de fleste 2-kimbladede ukrudtstarter som forefindes i marken.

Anvendelsesområder:

Nuance® WG er et selektivt systemisk herbicid som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

Virkemåde

Midlet optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes at et bestemt enzym (acetolactace syntasen (ALS)) blokeres. Hos følsomme planter vil først celledelingen og senere væksten ophøre. Hos tolerante planter f.eks. korn nedbrydes og inaktiveres ukrudtsmidlet umiddelbart efter optag.

Selvom der går mellem 1-3 uger før der er synlig effekt på ukrudtet, i form af gulnede visnende planter, er væksten standset på få timer. Denne proces fremmes af tørre, varme forhold.

Før at opnå en optimal bekæmpelse bør ukrudtet sprøjtes når det har 2-4 blade, er saftspændte og i god vækst – se desuden dosering og anvendesskemaet. Ved lave

temperaturer (fra 6 °C) er effekten af Nuance® WG god, hvis ukrudtet er i vækst. Et par dage med let nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen (når midlet er indtørret) påvirker ikke effekten.

Bemærkning

Nuance® WG må kun benyttes i korn. Undgå vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker hvor der skal dyrkes andet end korn.

Hvis en forårsbehandlet mark skal omsås, må der kun omsås med korn. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der ikke anvendes minimidler.

Efteråret efter behandling med Nuance® WG kan der sås korn, evt. med udlæg af græs/kløver og vinterraps. Der bør ikke plantes/sås specialafgrøder hvis der er brugt Nuance® WG om foråret. Der er ingen begrænsninger i afgrøder som kan sås i foråret, året efter brug af Nuance® WG.

Nuance® WG kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

Har man brugt Nuance® WG er det ikke tilladt at anvende andre midler indeholdende tribenuron, iodosulfuron, metsulfuron og thifensulfuron i samme vækstår.

Virkningsspektrum

Hvis brugsanvisningen følges, har Nuance® WG god effekt (> 85%) på de fleste

ukrudtsarter i korn. Samme effekt kan opnås med reduceret dosis hvis ukrudt behandles på det rigtige tidspunkt under optimale betingelser.

Effekt ved 10 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

God effekt på arter såsom:

Agersennep	Haremad	Pileurt, fersken
Agertidse *	Hyrdetaske	Raps, spild
Brandbæger, alm	Kamille, lugtløs	Pragtstjerne, aften
Forglemmigej, mark	Kamille, skive	Skræppe, kruset
Fuglegræs, alm.	Krumhals	Spergel, alm.
Gulurt	Limurt, nat	Svinemælk *
Gåsefod, hvidmelet	Pengeurt, alm.	Valmue, korn
Hanekro		Pileurt, bleg

** Frøfremspirede planter*

God effekt (hvis bekæmpning sker i kimbladsstadiet)

Agerstedmoder	Mælkebøtte	Pileurt, vej
Kornblomst	Pileurt, snerle	Tvetand, rød

Svag effekt på arter såsom:

Burresnerre	Natskygge, sort	Oksesøje, gul
-------------	-----------------	---------------

Jordrøg, læge

Nælde, liden

Storkronet Ærenpris

Effekt ved 5 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

God effekt på arter såsom:

Agersennep

Kamille, skive

Forglemmigej, mark

Krumhals

Fuglegræs, alm.

Pengeurt, alm.

Gulurt

Pileurt, bleg

Gåsefod, hvidmelet

Pileurt, fersken

Hanekro

Raps, spild

Haremad

Spergel, alm.

Hyrdetaske

Valmue, korn

Kamille, lugtløs

Anvendelse om foråret

Vårsæd:

Behandling foretages bedst på fugtig jord og saftspændte ukrudtsplanter i stadie 10 til 14, dvs. fra kimbladsstadiet til ukrudtet har fået 4 løvblade. I vårsæd må Nuance® WG bruges fra afgrødens stadie 13 til stadie 28, dvs. fra kornet har 3 udfoldede blade indtil begyndende strækning.

Dosering: 5 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

I senere vækststadier efter afgrødens stadie 28 kan Nuance® WG desuden benyttes med god effekt.

Dosering: 10 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel**Vintersæd**

Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt. Nuance® WG kan med god virkning bruges fra vækststadiet 30 i vinterhvede, vinter byg, triticales og rug.

Dosering: 10 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel**Anvendelse om efteråret****Vintersæd**

Behandling foretages bedst i det tidlige efterår, når væksten er begyndt. Nuance® WG kan med god virkning bruges fra vækststadiet 11 frem til stadie 29, dvs. indtil begyndende strækning, i vinterhvede, vinter byg, triticales og rug.

Dosering: 5 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

BEMÆRK! Nuance® WG må ikke anvendes senere end 6 uger før høst i korn.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før Nuance® WG fyldes i. Fyld 3/4 af den ønskede

vandmængde i beholderen, tilsæt Nuance® WG og tilsæt resten af vandet. Derefter sættes returløbet eller omrøring i gang. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen.

Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr.

Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor, Nuance® WG skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:

1. 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål
2. 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål
3. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og §3-naturbeskyttelsesområder

Påfyldning på arealer, hvor Nuance® WG udbringes, må ikke ske nærmere end:

1. 300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og
2. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt §3-naturbeskyttelsesområder

Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

Sprøjteteknik

I nedenstående tabel ses en oversigt over forskellige vandmængder, ved to forskellige lowdriftsdyser, hastighed og arbejdstryk. Eksempler på vandmængder ved brug af 02 (gul) og 025 (lilla) dysen ved forskelligt tryk og kørehastighed.

Dyse	Tryk (2-4 bar)	Km/t (max 8-10 km/t)	Vandmængde (l/ha)
02/025	3,3	4	250/315
02/025	2,6	4	225/279
02/025	3,5	6	175/220
02/025	2,5	6	150/180
02/025	2,5	8	110/140
02/025	2,0	8	100/120

Ved lav plantetæthed og forholdsvist små planter, kan de små vandmængder pr. ha benyttes. Ved kraftige, tætte afgrøder kan det være nødvendigt, at øge vandmængden.

For at sikre en optimal optagelse og effekt, udsprøjtes Nuance® WG altid med tilsætningen af et sprede/klæbemiddel.

Anbefalede sprede/klæbemidler:

Swedane Contact, Lissapol Bio og Zipper kan benyttes.

Rengøring af sprøjte

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l All Clear® Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.

4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.
5. Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal.

Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Nuance® WG er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.12.2014.

Tankblandinger

Nuance WG, kan blandes med følgende produkter:

Amistar, Approach, Bell, Briotril 400 EC, Comet, Cycocell 750, Quadro 25 EC, DFF, Fastac 50, Foxtrot, Folicur EC 250, Karate 2,5 WG, Legacy 500 SC, Lodin 200 EC, Mavrik 2F,

Moddus M, Oxitril CM, Pirimor G, Primera Super, Primus, Saracen, Sempra, Starane 180S, Starane XL, Stereo 312,5 EC, Tern, Tilt 250 EC, Tomahawk 180 EC, Nuance WG må ikke blandes med produkter der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, met-sulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. (Accurate 20 WG, Accurate Delta, Alliance, Ally ST, Ally SX, Atlantis OD, Cossack OD, Express ST, Express SX, Harmony Plus, Harmony SX, Hussar OD, Othello, Trimmer 50 SG, Zoom).

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylle-vandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.

Førstehjælp

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydeligt påvirkning.

Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastninger uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.

Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Brug gerne en øjenskyller. Søg læge hvis symptomerne vedvarer.

Resistens

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af eventuelt naturligt forekommende resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende.

Hvis en ukrudtsart er resistent overfor et sulfonylurea produkt baseret på aktivstoffer såsom Tribenuron, Metsulfuron-methyl eller Thifensulfuron, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet tilfælde af resistens overfor sulfonylureamidler

hos fuglegræs, kornvalmue og kamille samt et enkelt tilfælde i hanekro. Udviklingen af resistens kan undgås ved at skifte mellem herbicider med forskellige virkemekanismer og overholde doseringsraterne. Tankblandinger med to herbicider med forskellige virkemekanismer kan også virke forebyggende mod udvikling af resistens.

Nuance® WG tilhører resistensgruppe: HRAC B.

Anbefalinger:

Hvis der konstateres resistens over for Nuance® WG, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet effektivt middel med anden virkningsmåde.

Generelle betingelser og ansvar:

Cheminova A/S fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Registrerede varemærker:

Cheminova: Cuadro 25 EC, Foxtrot, Saracen, Accurate 20 WG, Accurate Delta
Syngenta: Amistar, Karate 2,5 WG, Moddus M, Pirimor G, Tilt 250 EC, Zoom
DuPont: Approach, Ally ST, Ally SX, Express ST, Express SX, Harmony Plus, Harmony SX

BASF: Bell, Comet, Cycocell 750, Fastac 50
Bayer: DFF, Primera Super, Atlantis OD, Cossack OD, Hussar OD, Othello, Folicur EC 250,
Oxitril CM
Adama: Briotril 400 EC, Legacy 500 SC, Stereo 312,5 EC, Tern, Tilt 250 EC, Tomahawk
180 EC, Trimmer 50 SG, Mavrik 2F
Dow: Primus, Starane 180S, Starane XL
UPL: Lodin 200 EC, Sempra
Nufarm: Alliance
Service Chemicals: All Clear Extra

Godkendelse af Nuance® WG til mindre anvendelse i korn med udlæg af foder- og frøgræsser.

Godkendelse af Nuance® WG til mindre anvendelse til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i strandsvingel om efteråret efter høst af dæksæd. Behandlet halm må ikke opfodres.

Godkendelse af Nuance® WG til mindre anvendelse til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo på udyrkede arealer. Behandlet plantemateriale må ikke opfodres.

Godkendelse af Nuance® WG til mindre anvendelse til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i stivbladet svingel til frøproduktion, om efteråret efter høst af dæksæd. Behandlet halm må ikke opfodres.

Ansvar for mindre anvendelses vejledning: Mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets primære etikette.

Mindre anvendelse er på brugers eget ansvar.

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om mindre anvendelses vejledningen

følges. Da Cheminova A/S udarbejder og søger mindre anvendelses godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Cheminova A/S ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede mindre anvendelses vejledning til afgrøden følges. Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Når Nuance® WG benyttes til mindre anvendelse i frøgræsser, bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med. Herved kan der i vejledningen tages højde for lokale forhold, samt eventuelle sortsvariationer.

Vejledning for Tribenuron-holdige ukrudtsmidler: Nuance® WG anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn med udlæg af foder- og frøgræsser. Nuance® WG anvendes

til bekæmpelse af kæmpe bjørneklo på udyrkede arealer. Nuance® WG anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i stivbladet svingel og strandsvingel efter om efteråret efter høst af dæksæd.

Tribenuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres tribenuron methyl umiddelbart efter optagelsen

Advarsel: Se etiketten for Nuance® WG.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger til mindre anvendelses må ikke overskrides.

ANVENDELSESOMRÅDE

Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Advarsel: Se etiketten. Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Arter: Bjørneklo

Dosis/ha: 10 g + 0,1 % sprede/klæbem.

Tid: På nytilvækst. Planter, hvis nyvækst ikke er tydeligt gulfarvet efter ca. 3 uger, behandles igen. Der må maksimalt behandles 3 gange pr. år.

Bemærkninger: Nuance® WG + spredklæbemiddel udsprøjtes med rygsprøjte på enkeltplanter. Udbringningen kan ske med marksprøjte eller tilsvarende materiel ved større sammenhængende bestande af Kæmpebjørneklo.

Opfodring behandlet materiale: Nej.

Efterårsanvendelse efter høst af dæksæd i strandsvingel og stivbladet svingel til frø

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

Tid: Efterår på ukrudtets stadium 10-12.

Bemærkninger: Behandles når ukrudtet er i vækst igen efter høst.

Opfodring behandlet materiale: Nej.

Korn med udlæg af græs til foder/"grønne marker"

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

Tid: Ukrudtets stadium 10-14.

Bemærkninger: Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 1-2 blade. Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle sig normalt efter høst. I kløvergræs kan kløveren skades/ hæmmes.

Opfodring behandlet materiale: Ja.

Korn med udlæg af: Alm. Rajgræs, Engrapgræs, Hundegræs, Italiensk Rajgræs og Rødsvingel til frø

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

Tid: Ukrudtets stadium 10-14.

Bemærkninger: I enkelte af forsøgene er der set forbigående påvirkning af udlægget, uden påvirkning af udbyttet. Nuance® WG kan evt. udsprøjtes i tankblanding med produkter indeholdende loxonil/bromoxinil eller fluroxypur.

Opfodring behandlet materiale: Ja.

Efterårsanvendelse efter høst af dæksæd i følgende arter: Alm. Rajgræs, Engrapgræs, Hundegræs, Italiensk Rajgræs, Rødsvingel, Engsvingel, Rajsvingel og hybrid Rajgræs til frø

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

Tid: Efterår på ukrudtets stadium 10-12.

Bemærkninger: Behandles når ukrudtet er i vækst igen efter høst.

Opfodring behandlet materiale: Ja.

Hybrid, italiensk og almindelig Rajgræs udlagt i ren bestand efter høst

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

Tid: Efterår på ukrudtets stadium 10-12.

Bemærkninger: Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet har 0-4 blade og udlægget fuldt fremspiret med 2-3 blade.

Opfodring behandlet materiale: Ja.

**Brugsanvisning til mindre anvendelse
af Nuance® WG (11-39) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF).*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar. Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Cheminova A/S og Dansk Golf Union kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og

midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Nuance® WG (11-39) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner

Virkemåde: Tribenuron-methyl er det virksomme stof i Nuance® WG, det er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor det hæmmer dannelsen af aminosyre valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper.

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i fairways, semi-rough og rough til behandling af kløver og andet frøkrudt.
- For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august-31.juli).
- Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Bør ikke anvendes på baner, hvor planterne er stressede på grund af tørke, stærk varme, frost, sygdomme, dårlig overvintring eller næringsmangel.

Advarsel: "Se Nuance® WG etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Nuance® WG til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner

Skadegører: Kløver og andet frøkrudt.

Dosering: På veletablerede baner med en kraftig bestand af kløver, må der anvendes 10 gram pr. hektar.

Nuance® WG	Dosis l/ha
1. sprøjtning	10 gram pr. hektar

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr: Nuance® WG kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret, når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Under meget tørre forhold vil virkningen være nedsat, og der bør ikke behandles. Der skal være 4 timers tørvejr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Vent indtil duggen er ved at tørre ind. Begyndende virkning kan ses som gulfarvning efter 10-15 dage, men fuld virkning indtræffer først efter 4-6 uger.

Nuance® WG udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Tanken fyldes kvart med vand og midlet tilsættes. Der fyldes op med vand. Spredde/klæbemiddel tilsættes lige før sprøjten er fuld. Ved blanding med andre præparater tilsættes Nuance® WG først, og efter 3 - 5 minutters omrøring, tilsættes det andet produkt. Til sidst tilsættes klæbemiddel.

Antal behandlinger: Maksimalt én behandling om året.

Risiko for skade:

Generelt: Ved symptom på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Fremkald evt. opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne brugsanvisning.

Behandling symptomatisk: På grund af den lave giftighed vil entydige forgiftningssymptomer ikke optræde. Symptomer kan være kvalme, hovedpine og diarré.

Bortskaffelse af emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Risiko- og sikkerhedssætninger: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Nuance® WG

Ukrudtsmiddel nr.: 11-39.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indhold: Tribenuron-methyl 750 g/kg (75% w/w).

Type: Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdatoen.

Produktionsdato: Se print på dunken.

Batch nr.: Se print på dunken.

Opbevaring: I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Producent og godkendelsesindehaver:



Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9
7673 Harboøre, www.cheminova.dk



5 703265 005081

10036481