Vårsæd: Fra kornets 1-4 bladstadie og frem til stadium 31.

Vintersæd forår: Så snart ukrudtet er saftspændt, væksten begyndt og indtil stadium 31.

Vintersæd efterår: Fra kornets 1-bladstadie (3-4 uger efter såning). Sprøjtning bør ikke udføres ved udsigt til vedvarende frost.

Frøgræsmarker: Der sprøjtes om foråret, så snart væksten er startet, og ukrudtet er småt, med 0,2 ltr Oxitril CM pr. ha. I blanding med et egnet middel som f. eks. Starane 180. Blandingen bør kun anvendes i en periode med god vækst og en døgntemperatur på min. 7-8°C. Alternativt kan Oxitril CM blandes med Primus der har god effekt også under kølige forhold.

Frøgræs udlagt i renbestand: Der sprøjtes tidligt, når græsset har 1-2 blade (stadium 11-12) med 0,2 ltr Oxitril CM pr. ha. i tankblanding med et egnet produkt. Frøgræshalm fra behandlede arealer kan anvendes til opfodring. Vedrørende ukrudtsarter, som bekæmpes i frøgræs, henvises til skemaet "Doserings- og anvendelsesskema".

Dosering

Oxitril CM udsprøjtes med 0,15 - 0,2 ltr/ha, afhængig af ukrudtets udviklingstadie, ukrudtssammensætning samt blandingspartner. Under optimale sprøjteforhold og -teknik kan doseringen og tankblandingspartneren tilpasses behovet efter følgende vejledende oversigt. For tankblandingen af DFF og Oxitril henvises til DFF etiketten for nærmere vejledning.

Blandinger

Oxitril CM® kan blandes med Atlantis OD, Gratil/Eagle, Hussar OD, Ally, Boxer, DFF, Express, Harmony Plus, Primera Super, Starane 180S, Stomp SC, Primus, Starane XL, svampemidler, insektmidler og CCC. Desuden med chelaterede mikronæringsstoffer eller max. 2,0 kg mangansulfat pr. 100 liter vand.

Klimaets betydning

Oxitril CM udsprøjtes på ukrudt, der er i vækst. Esterformuleringen betyder, at produktet kan bruges helt ned til 2°C, blot der er udsigt til stigende temperatur. Ved udsigt til frost bør sprøjtning undlades. Efter frost er planterne generelt svækkede, og sprøjtning bør først udføres, når planterne igen er saftspændte. Har en eventuel blandingspartner større krav til klimaet, følges disse. Oxitril CM formuleringen er kun lidt afhængig af luftfugtigheden. Høj luftfugtighed vil dog gavne plantevæksten og dermed også virkningshastigheden. Oxitril CM kræver kun 1 times tørvejr efter udsprøjtning.

Jordtype - jordfugt

Jordtypen har ingen betydning for Oxitril CM's virkning, men ved efterårsanvendelse kan jordtype og især jordfugt være vigtig ved blanding med jordmidler som DFF, Stomp og Boxer.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning.

Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.

Produktmæssige begrænsninger

Oxitril CM må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøer (søer, vandløb mv.). Oxitril CM + Express kan i havre give en forbigående gulfarvning, især ved anvendelse i en kølig periode eller i en periode med store temperatursvingninger. Gulfarvningen er forbigående og normalt uden udbyttemæssige konsekvenser.

Rengøring af sprøjteudstyr

Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten.

Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau.

Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Efterfølgende afgrøde

I tilfælde af omsåning – f.eks i forbindelse med udvintring af en efterårsbehandlet afgrøde kan alle almindelige landbrugsafgrøder dyrkes. Ligeledes giver Oxitril CM ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde året efter anvendelse.

7.2012

Doserings og anvendelsesskema – Vårsæd

	Vårsæd med og uden græsudlæg til foder *)
Ukrudtsproblem	**Ukrudt op til 2 løvblade**
Forglemmigej Hyrdetaske Hvidmelet gåsefod Kamille	0,2 ltr. Oxitril CM
Fuglegræs Stedmoder Tvetand Ærenpris	0,15 ltr Oxitril CM + 0,05 DFF
Ovennævnte spektrum udvides og forstærkes ved at tankblande Oxitril eller DFF-Oxitril med f.eks.	1 tbl. Express/Harmony Plus eller 20-35 ml Hussar OD**

*) Tjek blandingspartneren for muligheden for anvendelse i græsudlæg eller græs i renbestand.
**) Hussar OD må ikke anvendes i havre

RIFMO

PMR: DK79376758F | **Bayer CropScience DK**

Form.: 1138x150,5
Artwork: 9824a
Job no.: 31-4158/1958

Date: 18-07-2012
Country: DK
Colour: **CMYK**

☑ Use only for corrections
☐ Print Ready PDF for upload to Server

Doserings og anvendelsesskema – Vintersæd

	Vintersæd	
	Efterår*	**Forår***
Ukrudtsproblem	**Ukrudt op til 2 løvblade**	
Forglemmigej Hyrdetaske Hvidmelet gåsefod Kamille	0,2 ltr. Oxitril CM	
Fuglegræs (efterår) Stedmoder Tvetand Ærenpris	0,15 ltr Oxitril CM + 0,05 DFF	0,2 ltr Oxitril + 0,07 DFF
Ovennævnte spektrum udvides og forstærkes ved at tankblande Oxitril eller DFF-Oxitril med f.eks. disse midler, der samtidig giver effekt på græsukrudt	Boxer eller Stomp eller Othello **	Hussar OD*** eller Atlantis OD**

*) Oxtitril CM må kun anvendes en gang pr. vækstsæson.
**) Othello og Atlantis OD må ikke anvendes i vinterbyg, og bemærk at der er maximaldoser i rug.
***) Hussar OD må ikke bruges med mere end 25 ml pr. ha. i vinterbyg.

5 705628 254792

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 4523 5000
www.bayercropscience.dk

Bayer CropScience

Oxitril CM®

5 liter ℮

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs

® = Bayer CropScience

DK79376758F

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse (R65).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Farlig ved indtagelse (R22).
Irriterer øjnene og huden (R36/38).
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67).
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).
Undgå indånding af aerosoltåger.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Vask alle personlige værnemidler efter brug.
Undgå kontakt med huden.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke behandles senere end i vækststadie 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage før høst.
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Førstehjælp

Indånding:	Bring personen i frisk luft.
Hud:	Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjne:	Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og læge kontaktes.
Indtagelse:	Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Ukrudtsmiddel nr. 18-428
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse

Bromoxynil octanoate	291,1	g/l (27,37% w/w)
svarende til bromoxynil	200	g/l
Ioxynil octanoate	268,1	g/l (24,80% w/w)
svarende til ioxynil	200	g/l

Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk

Netto 5 liter
Flydende

Fabr.nr. og dato: Påtrykt emballagen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.

5 705628 254792

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 4523 5000
www.bayercropscience.dk

Bayer CropScience

Oxitril CM

Brugsanvisning

Afgrøder

Oxitril CM kan anvendes efterår og forår i alle kendte arter og sorter af vinter- og vårsæd samt i frøgræsmarker tidligt forår og frøgræs udlagt i renbestand når græsset har 1-2 blade. Udlægsmarker med hvid- og rødkløver, lucerne, sneglebælg, frøroer etc. kan behandles med Oxitril CM, hvis behandlingen udføres umiddelbart efter, at udlægget er sået. Græsudlæg kan behandles, når græsset har 1-2 blade.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Oxitril CM er et skånsomt ukrudtsmiddel, som er effektivt over nogle, bredbladede ukrudtsarter. Anvendes Oxitril CM alene, opnås tilfredsstillende effekt ved sprøjtning på ukrudt med op til 2 løvblade. Efter 2 bladstadiet anbefales det at anvende en tankblanding (se doseringsskema).

Virkemåde

Oxitril CM optages af ukrudtets blade og virker som et kontaktmiddel. Oxitril CM er en esterformulering. Esterformuleringer optages under vanskelige klimatiske forhold lettere og hurtigere i ukrudtet end saltformuleringer. Oxitril CM virker derfor også i køligt vejr og ved lav luftfugtighed.

Sprøjteteknik

Oxitril CM udsprøjtes på saftspændt ukrudt. Oxitril CM udsprøjtes i min. 150 ltr vand pr. ha. Anvend fladsprededyser, f.eks. Hardi ISO F 02-110 med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-Drift dyse. Ved forekomst af store ukrudtsplanter med et kraftigt vokslag, som f.eks. spildraps, agersennep og haremad, anvendes dyser med mindre dråbestørrelse, eller trykket øges til 4 bar. Dette vil give en bedre dækning og forhindre sprøjtedråberne i at løbe af ukrudtsplanterne. Vær opmærksom på vinddrift, især når der sprøjtes nær vandmiljøer, anvend LowDrift dyser.

Sprøjtetidspunkt

Generelt: Vær opmærksom på ukrudtets størrelse – effekten aftager kraftigt hvis ukrudtet bliver stort.
Oxitril CM anvendes kun en gang pr. sæson.