

Etikette nr.: IV  
GODKENDT

26 MAJ 2008

for pakninger på 10 x 1 Ltr  
Miljøstyrelsen

### Brugsanvisning

#### Afgrøder:

Pelican kan anvendes i vintersæd (byg, hvede, rug og triticale) og i vårsæd (vårbyg og vårhvede). Må ikke anvendes senere end kornets vækststadium 31 (BBCH).

#### Anvendelsesområder:

Pelican er især effektiv over for vinterannuelle ukrudtsarter, herudover opnås en hæmning af kamille og burresnerre.

#### Virkemåde:

Pelican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som kontaktmiddel. Ved udspøjtning danner Pelican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages ved fremsprøjtning af nyt ukrudt. Kan give hvide pletter på afgrøden ved sen sprøjtning. Synlig effekt kan observeres efter 2-5 dage som afblegning og afsvidning af ukrudtet samt ved hvidfarvning af ukrudtet. Nyfremspiret ukrudt kan fremspire normalt for så senere at hvidfarves og gå ud.

#### Bemærk:

I enkelte tilfælde kan der efter behandlingen ses hvide pletter på afgrøden, pletterne forsvinder i løbet af få dage og har ingen betydning for udbyttet.

#### Dosering:

Pelican udspøjttes med 0,06 – 0,25 l/ha afhængigt af ukrudtets udviklingsstadium og sammensætning (jf. anvendelses- og doseringsskemaerne).

#### Blandinger:

Pelican kan blandes med mini-midler, Oxitral CH og Boxer.

#### Tilberedning af sprøjtevæsken:

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Pelican og fyld op med den resterende vandmængde. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Alle bekæmpelsesmidler bør behandles med forsigtighed, og egnet beskyttelsesudstyr bør anvendes. Når sprøjtearbejdet er afsluttet foretages en normal, grundig rengøring af udstyret.

#### Sprøjteteknik:

Pelican udspøjttes i 150-200 l vand pr. ha. Det anbefales at anvende f.eks. Hardi's ISO F02 dyse med et tryk på 3 bar (eller en tilsvarende low drift dyse), hvilket giver kørehastigheder på 4,8-6,5 km/t for opnåelse af 150-200 l/ha.

#### Rengøring af sprøjte:

Sprøjten bør rengøres med vand umiddelbart efter sprøjtningens afslutning ved at fortynde en eventuel rest 10 gange og udspøjtne denne på den netop behandlede afgrøde. Herefter spules tanken med

10% af sit rumindhold 2 gange. Skyllervandet udspøjttes på et areal, hvor eventuelle rester ikke kan gøre skade. Alle ventiler på sprøjten bør betjenes således, at skyllervandet kommer rundt i alle kroge. Skyllervandet må ikke løbe i kloakker, dræn, brønde og lignende. Udvendig rengøring af traktor og sprøjte med vand bør gøres på et græsdekket areal efter sprøjningens afslutning.

#### Omsåning & efterfølgende afgrøde:

Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde, der er behandlet med Pelican om efteråret, kan alle afgrøder sås efter pløjning. Korn kan sås efter en grundig harvning. Ved såning af vinterraps efter en Pelican behandlet afgrøde anbefales det at pløje inden såning.

#### Klima:

Pelican kan bruges helt ned til 2°C, blot der er udsigt til stigende temperatur. Ved udsigt til frost bør sprøjtning undlades. Efter frost er planterne generelt svækkede, og sprøjtning bør først udføres, når planterne igen er saftspænde.

#### Jordtype & jordfugtighed:

På humusjorde kan der være nedsat effekt af Pelican. God jordfugt på sprøjtetidspunktet og i perioden umiddelbart herefter vil øge effekten og langtidseffekten af Pelican.

#### Bortskaffelse af tom emballage:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllervandet hældes op i sprøjtevæskan.

#### Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer samt foderstoffer. Skal opbevares frostfrit.

#### Fareklasse:

Miljøfarlig.

#### Førstehjælp:

**Indånding:** Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge. Medbring denne brugsanvisning.

**Hudkontakt:** Fjern forurenede tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe.

**Øjenkontakt:** Skyl straks med vand (helst fra en øjenskyller) i mindst 20 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring denne brugsanvisning.

DIFLUFENICAN

**Pelican**  
UKRUDTSMIDDEL

10 x 1 liter



Miljøfarlig

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg og vårhvede.

Ukrudtsmiddel: Nr. 11-20.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Deklaration: 500 g/l (42.4%) Diflufenican

Indhold: 1 liter

Type: Flydende

Batch nr:

ADVARSEL

FORSIGTIG

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

- Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (RS0/S3).
- Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
- Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

- Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg og vårhvede.
- Må ikke anvendes senere end vækststadium 31.
- Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte
- Må ved doseringer op til 0,12 l/ha ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
- Må ved doseringer over 0,12 l/ha ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)
- Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke kommes i kloakfløb.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP

**Indånding:** Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge. Medbring brugsanvisning.


**Hudkontakt:** Fjern forurenede tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe.

**Øjenkontakt:** Skyl straks med vand (helst fra en øjenskyller) i mindst 20 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring brugsanvisning.

Producent og godkendelsesindehaver:

**CHEMINOVA**

Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig





Etikette nr.: ✓  
GODKENDT

26 MAJ 2008

for pakninger på 1 Liter  
Miljøstyrelsen

DIFLUFENICAN

# Pelican

## UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg og vårhvede.

Ukrudtsmiddel: Nr. 11-20.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Deklaration: 500 g/l (42.4%) Diflufenican

Indhold: 1 liter

Type: Flydende

Batch nr: Se på flaskens hals.

ADVARSEL

FORSIGTIG

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

- Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/S3).
- Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovlige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
- Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

- **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg og vårhvede.**
- **Må ikke anvendes senere end vækststadium 31.**
- **Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**
- **Må ved doseringer op til 0,12 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)**
- **Må ved doseringer over 0,12 L/ha ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)**
- **Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke kommes i kloakfløb.**
- **Opbevares utilgængeligt for børn.**
- **Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Læs brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP

**Indånding:** Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge. Medbring brugsanvisning.

**Hudkontakt:** Fjern forurenede tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe.

**Øjenkontakt:** Skyl straks med vand (helst fra en øjenskyller) i mindst 20 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring brugsanvisning.

Producent og godkendelsesindehaver:

 **CHEMINOVA**

Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig



Miljøfarlig

### Brugsanvisning

#### Afgrøder:

Pelican kan anvendes i vintersæd (byg, hvede, rug og triticale) og i vårsæd (vårbyg og vårhvede). Må ikke anvendes senere end kornets vækststadium 31 (BBCH).

#### Anvendelsesområder:

Pelican er især effektiv over for vinterannuelle ukrudtsarter, herudover opnås en hæmning af kamille og burresnerre.

#### Virkemåde:

Pelican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner Pelican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages ved fremspræng af nyt ukrudt. Kan give hvide pletter på afgrøden ved sen sprøjtning. Synlig effekt kan observeres efter 2-5 dage som aflegning og afsivning af ukrudtet samt ved hvidfarvning af ukrudtet. Nyfremspiret ukrudt kan fremspire normalt for så senere at hvidfarves og gå ud.

#### Bemærk:

I enkelte tilfælde kan der efter behandlingen ses hvide pletter på afgrøden, pletterne forsvinder i løbet af få dage og har ingen betydning for udbyttet.

#### Dosering:

Pelican udsprøjtes med 0,06 – 0,25 l/ha afhængigt af ukrudtets udviklingsstadiet og sammensætning (jf. anvendelses- og doserings-skemaerne).

#### Blandinger:

Pelican kan blandes med mini-midler, Oxitril CM og Boxer.

#### Tilberedning af sprøjtevæsken:

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Pelican og fyld op med den resterende vandmængde. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Alle bekæmpelsesmidler bør behandles med forsigtighed, og egnet beskyttelsesudstyr bør anvendes. Når sprøjtearbejdet er afsluttet foretages en normal, grundig rengøring af udstyret.

#### Sprøjeteknik:

Pelican udsprøjtes i 150-200 l vand pr. ha. Det anbefales at anvende f.eks. Hardi's ISO F02 dyse med et tryk på 3 bar (eller en tilsvarende low drift dyse), hvilket giver kørehastigheder på 4,8-6,5 km/t for opnåelse af 150-200 l/ha.

#### Rengøring af sprøjte:

Sprøjten bør rengøres med vand umiddelbart efter sprøjningens afslutning ved at fortynde en eventuel rest 10 gange og udsprøjte denne på den netop behandlede afgrøde. Herefter spules tanken med 10% af sit rumindhold 2 gange. Skyllevandet udsprøjtes på et areal, hvor eventuelle rester ikke kan gøre skade. Alle ventiler på sprøjten bør betjenes således, at skyllevandet kommer rundt i alle kroge. Skyllevandet må ikke løbe i klokker, dræn, brønde og lignende.

Udvendig rengøring af traktor og sprøjte med vand bør gøres på et græsdekket areal efter sprøjningens afslutning.

#### Omsåning & efterfølgende afgrøde:

Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde, der er behandlet med Pelican om efteråret, kan alle afgrøder sås efter pløjning. Korn kan sås efter en grundig harvning.

Ved såning af vinterraps efter en Pelican behandlet afgrøde anbefales det at pløje inden såning.

#### Klima:

Pelican kan bruges helt ned til 2°C, blot der er udsigt til stigende temperatur. Ved udsigt til frost bør sprøjtning undlades. Efter frost er planterne generelt svækkede, og sprøjtning bør først udføres, når planterne igen er saltspændte.

#### Jordtype & jordfugtighed:

På humusjorde kan der være nedsat effekt af Pelican. God jordfugt på sprøjteøjeblik og i perioden umiddelbart herefter vil øge effekten og langtidseffekten af Pelican.

#### Bortskaffelse af tom emballage:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes ved dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

#### Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer samt foderstoffer. Skal opbevares frostfrit.

#### Fareklasse:

Miljøfarlig.

#### Førstehjælp:

**Indånding:** Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge. Medbring denne brugsanvisning.

**Hudkontakt:** Fjern forurenede tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe.

**Øjenkontakt:** Skyl straks med vand (helst fra en øjenskyller) i mindst 20 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring denne brugsanvisning.



Anerkendt af Danmarks Jordbrugs Forskning til bekæmpelse af: forglemmevej, figlegræs, haremåd, hydrætaske, natlumurt, raps, agerstedmoder, tvetand, mark-, vedbend- og storkroket ærenpris i vinterhvede med 0,25 l/ha Pelican i stadiet 11-12.



791411 0819

800 ml

600 ml

400 ml

200 ml

### Behovsbestemt anvendelses- og doseringsskema

Pelican

Afgroede	Vintersæd		
	0-2 løvblade	3-4 løvblade	4-6 løvblade
Ukrudtets udvikling			
Ager-Stedmoder			0,12 l/ha
Forglemmigej		0,12 l/ha	
Hyrdetaske	0,06 l/ha		0,25 l/ha
Haremad			
Fuglegræs			1)
/Erenpris			0,25 l/ha
Tvetand		0,25 l/ha	
Nat-Limurt			
Raps	0,12 l/ha		
Fersken-Pileurt			2)
Vej-Pileurt		2)	
Burre-Snerre	2)		
Kamille	3)	3)	

- 1) Når fuglegræs har 4-6 løvblade, kan der opnås en god effekt ved 0,25 l/ha Pelican + 1/2 tabl. Express.
- 2) Ved 0,25 l/ha Pelican opnås en hæmning af de pågældende arter. For optimal kontrol anbefales blanding med Oxitril CM. Se doseringsskemaet for Pelican og Oxitril CM til højre.
- 3) Ved 0,25 l/ha Pelican opnås en kraftig hæmning af kamille med 0-4 løvblade. Effekten forbedres ved 0,25 l/ha Pelican + 1/2 tabl. Express.

### Behovsbestemt anvendelses- og doseringsskema

Pelican

Afgroede	Vårbyg og vårhvede	
	0-2 løvblade	3-4 løvblade
Ukrudtets udvikling		
Ager-Stedmoder		
Forglemmigej		
Hyrdetaske	0,06 l/ha	0,15 l/ha
Fuglegræs		
/Erenpris		
Tvetand	0,15 l/ha	
Fersken-Pileurt		1)
Vej-Pileurt		
Burre-Snerre	1)	
Kamille		

- 1) Ved 0,15 l/ha Pelican opnås en hæmning af de pågældende arter. For optimal kontrol anbefales blanding med Oxitril CM. Se doseringsskemaet til højre.

### Behovsbestemt anvendelses- og doseringsskema

Pelican + Oxitril CM

Afgroede	Vintersæd		Vårbyg og vårhvede
	Efterår	Forår	Forår
Ukrudtets udvikling	0-2/3-4 løvblade	2-4/5-6 løvblade	0-4 løvblade
Ager-Stedmoder			
Forglemmigej			0,04 l/ha Pelican +
Fuglegræs			0,2 l/ha Oxitril CM
Haremad	0,05/0,08 l/ha	0,1/0,12 l/ha	
Hyrdetaske	Pelican	Pelican	
Kamille	+	+	
Kornblomst (efterår) <sup>1)</sup>	0,15/0,25 l/ha	0,5/0,6 l/ha	
Tvetand	Oxitril CM	Oxitril CM	
/Erenpris			
Hanekro			
Burre-Snerre <sup>2)</sup>			
Agersennep			0,08 l/ha Pelican +
Bleg pileurt			0,4 l/ha Oxitril CM
Fersken-Pileurt	0,08/0,12 l/ha	0,12/0,15 l/ha	
Nat-Limurt	Pelican	Pelican	
Snerle-Pileurt	+	+	
Raps	0,25/0,4 l/ha	0,6/0,75 l/ha	
Kornvalmue	Oxitril CM	Oxitril CM	
Vej-Pileurt			

- 1) Ved forekomst af kornblomst øges Oxitril CM doseringen til 0,5 l/ha om efteråret.
- 2) Ved kraftig forekomst af Burre-Snerre tilsættes et minimiddel.