

# Pico® 750 WG

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Etikette nr: |  
GODKENDT  
21. september 2018

for pakninger på  
Miljøstyrelsen

 0,2kg &  
10x0,2kg

# 0,2 kg

 - **BASF**  
We create chemistry

### Ukrudtsmiddel

Læs først vedlagte brugsanvisning

#### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (blodsystem) (H373).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Indånd ikke pulver (P260).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt loypligtige sikkerhedsdatablad.

*Overfrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og ikke senere end BBCH 29.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

#### Førstehjælpsforanstaltninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Søg lægehjælp ved ubehag (P314).

#### Nødtilfælde

Giftlinjen tlf.: 82 12 12 12 (døgntelefon)

International BASF vagt tlf.: +49 180 2273 112

#### Ukrudtsmiddel nr. 19-171

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart granulat

Picolinafen..... 750 g/kg (75,0 %w/w)

Fast

Mindst holdbar til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen

Batchnr./Produktionsdato: Se dunken

**Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2 sal., DK-1560 København V.**

**Tlf.: 32 66 07 00, [www.agro.basf.dk](http://www.agro.basf.dk)**

**Producent: BASF Agro B.V. Arnheim (NL) Zürich Branch, 8808 präffikon SZ, Schweiz.**



© = Reg. varemærke for BASF

0000000DK0000-Denmark



### Virknings mekanisme:

Pico 750 WG består af aktivstoffet picolinafen.

Picolinafen optages via blade og rødder og virker ved at inhibere carotenoid biosyntesen. Carotenoid hindrer lysnedbrydning af klorofyl og når denne beskyttelse fjernes vil symptomerne efter en picolinafen behandling være afblegning af bladene.

### Anvendelse:

Pico 750 WG anvendes om efteråret i kornets vækststadium BBCH 11 – 12 (så snart sprøjtespor kan ses) eller i foråret når kornet er i vækststadium BBCH 25 – 29. Pico 750 WG kan anvendes alene eller i blanding med både jord- og bladmidler f.eks. Stomp.

Fugtig jord fremmer virkningen, men Pico 750 WG bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Pico 750 WG nedbrydes ikke af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode.

### Efterår på fugtig jord efter eventuel tromling.

Afgrøde	Ukrudtsarter	Dosering pr ha	Tidspunkt	Bemærkninger
vinterhvede, vinterrug, vinterbyg vintertriticale	Agersennep Alm fuglegræs Hyrdetaske Lugtløs kamille Burresnerre Agerstedmoder Rød tvetand Mark ærenpris Storkronet ærenpris Vedbend ærenpris	0,133 kg	Vækststadium BBCH 11–12	Ca. 2 uger efter behandling kan der særligt i vinterbyg ses hvide pletter, der dog forsvinder igen.

Der kan opnås hæmmende effekt på enårigt rapgræs.

### Forår når væksten er i gang.

Afgrøde	Ukrudtsarter	Dosering pr ha	Tidspunkt	Bemærkninger
vinterhvede, vinterrug, vinterbyg vintertriticale	Agersennep Alm fuglegræs Hyrdetaske Agerstedmoder Rød tvetand Mark ærenpris Storkronet ærenpris Vedbend ærenpris	0,133 kg	Vækststadium BBCH 25–29	Ca. 2 uger efter behandling kan der særligt i vinterbyg ses hvide pletter, der dog forsvinder igen. Sprøjtefrist 90 dage.

Der er ikke konstateret negative effekter på afgrøden efter brug af Pico 750 WG, man bør dog undgå at sprøjte på stressede planter f.eks. forårsaget af tørke eller manganmangel. Anbefalet vandmængde 150 – 300 L/ha.

### Efterfølgende afgrøder:

Der er ingen restriktioner for valg af efterfølgende afgrøder efter normalt sædskifte. I tilfælde af omsåning anbefales en jordbearbejdning til 15 cm's dybde og for raps bør der gå 90 dage mellem behandling og såning. Vintersæd kan etableres uden særlig jordbearbejdning.

### Resistens:

For mange herbicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Pico 750 WG består af aktivstoffet picolinafen.

Picolinafen tilhører gruppen pyridincarboxamider (HRAC gruppe F1), og vurderes til at have lav risiko for udvikling af resistens.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens.

For generelt at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

### Blanding:

Pico 750 WG kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.

### Sprøjeteknik:

Pico 750 WG skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfylddeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlappning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås.

Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, og afdrift reducerende dyser bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen for afdrift.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler.

### Tilberedning af sprøjtevæske:

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt eftersat for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

**Følgende anvisning for tilberedning skal overholdes ved brug af Pico 750 WG:** Sprøjten fyldes ½ op med rent vand, hvorefter Pico 750 WG tilsættes præparatfyldestyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. Pico 750 WG tilsættes generelt som 1. middel. Til slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/midlerne er helt opløste.

### **Præparatfyldestyret**

Ved anvendelse af præparatfyldestyret påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldestyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Pico 750 WG i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

### **Rengøring**

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

### **Tom emballage:**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges

### **Lagring:**

Pico 750 WG bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

-----

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

# Pico® 750 WG

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

# 0,2 kg

 **BASF**  
We create chemistry

### Ukrudtsmiddel

Læs først vedlagte brugsanvisning

#### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (blodsystem) (H373).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Indånd ikke pulver (P260).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt loypligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og ikke senere end BBCH 29.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPa3).**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

#### Førstehjælpsforanstaltninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Søg lægehjælp ved ubehag (P314).

#### Nødtilfælde

Giftlinjen tlf.: 82 12 12 12 (døgntelefon)

International BASF vagt tlf.: +49 180 2273 112

#### Ukrudtsmiddel nr. 19-171

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart granulat

Picolinafen..... 750 g/kg (75,0 %w/w)

Fast

Mindst holdbar til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen

Batchnr./Produktionsdato: Se dunken

**Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2 sal., DK-1560 København V.**

**Tlf.: 32 66 07 00, [www.agro.basf.dk](http://www.agro.basf.dk)**

**Producent: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, 8808 präffikon SZ, Schweiz.**



© = Reg. varemærke for BASF

00000000DK0000-Denmark



# Pico® 750 WG

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



(01)04014348610223

# 10x0,2 kg

 **BASF**  
We create chemistry

# Pico® 750 WG

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



(01)04014348610223

# 10x0,2 kg

 **BASF**  
We create chemistry

## Ukrudtsmiddel

Læs først vedlagte brugsanvisning

### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**  
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (blodsystem) (H373).  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).  
Indånd ikke pulver (P260).



Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpilgite sikkerhedsdatablad.  
*Overtredelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og ikke senere end BBCH 29.**  
**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).  
**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### Førstehjælpsforanstaltninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  
Søg lægehjælp ved ubehag (P314).

### Nødstilfælde

Giftlinjen til: 82 12 12 12 (døgntelefon)  
International BASF vagt til: +49 180 2273 112

### Ukrudtsmiddel nr. 19-171

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart granulat  
Picolinafen..... 750 g/kg (75,0 %w/w)  
Fast

Mindst holdbar til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen  
Batchnr./Produktionsdato: Se dunken

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. sal., DK-1560 København V.  
Tlf.: 32 66 07 00, [www.agro.basf.dk](http://www.agro.basf.dk)  
Producent: BASF Agro B.V. Arnheim (NL) Zürich Branch, 8808 pfäffikon SZ, Schweiz.

