

# POLYPLANT GLYFOSAT

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Polyplant Limited, OAKHAM, PO Box 26, Leicestershire, LE15 8 ZP

**For skader opstået ved transport, lagring og forkert brug af vore produkter, kan vi ikke tage ansvaret for.**

Polyplant glyfosat virker også over for kulturplanter; visse af kulturplanterne er endog meget følsomme. Vær derfor opmærksom på, at undgå vind-drift hen over naboafgrøder. Efter sprøjtning med Polyplant glyfosat bør der være mindst 6 timers tørvej, helst mere, for at sikre fuld optagelse af det aktive stof. Virkningen af Polyplant glyfosat vil normalt vise sig efter 10-20 dage, alt efter forholdene på sprøjtetidspunkt, og hvilke plantearter, der er behandlet.

Dysevalg: Fladsprededyse, f.eks. Hardi 4110-14 eller 4110-16.

**Ukrudtsmiddel, nr. 389-1**

**Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.**

**Indhold: 5 liter.**

**Analyse: Glyfosat ..... 30%**

**Præparatet indeholder 360 g glyfosat pr. liter i form af 480 g glyfosat-isopropylaminsalt.**

## **ADVARSEL**

Irriterer øjnene og huden.

Giftig for organismer, der lever i vand.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs.

Må tillige anvendes til ukrudtsbekæmpelse under frugttræer, i havebrugs- planteskole- og skovkulturer, på udyrkede arealer, efter såning og for frøspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af specielt udstyr.

Under frugttræer må midlet kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. På arealer, hvor offentligheden har adgang, må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Arealer med spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

## **Førstehjælp:**

Ved indtagelse eller inhalering: Bring personen i frisk luft og kontakt læge.

Kommer midlet i øjnene skylles straks med rigelige mængder vand.

Kommer midlet på huden vaskes straks med vand og sæbe.


Ved fortsat irritation, kontakt læge.

## **Personlig beskyttelse:**

Fuld påklædning, evt. speciel sprøjtedragt. Anvend gummistøvler. Beskyt hænder med handsker.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Læs først vedlagte brugsanvisning.



**Lokalirriterende**

# Brugsanvisning

Polyplant glyfosat anvendes til bekæmpelse af kvikgræs og andet fler-årigt græs. Det kan også anvendes til nedvisning i korn og tokimbladet ukrudt samt korsblomstrede afgrøder og ærter.

Polyplant glyfosat virker ved, at det optages gennem bladene og fordeles sig med plantens saftstrøm bl.a. ud i rodnettet. Efter 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt, og man kan f.eks. foretage den planlagte jordbehandling.

Udsprøjtningen af Polyplant glyfosat skal foretages på tørre planter. Den bedste effekt opnås, når planterne er i god vækst - altså almindelig temperatur, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed vil sædvanligvis give det bedste resultat. Hvis Polyplant glyfosat anvendes under andre forhold, må langsommere effekt forventes.

Polyplant glyfosat bekæmper kvik og andre græsser, samt det meste andet ukrudt.

## FORHOLDSREGLER VED BRUG AF POLYPLANT GLYFOSAT

Huden: Let irritation ved kontakt med koncentreret produkt.  
Øjnene: Let irritation.

### Forholdsregler:

Ved blanding af sprøjtevæsken anvendes gummihandsker og skjærm. Undgå skjærm og maske under sprøjtning, hvis forholdene medfører risiko for eksponering for sprøjtetåge. Gennemblødt tøj skal omgående skiftes. Kommer væsken på huden, vask da med sæbe og rigeligt vand. Vask hænder før måltider, før tobaksrygning og efter arbejdet.

### Egenskaber ved opvarmning og brand:

Polyplant glyfosat er ikke brandbar.

### Forholdsregler ved opvarmning og brand:

Nedkøl emballagen med vand. Ved ukontrolleret brand tages højde for giftige dampe; advar omgivelser, politi og brandvæsen.

### Forholdsregler ved spild og bortskaffelse:

Spild optages i sand eller andet neutral, sugende materiale og anbringes i lukket beholder, der efter aftale transporteres til den kommunale modtageordning eller til Kommunekemi. Væsentligt forurenede jord afgraves og fjernes på samme måde. Anvend ikke jernbeholder. Ved spild i vandløb aflukkes evt. forbindelser til dambrug. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skylllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

### Sikkerhed ved oplagring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Polyplant glyfosat skal opbevares tørt og køligt. Midlet må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

## ANVENDELSESOMRÅDER

### Udyrkede arealer:

Polyplant glyfosat anvendes til bekæmpelse af kvik og andet ukrudt. Der kan anvendes traktor, rygsprøjte, samt ukrudtsstrøger.  
Doserings: 4,0 - 6,0 l/ha. (0,04 - 0,06 l/100m<sup>2</sup>),

Til vanskeligligt bekæmpelige ukrudtsarter som f.eks. Bjørneklo anvendes 10 l/ha (0,10 l/100 m<sup>2</sup>).

### Stubmarker:

Til bekæmpelse af kvik og andre græsser, samt tokimbladet ukrudt og spiret spildfrø. Kvikken skal have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm høj. For at opnå det bedste resultat må halm og lignende fjernes.  
Doserings: 4 l/ha (100-200 l vand/ha).

### Ærter før høst:

Polyplant glyfosat anvendes i ærter til modenhed samt til bekæmpelse af kvik, andre græsser, samt tokimbladet ukrudt. Ærterne behandles når 70-75% af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øverste bælgeløse skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandinhold: 30%. Behandlingen skal foretages mindst 10 dage før høst. Ærter til udsæd må ikke behandles.

Doserings: Kvikbekæmpelse . . . . . 3 l/ha  
Nedvisning af vanskeligligt ukrudt  
så som pileurt, kamille,  
gul okseøjle og forglemmigvej . . . 4 l/ha  
Nedvisning af ærter . . . . . 4 l/ha  
Vandmængde: 100-200 l/ha.

### Korn før høst:

Til at bekæmpe kvik, andre græsser samt tokimbladet rød- og årligt ukrudt. Alle kornarter og sorter kan behandles. Korn til udsæd må ikke behandles. Korn skal behandles senest 10 dage før høst. Kernerne skal være hårde, og når man sætter neglene i kernen skal neglemærket kunne ses. Vandinholdet skal være under 30% i den mindst modne del af marken.

Doserings: 3 l/ha i 100-200 l vand/ha.

### Hestebønner:

Behandling foretages efter samme system som ærter. Behandlingsstadiet for hestebønner er når 2/3 - 3/4 af bælgene har skiftet farve d.v.s. normalt 10-14 dage før høst. Må ikke anvendes på bønner, der skal anvendes til udsæd.

Doserings: Kvikbekæmpelse . . . . . 3 l/ha  
Nedvisning . . . . . 4 l/ha  
Vandmængde: 100-200 l/ha.

### Græs:

Før sidste slået sprøjtes når græs og kvik er 10-20 cm høj, og når græsmarken ønskes omlagt. Sprøjt mindst 10 dage før sidste slået græs. Græsset må anvendes til alle normale formål.

Doserings: 3-4 l/ha i 100-200 l vand/ha.  
Polyplant glyfosat kan også anvendes på gamle græsmarker, der ønskes omlagt.  
Doserings: 4-6 l/ha. Frøgræsstub: 4 l/ha, Rødsvingel og engrapgræs dog 5-6 l/ha.

### Grankulturer:

I Rodgran, Normannsgran, Kæmpegran kan Polyplant glyfosat anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet og forårsskuddene er modne og endeknopperne dannede. Tidligst når granerne er groet fast på blivende sted.

Doserings: 3-3,5 l/ha i 400-500 l vand/ha.  
I andre træskulturer kan ønsket vegetation behandles ved afskærmning eller ukrudtsstrygning. Foretages når ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturen må ikke rammes eller komme i berøring med Polyplant glyfosat.