

Etikette nr.: I  
GODKENDT

22. december 2017

for pakninger på  
Miljøstyrelsen

2L, 3L,

5L &

10L



# POTATO Top

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

## DEKLARATION

**Svampemiddel reg. nr.: 623-5**

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om  
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009

Aktivstof: Cyazofamid 160 g/l (14,8% w/w)

Type: Midlet er et suspensionskoncentrat

Produktet er holdbart i 2 år fra produktionsdatoen, der er anført på dunken.

Produktionsdato: Se print på dunken

Batch nr: Se print på dunken

Godkendelsesindehaver: Vestjysk Agro - Ved Fjorden 6B 2. th - DK 7600 Struer.

**Emballage:**

**10 liter**

## FARE

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Forårsager alvorlig øjenskade (H318)

Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H412)

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for  
plantebeskyttelsesmidlet.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre  
straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og  
ikke senere end 7 dage før høst.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer  
end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb og søer  
mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der  
har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



## Førstehjælp:

Hvis der er bug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

**Generelle anvisninger:** Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

**Indånding:** Ro, frisk luft og lægehjælp.

**Hudkontakt:** Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

**Øjenkontakt:** VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310)

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning

# Brugsanvisning Potato Top

## Generelt

Potato Top er et svampemiddel med effekt overfor kartoffelskimmel.

Det bruges forebyggende med 7-10 dages interval.

Produktet er regnfast, når det er tørret ind på planten

### Behandlingsprogram

Når der varsles for udbrud af kartoffelskimmel sprøjtes 1. gang, det er som regel ved rækkelukning. Ved situationer med højt smittetryk behandles med 7 dages interval. Når sygdommen er mindre faretruende behandles med 10 dages interval.

### Dosering

Der anvendes 0,5 l/ha af Potato Top pr behandling.

Afgrøde	Skadevolder	Tidspunkt	Dosering	Antal behandlinger
Kartofler	Skimmel	BBCH 30-40	0,5 l/ha	6

### Tilberedning af sprøjtevæske

Sprøjtetanken fyldes med ca halvdelen med det vand, som skal bruges. Potato Top tilsættes under omrøring, mens tanken fyldes op med vand.

### Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 200 til 400 liter pr ha. Det er vigtigt at hele planten dækkes.

### Tankblanding

Potato Top kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Alle blandingsprodukter skal tilsættes efter Potato Top.

### Rengøring af sprøjteudstyr

Sprøjten tømmes for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skylllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skylllevandet ud på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand, som også sprøjtes ud på det behandlede areal.

### Resistensrisiko

Cyazofamid tilhører gruppen Quinone inside inhibitors (FARC gruppe C4). Der er høj risiko for udvikling af resistens, derfor skal følgende regler bruges.

- 1) Anvend Potato Top forebyggende
- 2) Sprøjt maksimalt 3 gange i træk med Potato Top
- 3) Potato Top må maksimalt anvendes 6 gange pr vækstsæson.
- 4) Indsæt midler med anden virkemåde.
- 5) Følg anvisningerne på etiketten.

### Lagring

Potato Top skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

### Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

### Bemærk

Vestjydsk Agro påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af forkert anvendelse af produktet i strid med de angivne instruktioner.