



Etikette nr: II
GODKENDT

18. maj 2021

for pakninger på
Miljøstyrelsen

Fraenziska Seed

0,1kg & 1kg

PRESTOP® WP

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium* og gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til bekæmpelse af agurkesyge (*Didymella bryoniae*) i agurker, i åbne og lukkede væksthuse og på friland. Til bekæmpelse af svampesygdomme på golf turf (mindre anvendelse).

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

OPBEVARES UNDER +4°C

Netto-
indhold:
100 g / 1 kg

PRESTOP® WP

Svampemiddel, reg. nr. 880-4

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder *Gliocladium catenulatum* J1446, 32% w/w, $10^7 - 10^9$ CFU/g. Midlet er et vanddispergerbart pulver (WP). Nettoindhold: 100 g.

Produktionsdato / Batch nr.: Partinummeret er trykt/stemplet på emballagen.

Holdbarhed: Sidste anvendelsesdato er stemplet på emballagen.

Forhandler:

Godkendelsesindehaver:
Danstar Ferment AG
Poststrasse 30
CH-6300 Zug, Schweiz

LALLEMAND

LALLEMAND PLANT CARE

PRESTOP® WP

ANVENDELSESOMRÅDE

Til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium* og gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i grøntsager, krydderurter og prydblister, samt til bekæmpelse af agurkesyge (*Didymella bryoniae*) i agurker, i åbne og lukkede væksthuse og på friland. Til bekæmpelse af svampesygdomme på golf turf (mindre anvendelse).

BRUGSANVISNINGER

Prestop WP blandes med vand før brug. Prestop WP tilberedes således, at pulveret først kommes i en lille mængde vand (f.eks. 1 liter) og omrøres kraftigt indtil blandingen er jævn. Derefter spædes den op til den endelige brugs-koncentration. Opløsningen kan fordeles med sprøjte, ved vanding, via drypvanding eller ved blanding i voksemediet. I et drypvandingssystem tilsættes opløsningen via en blandingstank eller separat injektionspumpe. Bland ikke Prestop WP i en stærk næringsopløsning.

Blandingens koncentration	Blandingsforhold	
	Prestop WP-pulver	Vand
0,5%	100 g	20 liter
1%	100 g	10 liter

Bekæmpelse af agurksyge på agurker og gråskimmel på tomater, paprika og agurker:

Stammen, især stambasen når det gælder sortplettet råd, sprøjtes med 0,5% Prestop WP med fokus på sårstederne. Anvend ca 10 liter til 500 planter. Den første sprøjtning udføres straks efter udplantning eller senest efter, at der første gang er fjernet blade. Behandlingen gentages med 3-4 ugers mellemrum.

Bekæmpelse af gråskimmel på prydblister og småplanter af grøntsager:

Anvend 0,5% opløsning. Stiklinger behandles i stiklingsfasen, småplanter ved udplantningen. Behandlingen gentages efter behov med 3-4 ugers interval. Stiklinger kan også dyppes i 0,5% opløsning før udplantning. Behandling af stiklinger anbefales kun til urteagtige vækster.

Bekæmpelse af rodsygdomme:

Bedste tidspunkt for behandling er ved såning-, kultivering- og/eller udplantningstidspunktet. Behandlingen gentages med 3-4 ugers mellemrum.

Anbefalede mængder:

I agurker, tomater, paprika og prydvækster anvendes 200-250 g Prestop WP/1000 planter. Ved blanding i vækstmediet anvendes der 200-500 g pulver/m³. For at være sikker på at præparatet fordeles jævnt, blandes Prestop WP i vækstmediet efter opløsning i vand. Stiklinger behandles med 5-10 g Prestop WP/m² i forbindelse med vandingen (vandmængden tilpasses vækstmediets vandindhold). Hvor der er tale om enkelte planter i plantebeholdere eller krukke, vædes vækstunderlaget med f.eks. 0,5% Prestop WP. Mængden afhænger af krukken, beholderens eller rodklumpens størrelse jf. følgende tabel:

Pottestørrelse (vol)	Liter 0,5% Prestop WP pr. 1000 planter	Gram Prestop WP pr. 1000 planter
100 ml	4-10	20-50
250 ml	10-25	50-125
500 ml	20-50	100-250
1 liter	40-100	200-500

PRESTOP® WP

MINDRE ANVENDELSE AF PRESTOP WP PÅ GOLFBANER:

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for mindre anvendelse af Prestop WP på golfbaner til forebyggelse og bekæmpelse af svampeangreb

Biologisk svampemiddel:

- Må kun anvendes på golfbaner til forebyggelse og bekæmpelse af svampeangreb
- Max 5 behandlinger pr. sæson
- Anvendes i en bekæmpelsesstrategi med Mycostop WP.

Advarsel: "Se Prestop WP etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for mindre anvendelse af Prestop WP på golfbaner til forebyggelse og bekæmpelse af svampeangreb

Skadegørere: Skadegørere: *Fusarium*, møntplet (*Sclerotinia homoeocarp*), sneskimmel (*Microdochium nivale* syn *M. nivalis*), Anthraknose (*Colletorichum graminicola*), Heksering, Rodbrand (*Pythium*, *Rhizoctonia*), Rødtråd (*Laetisaria fuciformis*) – goldfodssyge (*Gaeumannomyces graminis*)

Dosering: 1 kg/ha blandet med 300-400 l vand. Ved kraftige svampeangreb kan dosis fordobles til 2 kg/ha.

Produkt	Dosis kg/ha
1.-5. sprøjtning	1-2 kg/ha

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Anvendes i en bekæmpelsesstrategi med Mycostop WP. Opløsningen fremstilles ved først at tilsætte pulveret fra salgseballagen (1 kg) direkte i tanken (300-400 l vand), hvor den blandes, indtil konsistensen er jævn. Præparatet udsprøjtes derefter på græsset. Blandingen skal anvendes samme dag. Sprøjtning foretages forår og efterår, når temperaturen er mellem 5 og 15°C.

Antal behandlinger:

Om foråret: 1-2 behandlinger med 4 ugers mellemrum. Den første behandling umiddelbart efter at sneen er smeltet og lufttemperaturen er ca. 5°C, og den anden behandling ved ca. 10°C.

Om efteråret: 2-3 behandlinger med 4 ugers mellemrum. Den første behandling, når lufttemperaturen er faldet til under 15°C, og den anden behandling ved ca. 10°C.

Risiko for skade:

Bland ikke Prestop WP med kemiske pesticider eller koncentrerede gødninger. Prestop WP bør ikke anvendes de første par dage efter kemisk behandling af golfbanen.

PRESTOP® WP

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH 401).
Indeholder *Gliocladium catenulatum* J1446; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af støv/spray (P261).

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium* og gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i grøntsager, krydderurter og prydblplanter, samt til bekæmpelse af agurkesyge (*Didymella bryoniae*) i agurker, i åbne og lukkede væksthuse og på friland.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

BEMÆRKNINGER

Prestop WP anvendes i forebyggende øjemed. Præparatet er egnet til brug i integreret bekæmpelse. Du kan få mere information om kompatibilitet hos Danstar Ferment AG. Præparatet er ikke skadeligt for bekæmpelsesorganismer. Må ikke anvendes som tankblanding med andre vækstbeskyttelsesmidler eller koncentreret næringsopløsning.

Begrænsninger i anvendelsen: Må ikke bruges til stiklinger uden rødder. Må ikke bruges till stiklinger af træagtige vækster.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Ved håndtering af præparatet skal der anvendes beskyttelsesdragt, gummistøvler, gummi- eller plasthansker (f.eks. nitril) samt

hovedbeklædning. Ved arbejdsopgaver, hvor luftvejene kan blive påvirkede, bør der også benyttes åndedrætsværn med P2/A2 filter.

OPBEVARING, HOLDBARHED OG RENOVATION

Prestop WP er et biologisk produkt, som indeholder levende, tørrede svampesporer og mycelium. Produktet har en holdbarhed på 12 måneder i uåbnet emballage, når det opbevares tørt og køligt, under +4°C. Når emballagen er åbnet, bør indholdet straks bruges. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.