

PRIMUS

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticale med og uden græsudlæg, græsmarker samt i visse frøgræsser.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 570-14

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold : 1000 ml

Analyse : 50 g/liter Florasulam (vægtprocent: 4,84%)

Registreringsindehaver:



Herluf Trolles Vej 257
5220 Odense SØ
Tlf 7020 4903

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticales med og uden græsudlæg, græsmarker samt i visse frøgræsser.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte,

Må i hvede, rug, byg og triticales ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.

Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 7 dage.

Halmen fra frøgræs kan opfodres med en behandlingsfrist på 2 måneder.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm).

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder florasulam, kun anvendes om foråret i den brugsanvisningen anførte samlede maksimale dosering for aktivstoffet.

Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Miljøfarlig

BRUGSANVISNING

Anvendelse

Primus må anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og tritcale med og uden græsudlæg, græsmarker samt i frøgræsser. Primus er et bladmiddel og kan derfor anvendes på alle jordtyper mod bredbladet ukrudt. Primus må ikke anvendes i havre og durumhvede, og hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgeplanter. Primus kan anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i kulturer af følgende græsser til frøproduktion: alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs. Primus kan anvendes i kulturer af følgende græsser til slæt/afgræsning: italiensk rajgræs, engsvingel, strandsvingel, alm. rapgræs, timothe, hundegræs.

Dosering og anvendelsestidspunkt

Produktet kan anvendes fra stadie 20 til 39. I vintersæd og frøgræs kan der behandles så snart væksten starter om foråret.

Afgrøder	Vækststadier BBCH	
	20 - 29	30 - 39
Vintersæd	60 - 75 ml/ha	70 - 100 ml/ha
Vårsæd, ikke havre	50 - 75 ml/ha	70 - 100 ml/ha
Frøgræs alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs	75 ml/ha	70 - 150 ml/ha
Græs til afgræsning og slet	75 ml/ha	70 - 150 ml/ha

For at sikre optimal effekt af produktet på visse ukrudtsarter såsom melde, kan der tilsættes sprede/klæbemiddel i normalt anbefalet dosering. Dog bør der ikke tilsættes sprede/klæbemiddel ved blanding med Oxitril / Briotril.

Effektiv bekæmpelse af: burresnerre, fuglegræs, valmue, kornblomst, kamiller, hyrdetaske, kiddike, agersennep, spildraps, snerle pileurt, fersken pileurt, haremud, sort natskygge.

Bekæmpbare arter på kimbladstadiet: agertidsel, hanekro, vej pileurt, forglemmigej, brandbæger, svinemælk, mælkebøtte, mælde.

Mindre følsomme arter: ærenpris, stedmoder, tvetand

Klima

Primus kan anvendes når temperaturen er over 2°C og er regnfast 1 time efter sprøjtning. Sprøjtning frarådes under stressede forhold såsom tørke, vandlidende eller meget høje temperaturer.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Fyld tanken med vand og tilsæt derefter den beregnede mængde Primus under omrøring. Evt. spredemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt omrøringen indtil sprøjtningen er afsluttet. Kan anvendes med vandmængder på fra 100 til 300 liter per hektar.

Tilberedning af sprøjtevæske

Under fyldningen af sprøjten tilsættes den beregnede mængde Primus og derefter eventuelle blandingspartnere. Additiv tilsættes altid til sidst. Usprøjtningen skal ske straks efter opblandingen.

Omsåning

Ved omsåning efter en Primus behandling kan der kun sås korn, majs eller rajgræs.

Tankblandinger

Primus kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstreguleringsmidler, dog bør Primus ikke blandes med Primera Super og Topik.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

Førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Skyl øjet grundigt med vand i mindst og gå til kontrol hos en øjenlæge.