



PROPAQUIZAFOP

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer,
raps, ærter, kartofler.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-95

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Analyse: Propaquizafop 100 g/l (9,7 % w/w)

Formulering: Flydende

Emballage:

5 liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R 20: Farlig ved indånding.

R36/38: Irriterer øjnene og huden.

R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S23: Undgå indånding af aerosoltåger.

S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler.

Må i bederoer, raps og kartofler ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.

Må i tørrede ærter ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Må i friske ærter uden bæg ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

N



Miljøfarlig

Xn



Sundhedsskadelig

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Brugsanvisning Propaquizafob

Propaquizafob er et systemisk ukrudtsmiddel mod en række græsser i bredbladede afgrøder. Aktivstoffet transporteres rundt i planten og blokerer celledelingen i følsomme arter. Propaquizafob er et bladmiddel med systemisk virkning. Effekten optræder 3-5 dage efter behandling, synlig virkning efter 10-14 dage. Vær opmærksom på at Propaquizafob kan svide bladene på kartofler, dog uden udbyttenedgang, men kan give synings problemer for læggekartoffelproduktion.

Afgrøder, sygdom, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde	Skadegører	Dosis l/ha	Tidspunkt
Raps, ærter, bederoer	Kvik	1,25 - 1,5	Når kvikken har 3-5 blade. Anvendes ved større mængder kvik og vanskelige forhold
Kartofler	Kvik	1,25	Når kvikken har 3-5 blade
Kartofler, raps, ærter, bederoer	Kvik	1,0	Når kvikken har 3-5 blade og moderat kvik mængde og optimale forhold
Kartofler, raps, ærter, bederoer	Kvik	0,75	Når kvikken har 3-5 blade og små mængder kvik
Bederoer	Kvik	2 x 0,75	1 behandling når kvikken har 3-5 blade, 2 behandling 3 uger senere. Spiltebehandling anvendes ved store mængder kvik
Vinterraps **	Spildkorn	0,25 - 0,5	Efterår eller forår når spildkornet har 2-4 blade
Kartofler, raps, ærter, bederoer	Flyvehavre, rug	0,4 - 0,75	Når græsset har 3-5 blade.
Kartofler, raps, ærter, bederoer	Rajgræs, timothe, vindaks	0,75 - 1,0	Når græsset har 3-5 blade. Bedst på 3-4 bladstadiet.
Kartofler, raps, ærter, bederoer	Agerævehale, alm rapsgræs, engrapsgræs	0,75 - 1,0	Når græsset har 3-5 blade. Bedst på 3-4 bladstadiet.

Generelt bekæmper rødsvingel og stivbladet vinkel ikke og der er begrænset effekt overfor enårig rapsgræs

** Brug 1,0 l/ha på rug om foråret i vinterraps.

Ved dosering under 0,25 l/ha til sættes sprede-klæbemiddel

Sprøjteteknik

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	6,1	200
ISO-F-03-110 Blå	3	5,7	250

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar.

Optimale virkningsforhold

Bedst effekt opnås ved sprøjtning under optimale vækstforhold, med en god jordfugtighed, høj luftfugtighed og små udsætning i dag og nattemperatur. Generelt er morgensprøjtninger at foretrække. Der kræves mindst 1 time tørvej efter sprøjtning. Behandl ikke ved udsigt til nattefrost.

Tankblanding

Propaquizafob kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Bemærk at effekten kan blive nedsat ved blanding med andre

ukrudtsmidler.

Renngøring af sprøjtetmateriel

Sprøjtetømmes helt for sprøjteveske i marken.

Sprøjtet skylles grundigt med rent vand. Skyllervandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjtet og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllervandet ud på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Propaquizafob skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Resistenstrategi

Der er konstateret resistens overfor agerævehale med produkter, som har samme virkningsmekanisme som Propaquizafob. Ved sprøjtning i en efterfølgende afgrøde, bør vælges et middel med en anden virkningsmekanisme end Propaquizafob.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllervandet hældes op i sprøjtevesken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læg kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.