

QUAD-GLOB 200 SL

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 613-4 • Analyse: Diquat dibromid 374 g/l (svarende til Diquat 200 g/l –

16,7 % w/w)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Batchnummer: Se emballagen

Emballage: 20 L



FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan ætse metaller (H290).
Farlig ved indtagelse (H302).
Forårsager hudirritation (H315).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Giftig ved indånding (H331).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H372).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Indånd ikke spray (P260).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).
Bær beskyttelseshandsker/øjenskytelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Ukrudtsbekæmpelse:
Må i kartofler ikke anvendes senere end stadie 14.
Må i jordbær ikke anvendes senere end stadie 93.
Må i sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål, savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, diild, timian, friske ærter og bønner med og uden bæg, sukkermais, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke anvendes senere end stadie 07.

Må i såede og prikledte/udplantede kulturer af nåletræer, løvfældende buske og træer ikke anvendes senere end stadie 07.

Må i valmuer og rødkløver ikke behandles senere end 75 dage før høst.

Nedvisning:

Ved nedvisning af kartofler må der ikke behandles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen må ikke anvendes til foder.

Nedvisning af ærter til modenhed, raps og rybs. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Må i frøafgrøderne rødkløver og hvidkløver ikke anvendes senere end stadie 89.

Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Globachem

Importør:

GLOBACHEM NV

Brustem Industriepark

Lichtenberglaan 209

B-3800 Sint-Truiden

Tlf + 32 11 78 57 17

www.globachem.com



DK

Bruksanvisning

VIKREMADE OG VIRKINGSPEKTRUM

QUAD-GLOB 200 SL er et kontaktmiddel der virker i planternes grønne dele, hvor QUAD-GLOB 200 SL med hjælp fra lyset danner brintovlerite, der ødelægger planternes celler. Virkningen af QUAD-GLOB 200 SL ses meget hurtigt og nedvisningen er sket i løbet af 3-10 dage.

AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTE/TIDSPUNKT

Nedvisning af kartofler Ved tvangsmodning af kartofler kan kartofflens karstrenge få en mørk farve, hvis det foregår under ugunstige vejforhold eller under stressende betingelser for kartoflerne. Det vil sige uanset hvordan tvangsmodningen af kartoflerne finder sted.

Kartofflernes stadium	Dosering af QUAD-GLOB 200 SL
Med kraftig grøn top (Splitdosering med 4-8 dages mellemrum)	2 X 2,5 l/ha
Ved begyndende afmodning (gulgrøn top) 4-8 dages mellemrum ved splitdosering	1 X 2,5 l/ha eller split 1 X 1,5 l/ha efterfulgt af 1 X 1,0 l/ha
Næsten afmodnede kartofler (75% vissen)	1 X 1,5 l/ha

Bemærkninger: Der nedvisnes når knoldene har den ønskede størrelse. Efter ca. 2 uger er knoldene fuldt modne og klar til optagning. Behandlingsfrist: 7 dage.
Behandlingstidspunkt og vejforhold ved nedvisning af kartofler.

Markens tilstand.	Tørt og klart vejr samt tørre planter. Det samme vejr forventes resten af dagen.	Høj luftfugtighed, overskyet/diset. Evt. med våde blade på afgrøden.
Jorden er tør.	Anbefalet tidspunkt: Kl. 7.00 – 11.00	Risikabelt – udskyd behandlingen.
Jorden er fugtig.	Anbefalet tidspunkt: Kl. 7.00 – 13.00	
Jorden er mættet med vand.	Anbefalet tidspunkt: Kl. 7.00 – 13.00	

Nedvisning af frøafgrøder

Afgrøder:	Dosering af QUAD-GLOB 200 SL
Raps og rybs	1 X 2,0 – 2,5 l/ha Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 86-87 I det udviklingsstadium har planterne over 50% mørke frø. Svaret også til det tidspunkt hvor rapsen skårlægges.
Frø af rødkløver, hvidkløver	1 X 2,0 – 2,5 l/ha Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 85-89

Ærter til modenhed (også fremavi)	Dosering:	Behandles 7 – 10 dage før høst, BBCH stadium 87-89, under 30% vand. Spredesklæbemiddel unødvendigt.
	1 X 2,0 – 2,5 l/ha	

Ukruddsbekæmpelse

Afgrøde	Dosering	Bemærkninger
Valmuer (ved splitbehandling 5 – 8 dages interval mellem behandlinger)	1 X 2,0 l/ha eller 2 X 1,0 l/ha	Valmuer tåler QUAD-GLOB 200 SL efter fremsprøjtning. Behandling først når valmuerne har blivende blade. Spiltsprøjtning er oftest bedst. Brug ikke spredesklæbemiddel.
Kartofler	1 X 1,0-2,5 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 00-14. Ukrudd bekæmpes på ukrudtets kimbladsstadium eller senest når 10% af kartoflerne er fremsprøjtet.
Jordbær	1 X 1,0-2,5 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 91-93. Afskærmet sprøjtning efter høst.
Sukkerroer, rødbeder, gulerødder, pastinak, persillerod, kålroer, majroe, radise, sålæg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål, savojkål, rosenkål, kinnakål, grøn kål, spinat, kærvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden bælg, sukkermais, biegselleri, knoldselleri, salat og asparges	1 X 1,0-2,0 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 00-07. Såbedet gøres klar, og afgrøden sås når ukruddet er fremsprøjtet. Sprøjtning udføres FØR afgrødens fremsprøjtning, ellers vil denne blive ødelagt.

Sætteleg, skalotteleg, hvidleg rabarber, jordskok og peberrod	1 X 1,0-2,0 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 00-07. Arealer gøres klar, og afgrøden planteres. Der sprøjtes på fremsprøjtet ukrudd INDEN afgrøden begynder at skyde.
Sæde kulturer af nåletræer løvtræer og løvfældende buske	1 X 1,0-2,5 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 00-07. Sprøjtning udføres FØR afgrødens fremsprøjtning, ellers vil denne blive ødelagt. Ingen sprøjtning på grusdækkede bede.
Prikede/udplantede kulturer af nåletræer løvtræer og løvfældende buske	1 X 1,0-2,5 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand. Afskærmet sprøjtning så afgrøden ikke rammes.

Sprøjteteknik

	Dyse nr.:	Tryk i bar:	Hastighed km/t:	Vand l/ha:
Ukruddsbekæmpelse småt ukrudd	ISO 025, 03, 04	2 - 3	6 - 7	150 - 300
Nedvisning af kartofler	ISO 025, 03, 04, 05	2 - 3	5	150 - 400

QUAD-GLOB 200 SL er regnfast 10 minutter efter det er udsprøjtet.

Tilberedning af sprøjtbevæskning

Først fyldes sprøjten tank halvt op med vand, så tilsættes den beregnede mængde QUAD-GLOB 200 SL og et eventuelt sprede- klæbemiddel mens omrøringen kører. Til sidst fyldes op til den ønskede vandmængde. Normalt er det ikke aktuelt at blande med andre midler end sprede- klæbemiddel.

Omsåning Alle afgrøder kan sås eller plantes 3 dage efter anvendelsen af QUAD-GLOB 200 SL.

Rengøring af sprøjtetøj

Udvendig vask af sprøjte og traktor skrubst i marken, alternativt på vaskeplads med opsamlingsbænk.

Sprøjtet skal i marken kunne skylles /vaskes så meget at restvæskene i tanken er mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemedlet.

Husk at tømme sprøjtet helt mellem hver skyling/vask, aktivere alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamlings og afledning rengøres sprøjtet bedst i marken

1. Sprøjtet tømmes helt for sprøjtbevæske i marken.

2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjtet med ca. 1/3 af det rene vand fra skyllevands-tanken. Skyllevandet sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er sprøjtet.

3. Fyld næste 1/2 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 l All Clear Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuleudvask køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.

4. Skyl tanken grundigt med den sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbn bundproppen og tanken tømmes helt i marken.

5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der skal vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand).

Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamlings af vaskevand, enten i gyllebeholder eller separat beholder.

En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på et areal der lige er behandlet.

6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 l vand.

Ved brug af tankspuleudvask og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkelig med vand i rentvandstanken kan punkt 3 også startes. Tankspuleudvask og omrøring skal holdes i gang mens der køres hjem.

Der henvises ligeledes til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjtet til udbringning af bekæmpelsesmidler jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Bortskaffelse af emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring QUAD-GLOB 200 SL skal opbevares i et aflåst rum eller skab der er mærket med dødningehoved samt teksten "Giffige stoffer". Bør opbevares frostfrit, men tåler let frost.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge. (P304+P340+P311).

VED KONTAKT MED HJØJENE: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

VED KONTAKT MED HUNDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P337+P313).

Ved vedvarende øjnerirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Alt tilsudsedt tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Vejtransport: UN - nr.: 1760 RID/ADR: 8.66 (c)



DK